

Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образования по специальности **31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО**

**1. [T003253] ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 10 – 12
- Б) 12 – 15
- В) 30 – 32
- Г) 28 – 30

**2. [T003254] ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 30 – 32
- Б) 32 – 40
- В) 26 – 28
- Г) 36 – 38

**3. [T003255] НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ПРОВОДИТСЯ**

- А) сбор анамнеза
- Б) обучение уходу за новорожденным
- В) полное обследование женщины
- Г) постановка на учет

**4. [T003256] ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА К БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) подготовка женщины к достаточной лактации
- Б) знакомство с семьей
- В) выяснение состояния здоровья отца ребенка
- Г) обучение уходу за ребенком

**5. [T003257] ПАТРОНАЖ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в неделю
- В) 1 раз в месяц
- Г) 2 раза в месяц

**6. [T003258] СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПАТРОНАЖА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ РОДДОМА В ДНЯХ**

- A) 1-3
- Б) 4-6
- В) 5-7
- Г) 8-10

**7. [T003259] НА ПЕРВОМ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКОМ ПАТРОНАЖЕ МАТЬ ОБУЧАЮТ**

- А) проведению гигиенической ванны
- Б) постановке горчичников
- В) измерению артериального давления
- Г) проведению ножных ванн

**8. [T003260] НА ВТОРОМ ПАТРОНАЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) контроль выполнения всех манипуляций по уходу
- Б) обучение гимнастике
- В) обучение правилам контрастного обливания ног
- Г) сбор анамнеза

**9. [T003261] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТАМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ**

- А) быть в безопасности
- Б) учиться
- В) поклоняться кому-либо
- Г) быть признанным

**10. [T003262] ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) изучение анамнеза заболеваний
- Б) профилактику респираторных инфекций новорожденного
- В) выяснение предпочтений в духовной сфере
- Г) профилактику генетической патологии

**11. [T003263] ЭМБРИОПАТИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- A) 12
- Б) 20
- В) 24
- Г) 30

**12. [T003264] ОБРАБОТКУ ГЛАЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) гонобленнореи
- Б) ксерофтальмии
- В) пиогенной инфекции
- Г) вирусного конъюктивита

**13. [T003265] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПУПОВИНУ НАКЛАДЫВАЮТ ЗАЖИМЫ КОХЕРА В КОЛИЧЕСТВЕ**

- А) 2
- Б) 4
- В) 1
- Г) 5

**14. [T003266] ПЕРВОЙ ПИЩЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) молозиво
- Б) зрелое молоко
- В) молочная каша
- Г) молочная смесь

**15. [T003267] СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАЛАТЕ СПОСОБСТВУЕТ**

- А) кормлению ребенка «по требованию»
- Б) осложнению работы медицинского персонала
- В) ухудшению процесса адаптации новорожденного
- Г) возникновению гнойно-септической инфекции

**16. [T003268] ПРИ ЭМБРИОПАТИИ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД**

- А) органогенеза
- Б) фетогенеза
- В) ранний неонатальный
- Г) поздний неонатальный

**17. [T003269] ПЕРЕНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ НА НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 43
- Б) 41
- В) 40
- Г) 39

**18. [T003270] ПЕРВЫЙ ИЗГИБ ПОЗВОНОЧНИКА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕ**

- А) шейном
- Б) грудном
- В) поясничном
- Г) крестцовым

**19. [T003271] ПРИ НАГРУБАНИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНİТЬ**

- А) сухое тепло
- Б) спиртовый компресс
- В) орошение фурациллином
- Г) обезболивающую мазь

**20. [T003272] ЭЛЕМЕНТОМ УХОДА ЗА РОДОВОЙ ОПУХОЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) покой
- Б) постоянная смена положения
- В) положение на пораженной стороне
- Г) обработка фурациллином

**21. [T003274] НАЧИНАТЬ ПРОГУЛКИ С НОВОРОЖДЕННЫМ ЗИМОЙ МОЖНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НЕ МЕНЕЕ**

- A) - 10С
- Б) - 5С
- В) - 15С
- Г) - 20С

**22. [T003275] МОЛОЗИВО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ**

- А) иммуноглобулинов
- Б) жира
- В) углеводов
- Г) микроэлементов

**23. [T003276] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ**

- А) таурин
- Б) казеин
- В) насыщенные жирные кислоты
- Г) альфа-лактозу

**24. [T003277] ТАУРИН ЖЕНСКОГО МОЛОКА УЧАСТВУЕТ В**

- А) развитии нервной системы
- Б) регуляции работы желудочно-кишечного тракта
- В) формировании флоры кишечника
- Г) переваривании жиров

**25. [T003278] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СНА КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ В ЧАСАХ В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 8
- Б) 4
- В) 6
- Г) 12

**26. [T003279] СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО**

- А) формуле Тура
- Б) возрасту ребенка
- В) результату контрольного кормления
- Г) аппетиту новорожденного

**27. [T003280] НОВОРОЖДЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО ДНЯ**

- А) 29
- Б) 30
- В) 14
- Г) 7

**28. [T003281] ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЮТ**

- А) цвет кожи
- Б) количество сыровидной смазки
- В) аппетит
- Г) группу крови

**29. [T003282] КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНЫХ УБОРОК В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК**

- А) 3
- Б) 4
- В) 2
- Г) 1

**30. [T003283] ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЖИВОРОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) самостоятельное дыхание
- Б) гиперемия кожи
- В) наличие сосательного рефлекса
- Г) гримаса при раздражении

**31. [T003284] ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ НОВОРОЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО**

- А) наличию сосательного рефлекса
- Б) цвету кожи
- В) характеру стула
- Г) громкости крика

**32. [T003285] МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПОСЛЕ РОДОВ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 10-15
- Б) 1-5
- В) 20-30
- Г) 30-60

**33. [T003286] ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ РОДАХ АКУШЕРКА ПРОВОДИТ**

- А) тактильную стимуляцию
- Б) самостоятельное подключение к ИВЛ
- В) введение бронхолитиков
- Г) согревание ребенка

**34. [T003287] К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- А) умывание
- Б) обтирание кожи
- В) обливание ног
- Г) купание в открытых водоемах

**35. [T003288] ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

- А) по данным медицинских осмотров
- Б) по листкам нетрудоспособности
- В) по статистическим талонам
- Г) по данным переписи населения

**36. [T003289] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ**

- А) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у)
- Б) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-воп)
- В) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04)
- Г) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88)

**37. [T003290] К ДОКУМЕНТУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОТНОСЯТ**

- А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- Б) статистический талон
- В) талон на прием к врачу
- Г) амбулаторную карту

**38. [T003291] РЕПРОДУКТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ У ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ ВОЗРАСТ**

- А) от 15 до 50 лет
- Б) от 15 до 20 лет
- В) от 15 до 40 лет
- Г) от 15 до 30 лет

**39. [T003292] К РАННЕМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ ПЕРИОД**

- А) первых 6-ти суток после родов
- Б) первого месяца жизни
- В) родов
- Г) первого года жизни

**40. [T003293] К МЕТОДУ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ**

- А) биохимический
- Б) близнецовый
- В) дерматоглифический
- Г) цитологический

**41. [T003294] К МЕТОДУ АНТРОПОГЕНЕТИКИ, ОСНОВАННОГО НА ПРОСЛЕЖИВАНИИ ПРИЗНАКОВ В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ, ОТНОСЯТ**

- А) генеалогический
- Б) биохимический
- В) близнецовый
- Г) цитологический

**42. [T003295] ВОЗРАСТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, СОСТАВЛЯЮТ**

- А) 35 -45 лет
- Б) 20-25 лет
- В) 15-18 лет
- Г) 25-35 лет

**43. [T003296] ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- А) хромосомной патологии
- Б) синдромов с множественными врожденными пороками развития
- В) моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом
- Г) мультифакториальных болезней

**44. [T003297] К ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ОТНОСЯТ**

- А) 10-13 недель
- Б) 4-6 недель
- В) 7-9 недель
- Г) 14-16 недель

**45. [T003298] ЛЕТАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- А) анэнцефалию
- Б) карликовость
- В) гиперхолестеринемию
- Г) гемофилию

**46. [T003299] К АНОМАЛИЯМ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КОТОРЫХ ЯВИЛИСЬ ГЕННЫЕ МУТАЦИИ, ОТНОСЯТ**

- А) полидактилию и синдактилию
- Б) синдромы Дауна и Эдвардса
- В) синдромы Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера
- Г) транслокационные формы хромосомных синдромов

**47. [T003300] ДЕЛЕЦИЯ КОРОТКОГО ПЛЕЧА 5 ХРОМОСОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- А) «кошачьего крика»
- Б) синдрома Патау
- В) синдрома Дауна
- Г) синдрома Эдвардса

**48. [T003301] ТРИСОМИЯ ПО 18 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- А) синдрома Эдвардса
- Б) синдрома Дауна
- В) «кошачьего крика»
- Г) синдрома Патау

**49. [T003302] ТРИСОМИЯ ПО 13 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**

- А) синдрома Патау
- Б) синдрома Дауна
- В) «кошачьего крика»
- Г) синдрома Эдвардса

**50. [T003303] К ПОКАЗАТЕЛЮ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТНОСИТСЯ**

- А) распространенность заболеваний среди населения
- Б) степень изменения уровня заболеваемости во времени
- В) исчерпанная заболеваемость населения
- Г) удельный вес того или иного заболевания среди населения

## **51. [Т003304] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

- А) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; среднегодовая численность населения
- Б) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году
- В) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения
- Г) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году

## **52. [Т003305] ДОКУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ**

- А) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у)
- Б) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-воп)
- В) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04)
- Г) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88)

## **53. [Т003306] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРАЖЕННОСТИ**

- А) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; число лиц, прошедших медицинский осмотр
- Б) число заболеваний, выявленных впервые в данном году; среднегодовая численность населения
- В) число всех выявленных заболеваний; число обратившихся за медицинской помощью
- Г) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения

## **54. [Т003307] К ДОКУМЕНТУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОТНОСЯТ**

- А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- Б) статистический талон
- В) талон на прием к врачу
- Г) амбулаторную карту

**55. [T003308] ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ ПОНИМАЮТ**

- А) науку о закономерностях здоровья населения
- Б) систему лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
- В) науку о социальных проблемах медицины
- Г) систему социально-экономических мероприятий по охране здоровья

**56. [T003309] СРЕДИ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЛИДИРУЮТ**

- А) образ жизни
- Б) биологические
- В) экологические
- Г) уровень организации медицинской помощи

**57. [T003310] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДСТАВЛЕНО**

- А) предупреждение обострений заболевания
- Б) предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний
- В) предупреждение возникновения инвалидности
- Г) все вышеперечисленное

**58. [T003311] НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ**

- А) развитие первичной медико-санитарной помощи
- Б) повышение роли санаторно-курортной помощи
- В) развитие сети диспансеров
- Г) повышение роли стационаров

**59. [T003312] К ПОКАЗАТЕЛЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ**

- А) среднее число посещений на 1 жителя в год
- Б) фактическая среднечасовая нагрузка врача в поликлинике
- В) распределение посещений городских жителей
- Г) выполнение плана посещений

**60. [T003313] СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ИЗУЧАЕТ**

- А) численность и состав населения по социальным и биологическим признакам
- Б) общую и повозрастную плодовитость
- В) рождаемость, смертность и воспроизводство населения
- Г) миграцию в различных регионах страны

**61. [T003314] ДОКУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

- А) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
- Б) международная номенклатура заболеваний
- В) международная классификация заболеваний и травм
- Г) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти

**62. [T003315] ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

- А) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- Б) естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость, смертность
- В) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная заболеваемость
- Г) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая заболеваемость

**63. [T003318] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА**

- А) предупреждение обострений заболевания
- Б) предупреждение воздействия факторов риска на развитие острых заболеваний
- В) предупреждение возникновения инвалидности
- Г) предупреждение воздействия факторов риска на развитие хронических заболеваний

**64. [T003319] ОРГАНОМ, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) фонд социального страхования
- Б) министерство здравоохранения
- В) Роспотребнадзор
- Г) страховая медицинская организация

**65. [Т003320] К ДАННЫМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ, ОТНОСЯТ**

- А) число физиологических родов; общее число родов
- Б) число физиологических родов; число родившихся живыми и мертвыми
- В) число физиологических родов; число родов с осложнениями
- Г) число физиологических родов; число родившихся живыми

**66. [Т003321] КАКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ**

- А) фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в отдаленной местности
- Б) врачу станции скорой помощи
- В) врачу дома отдыха, санатория
- Г) медицинской сестре здравпункта

**67. [Т003322] К ФУНКЦИЯМ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) установление факта временной нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности, направление на ВК для продления листка нетрудоспособности
- Б) установление факта временной нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности, направление на медико-социальную экспертизу
- В) установление факта временной нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности, экспертиза стойкой нетрудоспособности
- Г) установление факта стойкой нетрудоспособности, выдача направления на врачебную комиссию, экспертиза временной нетрудоспособности

**68. [Т003323] К ФУНКЦИЯМ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) экспертиза временной нетрудоспособности, консультации врачей, выдача рекомендаций о переводе на щадящую работу, контроль качества лечения, направление на МСЭ в случае возникновения признаков стойкой утраты трудоспособности
- Б) консультации врачей, направление на МСЭ, экспертиза стойкой нетрудоспособности, профессиональной непригодности
- В) консультации врачей, выдача листка нетрудоспособности всем больным, экспертиза временной нетрудоспособности
- Г) выдача листка нетрудоспособности, справок о профессиональной непригодности, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача заключения о переводе на другую работу беременных

**69. [T003324] ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические показатели
- Б) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
- В) показатели соотношения, наглядности, инвалидности
- Г) демографические показатели, физического развития, обеспеченности кадрами

**70. [T003325] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) анкетирование
- Б) тестирование
- В) наблюдение
- Г) выкопировка данных из первичных документов

**71. [T003326] ПРИ РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) число женщин детородного возраста
- Б) общее число родившихся живыми и мертвыми
- В) число женщин, состоявших в браке
- Г) численность брачных пар в населении

**72. [T003327] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) проведение медицинских осмотров
- Б) выявление заболеваний
- В) улучшение условий труда и отдыха
- Г) повышения материального благосостояния

**73. [T003328] ДЕМОГРАФИЯ — ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ**

- А) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии
- Б) факторную обусловленность здоровья
- В) здоровье населения
- Г) вопросы брака и плодовитости

**74. [T003329] ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) медицинское свидетельство о рождении ребенка
- Б) свидетельство о браке
- В) заявление 2 свидетелей
- Г) свидетельство о рождении

**75. [Т003330] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ**

- А) от 0 до 15 лет и 50 лет и старше
- Б) от 1 до 10 лет и от 10 до 15 лет
- В) от 19 до 59 лет и 50 лет и старше
- Г) от 15 до 49 лет и 60 лет и старше

**76. [Т003331] БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 1 раз в месяц
- Б) 2 раза в триместр
- В) 1 раз в 2 недели
- Г) 1 раз в неделю

**77. [Т003332] ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ КАЖДАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА**

- А) терапевтом и стоматологом, при наличии показаний другими специалистами
- Б) терапевтом, хирургом
- В) хирургом, венерологом
- Г) лор-врачом, инфекционистом

**78. [Т003333] ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА ТЕРАПЕВТОМ**

- А) 2 раза за беременность
- Б) 2 раза в месяц
- В) 2 раза в триместр
- Г) 1 раз в 2 месяца

**79. [Т003334] ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ**

- А) 1 раз в 2 недели
- Б) 1 раз в месяц
- В) 1 раз в 10 дней
- Г) 1 раз в 2 месяца

**80. [T003335] КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- А) 3 раза за беременность
- Б) 1 раз в месяц
- В) 2 раза в месяц
- Г) 1 раз в 2 месяца

**81. [T003336] РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С**

- А) 30
- Б) 28
- В) 34
- Г) 38

**82. [T003337] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ ВАСЕРМАНА В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 1

**83. [T003338] КРАТНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ НА ГОНОКОККИ У БЕРЕМЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

**84. [T003339] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) трижды в I, II и III триместрах беременности
- Б) однократно во II триместре
- В) однократно в I триместре
- Г) по строгим показаниям

**85. [T003340] ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ**

- А) только при наличии показаний
- Б) при каждом посещении
- В) через одно посещение
- Г) через два посещения

**86. [T003341] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА В ДНЯХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 70
- Б) 56
- В) 50
- Г) 74

**87. [T003342] РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ЖЕНЩИНЕ ПРИ МНОГОПЛОДИИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С**

- А) 28
- Б) 30
- В) 34
- Г) 38

**88. [T003343] ОСНОВНАЯ РОЛЬ АКУШЕРКИ В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) борьбе с материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью
- Б) оказании помощи, связанной с рождением ребенка
- В) оказании помощи только женщине
- Г) оказании помощи всей семье

**89. [T003344] ЕСЛИ БЕРЕМЕННАЯ НЕ ПРИШЛА НА ПРИЕМ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, АКУШЕРКА ПРОВОДИТ ПАТРОНАЖ**

- А) в этот же или на следующий день
- Б) в течение недели
- В) в течение месяца
- Г) только по назначению врача

**90. [T003345] ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ**

- А) взвешивание и тонометрию
- Б) взвешивание и пельвеометрию
- В) осмотр в зеркалах
- Г) бимануальное исследование

**91. [T003346] АКУШЕРКА ИМЕЕТ ПРАВО**

- А) оказывать акушерское пособие при нормальных родах
- Б) оказывать акушерское пособие без врача при осложненных родах
- В) проводить ручное отделение и выделение последа
- Г) проводить обследование полости матки

**92. [T003347] ФЛЮРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ**

- А) не показана при желанной беременности
- Б) назначается в первой и второй половине беременности
- В) назначается однократно при постановке на учет
- Г) назначается трижды за беременность

**93. [T003348] МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ О**

- А) профессиональном долге медицинских работников
- Б) внутреннем духовном мире человека
- В) формах человеческого сознания
- Г) морали поведения

**94. [T003349] ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) биопсия хориона
- Б) плацентоцентез
- В) амниоскопия
- Г) амниоцентез

**95. [T003350] НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) амниоскопия
- Б) биопсия хориона
- В) ультразвуковое исследование
- Г) электрокардиография

**96. [T003351] ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ВЫДАЕТСЯ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 30
- Б) 26
- В) 32
- Г) 27

**97. [T003352] БЕРЕМЕННЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ**

- А) 70
- Б) 56
- В) 86
- Г) 84

**98. [T003353] ПОСЛЕРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ**

- А) 110
- Б) 86
- В) 70
- Г) 84

**99. [T003354] ОСМОТР ОКУЛИСТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМ**

- А) всем женщинам
- Б) только женщинам с конъюктивитом
- В) только женщинам после оперативной коррекции зрения
- Г) женщинам, обращающимся по желанию

**100. [T003355] БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- A) 12
- Б) 14
- В) 16
- Г) 20

**101. [T003356] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- А) увеличение объема циркулирующей крови
- Б) понижение количества эритроцитов
- В) повышение количества лейкоцитов
- Г) понижение количества тромбоцитов

**102. [T003357] БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРОВОДИТСЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА**

- А) стафилококковой инфекции
- Б) столбняка
- В) дифтерии
- Г) полиомиелита

**103. [T003358] ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 30-НЕДЕЛЬНОГО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- А) ультразвуковое исследование
- Б) рентгенологический метод
- В) амниоскопию
- Г) электрокардиография плода

**104. [T003359] БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОсятся к группе признаков**

- А) вероятных
- Б) предположительных
- В) сомнительных
- Г) достоверных

**105. [T003360] ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) вероятных
- Б) предположительных
- В) сомнительных
- Г) достоверных

**106. [T003361] ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- А) размягчением перешейка матки
- Б) размягчением тела матки
- В) сокращением матки при пальпации
- Г) асимметрией матки

**107. [T003362] ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) асимметрии матки
- Б) усиленном перегибе матки кпереди
- В) размягчении перешейка матки
- Г) сокращении матки при пальпации

**108. [T003363] ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ ОСНОВАН НА РЕАКЦИИ МЕЖДУ**

- А) хорионическим гонадотропином в моче и антисывороткой
- Б) прогестероном в крови и антисывороткой
- В) эстрогеном и антисывороткой
- Г) плацентарным лактогеном и антисывороткой

**109. [T003364] ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ ДНО МАТКИ**

- А) достигает мечевидного отростка
- Б) на уровне пупка
- В) на середине расстояния между пупком и лоном
- Г) на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком

**110. [T003365] ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЫ РОДОВ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ К ДАТЕ ПЕРВОГО ШЕВЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ**

- A) 20
- Б) 16
- В) 18
- Г) 22

**111. [T003366] СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В**

- А) синцитиотрофобласте
- Б) надпочечниках
- В) гипофизе
- Г) яичниках

**112. [T003367] НАЧАЛО БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- А) оплодотворения яйцеклетки
- Б) имплантации бластоцисты
- В) деления зиготы
- Г) продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе

**113. [T003368] РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ЖЕНЩИНОЙ СОХРАНЯЕТСЯ**

- А) в течение трех лет после родов
- Б) в течение года после родов
- В) на период декретного отпуска
- Г) в течение пяти лет после родов

**114. [T003369] УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНО ПРИ**

- А) несоответствии размеров матки и гестационного срока
- Б) миоме матки
- В) угрозе прерывания
- Г) яичниковых образованиях

**115. [T003370] РАСТЯЖКИ НА КОЖЕ У БЕРЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О**

- А) недостаточной эластичности кожи
- Б) пониженной сопротивляемости организма
- В) достоверности беременности
- Г) избытке веса

**116. [T003371] СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г В НЕДЕЛЯХ**

- А) 28
- Б) 26
- В) 35
- Г) 30

**117. [T003372] КРОМЕ ЯИЧНИКОВ, ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ**

- А) плацентой
- Б) гипофизом
- В) гипоталамусом
- Г) щитовидной железой

**118. [T003373] ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) повышение
- Б) некоторое понижение
- В) существенное понижение
- Г) остается без изменений

**119. [T003374] КАЖДАЯ ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА ТРИжды ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СДАЕТ**

- А) кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоциты
- Б) кровь на группу и резус-фактор
- В) мазки на скрытые инфекции
- Г) мазки на гормональную угрозу

**120. [T003375] ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ У БЕРЕМЕННОЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ**

- А) тошнота и изменение вкуса
- Б) головные боли и ухудшение зрения
- В) шевеление плода
- Г) отеки

**121. [T003376] СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- А) повышением
- Б) незначительным понижением
- В) остаются без изменений
- Г) значительным понижением

**122. [T003377] ПРОГЕСТЕРОНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) оксипрогестерона капронат
- Б) оксибутират натрия
- В) прогестерон
- Г) профази

**123. [T003378] ОКРУЖНОСТЬ 33 СМ ПРИ ДИАМЕТРЕ 10 СМ ИМЕЕТ РАЗМЕР ГОЛОВКИ**

- А) средний косой
- Б) прямой
- В) большой косой
- Г) малый косой

**124. [T003508] ЖЕНСКИЙ ТАЗ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ**

- А) двух тазовых, крестца и копчика
- Б) трех подвздошных
- В) двух лобковых
- Г) двух седалищных

**125. [T003509] К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) матка
- Б) уретра
- В) клитор
- Г) бартолиновые железы

**126. [T003510] НАРУЖНЫЙ ЗЕВ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ ФОРМУ**

- А) точечную
- Б) щелевидную
- В) т-образную
- Г) серповидную

**127. [T003511] ПРОГЕСТЕРОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В**

- А) яичнике
- Б) гипоталамусе
- В) гипофизе
- Г) матке

**128. [T003512] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПОКРЫТА ЭПИТЕЛИЕМ**

- А) цилиндрическим мерцательным
- Б) зародышевым
- В) кубическим
- Г) многослойным плоским

**129. [T003513] ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ**

- А) коническая
- Б) цилиндрическая
- В) призматическая
- Г) шарообразная

**130. [T003514] ЭПИТЕЛИЙ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ ВЛАГАЛИЩЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) многослойный плоский
- Б) цилиндрический
- В) кубический
- Г) призматический мерцательный

**131. [T003515] БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К**

- А) наружным половым органам женщин
- Б) железам внутренней секреции женщин
- В) внутренним половым органам женщин
- Г) железам внутренней секреции мужчин

**132. [T003516] В ПОЛОСТИ МАТКИ РЕАКЦИЯ СРЕДЫ**

- А) щелочная
- Б) кислая
- В) нейтральная
- Г) слабокислая

**133. [T003517] РЕАКЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ В НОРМЕ**

- А) кислая
- Б) нейтральная
- В) слабощелочная
- Г) резкощелочная

**134. [T003518] ОСНОВНОЙ СЛОЙ СЛИЗИСТОЙ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) базальный
- Б) висцеральный
- В) корковый
- Г) ворсинчатый

**135. [T003519] НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) периметрий
- Б) параметрий
- В) миометрий
- Г) эндометрий

**136. [T003520] ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ**

- А) в маточной трубе
- Б) в яичнике
- В) в матке
- Г) в брюшной полости

**137. [T003521] ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ВЫПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО**

- А) между листками широких связок
- Б) вокруг мочевого пузыря
- В) вокруг дугласова углубления
- Г) вокруг прямой кишки

**138. [T003522] САМЫЙ ГЛУБОКИЙ СВОД ВЛАГАЛИЩА НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) задний
- Б) передний
- В) боковой
- Г) средний

**139. [T003523] МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ПОДХОДИТ К МАТКЕ НА УРОВНЕ**

- А) внутреннего зева
- Б) наружного зева
- В) трубного угла
- Г) дна матки

**140. [T003524] ЯИЧНИКОВАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ**

- А) брюшной аорты
- Б) маточной артерии
- В) подвздошной артерии
- Г) срамной артерии

**141. [T003525] БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В**

- А) толще больших половых губ
- Б) толще малых половых губ
- В) влагалище
- Г) шейке матки

**142. [T003526] К ПЛОДОВЫМ ОБОЛОЧКАМ ОТНОСЯТСЯ**

- А) ворсистая и водная
- Б) децидуальная и водная
- В) децидуальная и ворсистая
- Г) спонгиозная и компактная

**143. [T003527] НОРМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ РАВНА В САНТИМЕТРАХ**

- А) 50
- Б) 30
- В) 70
- Г) 40

**144. [T003528] ПУПОВИНА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) две артерии и одну вену
- Б) две вены и одну артерию
- В) одну вену и одну артерию
- Г) две вены и две артерии

**145. [T003529] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО СРОКА В НЕДЕЛЯХ**

- А) 8
- Б) 10
- В) 16
- Г) 14

**146. [T003530] ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ**

- А) прогестерон
- Б) пролактин
- В) окситоцин
- Г) вазопресин

**147. [T003531] ОВУЛЯЦИЯ ПРИ 28 ДНЕВНОМ ЦИКЛЕ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДИТ В ДНЯХ**

- А) 12-16
- Б) 3-5
- В) 6-9
- Г) 8-10

**148. [T003532] ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНДОТРОПИН СТИМУЛИРУЕТ СЕКРЕЦИЮ**

- А) прогестерона
- Б) эстрогенов
- В) андрогенов
- Г) эстриола

**149. [T003533] В НОРМЕ СОЗРЕВАНИЕ ШЕЙКИ К РОДАМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ, НАЧИНАЯ С НЕДЕЛИ**

- A) 38
- Б) 36
- В) 35
- Г) 34

**150. [T003534] К ПРИДАТКАМ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) маточные трубы и яичники
- Б) шейка матки и яичники
- В) яичники и влагалище
- Г) шейка матки и влагалище

**151. [T003535] ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ**

- А) ретракция, контракция мышечных волокон
- Б) расслабление миометрия
- В) неравномерное сокращение миометрия
- Г) сокращение нижнего сегмента матки

**152. [T003536] МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) определение зрелости шейки матки
- Б) определение нахождения предлежащей части плода
- В) проведение пельвиометрии
- Г) измерение окружности живота

**153. [T003537] ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ З ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) наличия признаков отделения плаценты
- Б) состояния плода
- В) продолжительности 1 и 2 периода родов
- Г) величины и размеров последа

**154. [T003538] ДВИЖЕНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ГОЛОВКОЙ ПЛОДА В УЗКОЙ ПЛОСКОСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) внутренний поворот
- Б) разгибание
- В) сгибание
- Г) дополнительное разгибание

**155. [T003539] ДЕЛЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ЗА СЧЕТ**

- А) пояса соприкосновения
- Б) контракционного кольца
- В) предлежащей пуповины
- Г) оболочек плодного яйца

**156. [T003540] ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ПОЛНОГО**

- А) раскрытия маточного зева
- Б) раскрытия внутреннего зева
- В) излития околоплодных вод
- Г) сглаживания шейки матки

**157. [T003541] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО**

- А) рождения последа
- Б) рождения плода
- В) рождения плаценты
- Г) излития околоплодных вод

**158. [T003542] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С**

- А) рождения плода
- Б) появления последовых схваток
- В) появления кровянистых выделений
- Г) рождения последа

**159. [T003543] ЛАТЕНТНАЯ ФАЗА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТ НАЧАЛА СХВАТОК ДО РАСКРЫТИЯ МАТОЧНОГО ЗЕВА В САНТИМЕТРАХ ДО**

- A) 3-4
- Б) 6-8
- В) 1-2
- Г) 8-10

**160. [T003544] В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ВЫДЕЛЯЮТ ФАЗУ**

- A) латентную
- Б) скрытую
- В) пассивную
- Г) торпидную

**161. [T003545] ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- A) прогестерон
- Б) эстрадиол
- В) инсулин
- Г) окситоцин

**162. [T003546] ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- A) окситоцин
- Б) фолликулин
- В) питуитрин
- Г) тестостерон

**163. [T003547] ТАЗОВАЯ КОСТЬ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ**

- A) подвздошной, седалищной и лобковой
- Б) крестца, копчика
- В) крестцового мыса, лобковой
- Г) бедренной, симфиза

**164. [T003548] МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) всем беременным
- Б) только для женщин из группы высокого риска
- В) только женщинам с выраженным болевым симптомом
- Г) женщинам, находящимся в родзале

**165. [T003550] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ БЕРЕМЕННОЙ НООБХОДИМО**

- А) выбрать роддом и пройти курс дородовой подготовки
- Б) послушать истории родов своих знакомых
- В) прочитать учебник акушерства для специалистов
- Г) посетить несколько родов в родильном зале

**166. [T003551] БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) белково-витаминная диета
- Б) ограничение белковой пищи
- В) преимущественно углеводно-жировая диета
- Г) ограничение овощей, фруктов

**167. [T003552] ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН К РОДАМ**

- А) лекции, беседы
- Б) тестирование
- В) конференции
- Г) семинары

**168. [T003553] ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ПРИМЕНЯЮТ НЕЙРОЛЕПТИК**

- А) дроперидол
- Б) динопрост
- В) дицинон
- Г) дексаметазон

**169. [T003554] НЕНАРКОТИЧЕСКИМ АНАЛЬГЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) анальгин
- Б) морфин
- В) промедол
- Г) омнопон

**170. [T003555] ДЛЯ ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) тримекаин
- Б) триквилар
- В) трилен
- Г) морфин

**171. [T003556] КАКОЙ ИЗ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ**

- А) эпидуральная анестезия
- Б) рефлексотерапия
- В) гидротерапия
- Г) аудиоанальгезия

**172. [T003557] К НЕМЕДИКОМЕНТОЗНОМУ МЕТОДУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ОТНОСТИТСЯ**

- А) массаж
- Б) эпидуральная анестезия
- В) ингаляционная анестезия
- Г) проводниковая анестезия

**173. [T003558] КАКОЙ ИЗ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА**

- А) физиопсихопрофилактика
- Б) эпидуральная анестезия
- В) психотропные средства
- Г) спазмолитики

**174. [T003559] МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ БЫЛ РАЗРАБОТАН УЧЕНЫМ**

- А) Вельтовским
- Б) Красовским
- В) Малиновским
- Г) Земмельвейсом

**175. [T003560] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОСТИ СХВАТОК ПРИМЕНЯЮТ**

- А) спазмолитики
- Б) гемостатики
- В) антибиотики
- Г) простогландины

**176. [T003561] НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ**

- А) вводятся только по назначению врача и подлежат строгому учету
- Б) не угнетают дыхательный центр
- В) не применяются для обезболивания родов
- Г) не применяют после кесарева сечения

**177. [T003562] РАСШИФРУЙТЕ АБРАВИАТУРУ ГОМК**

- А) гаммаоксимасляная кислота
- Б) аминокапроновая кислота
- В) этамзилат натрия
- Г) оксипрогестерона капронат

**178. [T003563] МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН - ОТДЫХ ПОКАЗАН**

- А) при длительных предвестниках и переутомлении
- Б) во втором периоде родов
- В) в раннем послеродовом периоде
- Г) всем роженицам без исключения

**179. [T003564] БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ**

- А) от медработников женской консультации
- Б) от знакомых
- В) из интернет-ресурсов
- Г) из литературных источников

**180. [T003565] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СХВАТКАМИ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2-3
- Б) 4-5
- В) 6-7
- Г) 8-9

**181. [T003566] ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЕСЕДУ О**

- А) половой гигиене во время беременности
- Б) хромосомных заболеваний
- В) пороках развития плода
- Г) заболеваниях детского возраста

**182. [T003567] ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГРУДИ К КОРМЛЕНИЮ НУЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ**

- А) контрастный душ
- Б) массаж груди
- В) физиопроцедуры
- Г) смазывать соски детским кремом

**183. [T003568] К ПРЕДВЕСТНИКАМ РОДОВ ОТНОСЯТСЯ**

- А) безболезненные сокращения матки
- Б) отхождение околоплодных вод
- В) частые мочеиспускания
- Г) кровянистые выделения из половых путей

**184. [T003569] В РОДАХ ВЫДЕЛЯЮТ**

- А) последовальный период
- Б) послеродовый период
- В) прелиминарный период
- Г) предвестники родов

**185. [T003570] СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ**

- А) при полном или почти полном открытии маточного зева
- Б) при образовании пояса прилегания
- В) при появлении потуг
- Г) при опущении головки плода в полость малого таза

**186. [T003571] ПРИЗНАКОМ НАЧАЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) регулярное сокращение матки
- Б) усиление шевеления плода
- В) отхождение околоплодных вод
- Г) появление кровянисто-слизистых выделений из половых путей

**187. [T003572] ПРИЗНАКОМ ПРЕДВЕСТНИКОВ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) структурное изменение шейки матки
- Б) отхождение вод
- В) кровотечение
- Г) редкие схватки

**188. [T003573] ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРВЫХ РОДАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ЧАСАХ**

- А) 12-14
- Б) 5-6
- В) 24 - 26
- Г) 48 - 50

**189. [T003574] ПРИ ЖАЛОБАХ БЕРЕМЕННОЙ НА ТОШНОТУ И РВОТУ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКА РЕКОМЕНДУЕТ**

- А) есть часто небольшими порциями
- Б) длительный дневной сон
- В) длительные прогулки
- Г) занятия физкультурой

**190. [T003575] СВОЕВРЕМЕННЫМ для первых родов считается отхождение вод при раскрытии шейки в сантиметрах**

- А) 7-8
- Б) 3-4
- В) 5-6
- Г) 1-2

**191. [T003576] ВТОРАЯ ФАЗА ПЕРИОДА РАСКРЫТИЯ называется**

- А) активной
- Б) латентной
- В) транзиторной
- Г) прелимнарной

**192. [T003577] НАЧАЛОМ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ**

- А) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки
- Б) прижатие головки к входу в малый таз
- В) излитие околоплодных вод шейки
- Г) отхождение слизистой пробки

**193. [T003578] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 60
- Б) 50
- В) 40
- Г) 25

**194. [T003579] СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ**

- А) создает защитную подушку для эмбриона
- Б) способствует росту плода
- В) обеспечивает иммунологическую защиту
- Г) ограничивает свободу движений эмбриона

**195. [T003580] НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ТИП СОКРАЩЕНИЯ ТЕЛА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) контракция
- Б) дистракция
- В) регургитация
- Г) ретракция

**196. [T003581] СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ СТИМУЛИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ**

- А) простогландинов
- Б) прогестерона
- В) партусистема
- Г) парлодера

**197. [T003582] ОЦК ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) увеличивается умеренно
- Б) уменьшается незначительно
- В) резко увеличивается
- Г) резко уменьшается

**198. [T003583] К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ЖЕНЩИНЫ ОТНОСЯТ**

- А) яичники, маточные трубы, матка, влагалище
- Б) влагалище, матка, мочевой пузырь
- В) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- Г) матка, яичники, мочевой пузырь, влагалище

**199. [T003584] В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ**

- А) плакаты с принципами успешного грудного вскармливания
- Б) плакаты, рекламирующие детское питание
- В) бесплатные образцы искусственной смеси
- Г) плакаты, рекламирующие пустышки, соски

**200. [T003585] ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВО ПРИСУТСТВИЯ НА РОДАХ ОТЦА РЕБЕНКА ИЛИ ИНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ**

- А) № 323
- Б) № 572н
- В) № 574
- Г) № 678

**201. [T003586] ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ**

- А) осторожно берет на руки, гладит, целует
- Б) держит ребенка на некотором расстоянии от себя
- В) пытается командовать ребенком
- Г) негативно высказывается в его адрес

**202. [T003587] ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИЛОЖИТЬ РЕБЕНКА К ГРУДИ**

- А) сразу после родов
- Б) через 1 час
- В) через 2 час
- Г) через 1 день

**203. [T003588] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ В КИЛОГРАММАХ**

- А) 10-12
- Б) 5-6
- В) 7-8
- Г) 13-14

**204. [T003589] ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ПАЛАТЫ**

- А) одно или двухместные
- Б) трех или четырехместные
- В) от четырехместных до пятиместных
- Г) от четырехместных до шестиместных

**205. [T003590] ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) тренирующее
- Б) противовоспалительное
- В) гипотензивное
- Г) иммуностимулирующее

**206. [T003591] В РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ АКУШЕРКИ НА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В МЕСЯЦ ОТВОДИТСЯ ЧАСОВ**

- А) 4
- Б) 2
- В) 3
- Г) 1

**207. [T003592] К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ БЕЛКАМИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) мясо
- Б) крупы
- В) овощи
- Г) мучные изделия

**208. [T003593] К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ УГЛЕВОДАМИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) мучные изделия
- Б) мясо
- В) молочные продукты
- Г) овощи

**209. [T003594] РАНЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СПОСОБСТВУЕТ**

- А) снижению заболеваемости внутрибольничными инфекциями
- Б) росту маститов у матери
- В) увеличению послеродовых осложнений
- Г) уменьшению лактостаза

**210. [T003595] ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ПРИСУТСТВИЯ МУЖА НА РОДАХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отсутствие у него инфекции
- Б) его желание
- В) желание жены
- Г) желание родственников

**211. [T003596] СРОКИ ВЫПИСКИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- А) состоянием здоровья матери и ребенка
- Б) только здоровьем матери
- В) только здоровьем ребенка
- Г) массой тела ребенка

**212. [T003597] РОДСТВЕННИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РОДАХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В**

- А) сменной одежде, халате, маске, обуви и бахилах
- Б) сменной одежде и сменной обуви
- В) обычной одежде и сменной обуви
- Г) в обычной одежде

**213. [T003598] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) устранение психогенного компонента родовой боли
- Б) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
- В) разъяснение физиологической сущности родов и течения послеродового периода
- Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности и развитие плода

**214. [T003599] ЛЕКЦИЯ О ВЛИЯНИИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О**

- А) вреде курения, алкоголе и наркотиках
- Б) режиме дня
- В) гигиене
- Г) питании

**215. [T003600] НОРМА СНА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ В ЧАСАХ**

- А) 7-8
- Б) 8-9
- В) 9-10
- Г) 10-12

**216. [T003601] РЕКОМЕНДУЕМАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЛОРИЯХ**

- А) 2500-3000
- Б) 1000-1500
- В) 1500-2000
- Г) 4000-4500

**217. [T003606] РАССТРОЙСТВО ЭМОЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) апатией
- Б) амнезией
- В) анорексией
- Г) булимией

**218. [T003607] ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ**

- А) все ответы верны
- Б) в эмоциональной сфере
- В) в интеллектуальной сфере
- Г) двигательной активности

**219. [T003609] СИТУАЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕРВНО - ПСИХИЧЕСКОЕ УТОМЛЕНИЕ**

- А) все ответы верны
- Б) тяжёлый физический труд
- В) шум, слабое освещение
- Г) однообразная работа

**220. [T003610] ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДРАССУДКОВ КРОЕТСЯ В НЕРАЗВИТОСТИ**

- А) когнитивной сферы
- Б) аффективной сферы
- В) поведенческой сферы
- Г) все ответы верны

**221. [T003612] ПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН**

- А) мышцами диафрагмы таза
- Б) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- В) продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- Г) подвздошно-поясничной мышцей

**222. [T003613] НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН**

- А) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- Б) подвздошно-поясничной мышцей
- В) продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- Г) мышцами диафрагмы таза

**223. [T003614] ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА В-12 РАЗВИВАЕТСЯ**

- А) анемия
- Б) рахит
- В) цинга
- Г) дерматоз

**224. [T003615] МИКРОФЛORA ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАСПЩЕПЛЕНИЕ**

- А) клетчатки
- Б) белков
- В) жиров
- Г) углеводов

**225. [T003616] ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ К**

- А) шейке матки и влагалищу
- Б) прямой кишке
- В) сигмовидной кишке
- Г) слепой кишке

**226. [T003617] МАССА МАТКИ В ГРАММАХ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ**

- А) 40-50
- Б) 30-40
- В) 50-60
- Г) 60-70

**227. [T003618] У РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН МАССА МАТКИ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ**

- А) 80-90
- Б) 60-70
- В) 70-80
- Г) 90-100

**228. [T003619] В РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВХОДЯТ**

- А) яичники, матка, маточные трубы, влагалище, вульва
- Б) влагалище, матка, мочевой пузырь
- В) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- Г) матка, яичники, прямая кишка, влагалище

**229. [T003620] ДЛЯ ГЕМОЛИЗА ХАРАКТЕРНО**

- А) разрушение эритроцитов
- Б) склеивание эритроцитов
- В) оседание эритроцитов
- Г) выход эритроцитов из сосудов

**230. [T003621] ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ, МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ**

- А) тромбоз
- Б) анемия
- В) кровотечения
- Г) гипоксия

**231. [T003622] АНТИКОАГУЛЯНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гепарин
- Б) фибринолизин
- В) протромбин
- Г) фибриноген

**232. [T003623] ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ, ТО МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ**

- А) кровотечения
- Б) тромбоз
- В) анемия
- Г) гипоксия

**233. [T003626] ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ**

- А) различных видов лейкоцитов
- Б) различных видов клеток крови
- В) крови и плазмы
- Г) количество крови и массы тела

**234. [T003628] ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ЛЕГКИХ В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1000-1200
- Б) 500-700
- В) 1500-2000
- Г) 2000-2500

**235. [T003629] К КОЛЕБЛЮЩИМСЯ РЕБРАМ ОТНОСЯТСЯ**

- А) 11-12 пары
- Б) все ребра
- В) 1- 7 пары
- Г) 8-10 пары

**236. [T003630] К ИСТИННЫМ РЕБРАМ ОТНОСЯТСЯ**

- А) 1-7 пары
- Б) все ребра
- В) 8-10 пары
- Г) 11-12 пары

**237. [T003631] ГЛАВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) диафрагма
- Б) дельтовидная
- В) трапециевидная
- Г) ромбовидная

**238. [T003632] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 36
- Б) 35
- В) 38
- Г) 39

**239. [T003634] ТЕМПЕРАТУРА СМЕСИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАДУСАХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ**

- A) 36-37
- Б) 34-35
- В) 22-24
- Г) 38-39

**240. [T003635] ПРОФИЛАКТИКА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- A) сон без подушки
- Б) частое пеленание
- В) вертикальное ношение на руках
- Г) кормление лежа в кроватке

**241. [T003636] К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ СОСАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- A) валикообразное утолщение десен
- Б) обильное слюнотечение
- В) маленький язык
- Г) сухость слизистой

**242. [T003955] БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ**

- A) 280
- Б) 220
- В) 300
- Г) 260

**243. [T003956] СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) нарушение обоняния
- Б) отсутствие менструации
- В) увеличение молочных желез
- Г) увеличение матки

**244. [T003957] ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) увеличение матки
- Б) появление пигментации
- В) нарушение обоняния
- Г) тошнота

**245. [T003958] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выслушивание сердцебиения плода
- Б) рвота
- В) размягчение перешейка матки
- Г) отсутствие менструаций

**246. [T003959] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПУПКА ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 24
- Б) 20
- В) 28
- Г) 16

**247. [T003960] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЛОБКОМ И ПУПКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 16
- Б) 22
- В) 28
- Г) 24

**248. [T003961] СИМПТОМ РАЗМЯГЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЕЙКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- А) Горвица-Гегара
- Б) Пискачека
- В) Снегирева
- Г) Отта

**249. [T003962] СИМПТОМ НЕРОВНОСТЕЙ КОНТУРОВ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- А) Пискачека
- Б) Снегирева
- В) Горвица-Гегара
- Г) Отто

**250. [T003963] СИМПТОМ ЛЕГКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ МАТКИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- А) Снегирева
- Б) Горвица-Гегара
- В) Пискачека
- Г) Отто

**251. [T003964] НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЮТ**

- А) 25-28-31-20
- Б) 22-25-28-18
- В) 28-29-32-15
- Г) 20-23-25-17

**252. [T003965] ОТНОШЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ К ГОЛОВКЕ И ТУЛОВИЩУ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) членорасположение
- Б) позиция
- В) вид
- Г) положение

**253. [T003966] ОТНОШЕНИЕ ОСИ ПЛОДА К ОСИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) положение
- Б) предлежание
- В) позиция
- Г) вид

**254. [T003967] ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К БОКОВЫМ СТЕНКАМ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) позиция
- Б) вид
- В) предлежание
- Г) вставление

**255. [T003968] ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) вид
- Б) позиция
- В) предлежание
- Г) членорасположение

**256. [T003969] ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) предлежание
- Б) положение
- В) вид
- Г) позиция

**257. [T003970] ОТНОШЕНИЕ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ТАЗА НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) вставление головки
- Б) предлежание головки
- В) разгибание головки
- Г) сгибание головки

**258. [T003971] ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- А) высоту стояния дна матки
- Б) предлежащую часть
- В) позицию и вид плода
- Г) вставление головки

**259. [T003972] ВТОРОЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- А) положение, позицию, вид плода
- Б) предлежащую часть
- В) высоту стояния дна матки
- Г) вставление головки

**260. [T003973] ТРЕТИЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- А) предлежащую часть
- Б) позицию
- В) вид
- Г) вставление головки

**261. [T003975] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ ГРЕБНЕЙ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 28-29
- Б) 30-32
- В) 25-26
- Г) 20-21

**262. [T003976] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ ЛОБКОВОГО СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 20-21
- Б) 25-26
- В) 28-29
- Г) 30-31

**263. [T003977] В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕВЕРХНИМИ ОСТЯМИ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 25-26
- Б) 30-31
- В) 20-21
- Г) 28-29

**264. [T003978] ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЧИ НА БЕРЕМЕННОСТЬ ОСНОВАНА НА ВЫЯВЛЕНИИ**

- А) хорионического гонадотропина
- Б) белка
- В) ацетона
- Г) лейкоцитов

**265. [T003979] ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ**

- А) вероятных признаков беременности
- Б) сомнительных признаков беременности
- В) достоверных признаков беременности
- Г) предположительных признаков беременности

**266. [T003980] ИСТИННАЯ КОНЬЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВняется**

- А) 11
- Б) 10
- В) 9
- Г) 13

**267. [T003981] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ МЫСА НАЗЫВАЕТСЯ КОНЬЮГАТОЙ**

- А) диагональной
- Б) истинной
- В) анатомической
- Г) наружной

**268. [T003982] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) наружной коньюгатой
- Б) индексом Соловьева
- В) истинной коньюгатой
- Г) диагональной коньюгатой

**269. [T003983] ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСТИННОЙ КОНЬЮГАТЫ НУЖНО**

- А) от диагональной коньюгаты отнять 1,5-2 см
- Б) от наружной коньюгаты отнять 1,5-2 см
- В) к диагональной коньюгате прибавить 1,5-2 см
- Г) от диагональной коньюгаты отнять 9 см

**270. [T003984] ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЬЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЕТСЯ**

- А) 13
- Б) 11
- В) 9
- Г) 21

**271. [T003985] ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАРУЖНОЙ КОНЬЮГАТЫ ТАЗА ЖЕНЩИНА ЛЕЖИТ**

- А) на боку с согнутой нижележащей ногой
- Б) на боку с согнутой вышележащей ногой
- В) на спине с вытянутыми ногами
- Г) на спине с согнутыми ногами

**272. [T003986] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПЛОДА ПО МЕТОДУ ЖОРДАНИЯ НЕОБХОДИМО**

- А) умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- Б) разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
- В) от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки
- Г) к окружности живота прибавить высоту стояния дна матки

**273. [T003987] ПОВТОРНОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 18
- Б) 14
- В) 20
- Г) 22

**274. [T003988] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПУПКОМ И МЕЧЕВИДНЫМ  
ОТРОСТКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- A) 32
- Б) 34
- В) 36
- Г) 26

**275. [T003989] ПЕРВОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ  
ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- A) 20
- Б) 24
- В) 22
- Г) 26

**276. [T003990] ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ И ВИД ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО НОМЕР**

- A) 2
- Б) 1
- В) 3
- Г) 4

**277. [T003991] ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ**

- А) вероятных признаков беременности
- Б) сомнительных признаков беременности
- В) достоверных признаков беременности
- Г) предположительных признаков беременности

**278. [T003992] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ  
РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 6
- Б) 2
- В) 4
- Г) 3

**279. [T003993] СРОКИ ЗАКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШЕЕЧНОГО ЗЕВА ПОСЛЕ РОДОВ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 7
- Б) 3
- В) 14
- Г) 20

**280. [T003994] ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ ПОКАЗАНО**

- А) активное кормление и сцеживание
- Б) подавление лактомии
- В) согревающий компресс
- Г) физиолечение

**281. [T003995] ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕНСТРУАЦИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ**

- А) вероятных признаков беременности
- Б) предположительных признаков беременности
- В) сомнительных признаков беременности
- Г) достоверных признаков беременности

**282. [T003996] ИСТИННУЮ КОНЬЮГАТУ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РАЗМЕРАМ**

- А) индекса Соловьева
- Б) размера Франка
- В) диагональной коньюгаты
- Г) наружной коньюгаты

**283. [T003997] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2
- Б) 1
- В) 6
- Г) 24

**284. [T003998] ЛОХИИ ОСТАЮТСЯ ЧИСТО КРОВЯНИСТЫМИ В ДНЯХ**

- А) 2-3
- Б) 4-5
- В) 6-8
- Г) 8-10

**285. [T003999] ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 0,5%
- Б) 0,6%
- В) 1%
- Г) 5%

**286. [T004000] ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИЗНАКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПО МЕТОДУ ШРЕДЕРА СЛЕДУЕТ**

- А) определить изменение стояния высоты дна матки
- Б) надавить ребром ладони над лобком
- В) проверить пульсацию сосудов пуповины
- Г) предложить роженице подышать

**287. [T004001] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ ПЕРЕСЕКАТЬ ПУПОВИНУ**

- А) после прекращения пульсации сосудов пуповины
- Б) сразу после рождения ребенка
- В) после отделения последа
- Г) после кормления ребенка

**288. [T004002] ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ**

- А) на уровне пупка
- Б) на уровне дна матки
- В) в положении стоя
- Г) в положении лежа на боку

**289. [T004003] МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 36
- Б) 38
- В) 40
- Г) 32

**290. [T004004] ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ**

- А) стреловидного шва к мысу и симфизу
- Б) малого родничка к передней или задней стенке таза
- В) малого родничка к правой или левой стенке таза
- Г) большого родничка к правой или левой стенке таза

**291. [T004005] АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 15-16
- Б) 5-6
- В) 9-10
- Г) 19-20

**292. [T004006] ПРИ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРМОН**

- А) альфа-фетопротеин
- Б) плацентарный лактоген
- В) эстриол
- Г) прогестерон

**293. [T004007] ПРИ АМИОСКОПИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- А) цвет околоплодных вод
- Б) уродство плода
- В) биомеханический состав вод
- Г) наличие многоплодной беременности

**294. [T004008] НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ В ГРАММАХ НА ЛИТР СЧИТАЕТСЯ**

- А) 110
- Б) 100
- В) 102
- Г) 120

**295. [T004009] ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИБАВКА ЗА НЕДЕЛЮ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 300-400
- Б) 100-200
- В) 500-600
- Г) 700-800

**296. [T004010] ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) судорожное сокращение икроножных мышц
- Б) головная боль
- В) тошнота
- Г) учащенное мочеиспускание

**297. [T004011] ПЕРЕД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ**

- А) жировой эмульсией
- Б) эфиром
- В) спиртом
- Г) йодонатом

**298. [T004012] ПРИЗНАКОМ «ЗРЕЛОЙ» ШЕЙКИ МАТКИ НАКАНУНЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) укорочение шейки до 1 см
- Б) длина шейки 3 см
- В) отклонение шейки к сзади
- Г) проходимость наружного зева для кончика пальца

**299. [T004013] ДЕКСАМЕТАЗОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) для профилактики респираторных расстройств новорожденного
- Б) для профилактики осложнений всех беременных
- В) для профилактики кровотечения во втором периоде родов
- Г) для лечения аномалий родовых сил

**300. [T004014] ОСМОТР РОДОВЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ ПРОВОДИТСЯ**

- А) всем женщинам
- Б) только первородящим
- В) только повторнородящим
- Г) только женщинам из группы риска

**301. [T004015] УДЛИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТРЕЗКА ПУПОВИНЫ НА 10 СМ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- А) Альфельда
- Б) Шредера
- В) Кюстнера-Чукалова
- Г) Гентера

**302. [T004016] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2
- Б) 12
- В) 24
- Г) 6

**303. [T004017] РОДОВЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ**

- А) костный таз, матку, влагалище, мышцы тазового дна
- Б) матку, мышцы тазового дна, пристеночные мышцы таза
- В) матку, влагалище, мышцы тазового дна
- Г) Тело матки, нижний сегмент матки, влагалище

**304. [T004018] УКАЖИТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА**

- А) продольное, поперечное, косое
- Б) косое и поперечное
- В) головное и тазовое
- Г) переднее и заднее

**305. [T004019] НАИБОЛЬШИМ РАЗМЕРОМ МАЛОГО ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) поперечный размер плоскости входа в малый таз
- Б) прямой размер широкой части полости малого таза
- В) поперечный размер широкой части полости малого таза
- Г) прямой размер плоскости выхода полости малого таза

**306. [T004020] ПЛОСКОСТЬ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ**

- А) верхний внутренний край симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- Б) середину внутренней поверхности симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- В) верхний край симфиза, безымянные линии, первый крестцовый позвонок
- Г) нижний край симфиза, подвздошные ямки, крестцовый мыс

**307. [T004021] ЧЕРЕЗ СЕДАЛИЩНЫЕ БУГРЫ ПРОХОДИТ**

- А) поперечный размер плоскости выхода из малого таза
- Б) поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза
- В) поперечный размер плоскости широкой части полости малого таза
- Г) прямой размер плоскости узкой части полости малого таза

**308. [T004022] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРОХОДИТ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ**

- А) венечного шва
- Б) теменных бугров
- В) лобных бугров
- Г) височных костей

**309. [T004023] ПРИ ДОНОШЕННОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОКРУЖНОСТЬ ЖИВОТА И ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЮТ В САНТИМЕТРАХ**

- А) 100 и 30-33
- Б) 90 и 30-32
- В) 90 и 34-36
- Г) 110 и 36-38

**310. [T004031] ПЕРЕХОД ОДНОГО ВИДА ТКАНИ В ДРУГОЙ, РОДСТВЕННЫЙ ЕЙ ВИД ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) метаплазия
- Б) организация
- В) гиперплазия
- Г) регенерация

**311. [T004034] РЕГЕНЕРАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) восстановлением структуры элементов ткани
- Б) снижением массы органа или ткани
- В) увеличением массы органа или ткани
- Г) увеличением количества клеток

**312. [T004036] ГИПЕРПЛАЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) увеличением количества клеток
- Б) увеличением массы органа или ткани
- В) восстановлением структуры элементов ткани
- Г) снижением массы органа или ткани

**313. [T004038] ГИПЕРЕМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) увеличением кровенаполнения ткани
- Б) воспалением ткани
- В) уменьшением кровенаполнения ткани
- Г) нарушением восстановления структур ткани

**314. [T004039] В КОЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ВИТАМИН**

- А) D
- Б) A
- В) B
- Г) C

**315. [T004041] ПРИ ПРИЗНАКАХ НЕДОКОРМА У НОВОРОЖДЕННОГО СЛЕДУЕТ**

- А) провести контрольное кормление
- Б) докармливать кашей
- В) допаивать кипяченой водой
- Г) ввести прикорм

**316. [T004042] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ**

- А) гигиенический уход
- Б) кормление «по требованию»
- В) тутое пеленание
- Г) измерение температуры тела

**317. [T004043] ПАТРОНАЖ, НА КОТОРОМ МАТЬ ГОТОВЯТ К ДОСТАТОЧНОЙ ЛАКТАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) второй дородовый
- Б) первый дородовый
- В) первичный врачебно-сестринский
- Г) целевой патронаж

**318. [T004046] НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПРАКТИКОЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сочетание различных форм физической подготовки
- Б) баня
- В) плавание
- Г) ходьба

**319. [T004047] ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ**

- А) всем, опираясь на индивидуальные особенности каждой женщины
- Б) всем без исключения
- В) по желанию
- Г) по особым показаниям

**320. [T004048] ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ**

- А) перед планированием беременности
- Б) в первом триместре
- В) по запросу женщины
- Г) перед самыми родами

**321. [T004150] БИОМЕХАНИЗМ РОДОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) сгибание и внутренний поворот головки
- Б) запрокидывание ручек
- В) дополнительный внутренний поворот плечиков
- Г) запрокидывание головки кзади

**322. [T004151] ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ**

- А) изгнания
- Б) раскрытия
- В) прелиминарным
- Г) предвестниковым

**323. [T004152] ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- А) полного раскрытия шейки матки
- Б) начала потужных схваток
- В) отхождения вод
- Г) появления схваток через 3 минуты по 40 сек

**324. [T004153] АУСКУЛЬТАЦИЯ ПЛОДА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРОВОДИТСЯ**

- А) чуть ниже пупка со стороны позиции
- Б) над лобком
- В) выше пупка
- Г) на уровне пупка

**325. [T004154] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) внутренний поворот головки
- Б) сгибание головки
- В) разгибание головки
- Г) дополнительное сгибание головки

**326. [T004155] ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) малый родничок
- Б) большой родничок
- В) подзатылочная ямка
- Г) переносица

**327. [T004156] ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) дополнительное сгибание головки
- Г) внутренний поворот головки

**328. [T004157] ТОЧКА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ РАЗГИБАНИЕ ИЛИ СГИБАНИЕ ГОЛОВКИ ПРИ БИОМЕХАНИЗМЕ РОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) точкой фиксации
- Б) проводной
- В) ведущей
- Г) точкой отсчета

**329. [T004158] СОВОКУПНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ СОВЕРШАЕТ ПЛОД ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАЗ И РОДОВЫЕ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) биомеханизмом родов
- Б) асинклитизмом
- В) конфигурацией головки
- Г) течением родов

**330. [T004159] ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ СЕРДЦЕБИЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ**

- А) после каждой потуги
- Б) через каждые 15 минут
- В) через каждые 10 минут
- Г) через каждые 5 минут

**331. [T004160] ВО ВРЕМЯ ПОТУГ ХАРАКТЕРНО**

- А) повышение внутрибрюшного давления
- Б) уменьшение внутрибрюшного давления
- В) расслабление мышц брюшного пресса
- Г) расслабление мышц тазового дна

**332. [T004161] ПОД ПОЗИЦИЕЙ ПЛОДА ПОНИМАЕТСЯ**

- А) отношение спинки плода к боковым стенкам матки
- Б) отношение головки плода к входу в таз
- В) отношение оси плода к длиннику матки
- Г) взаимоотношение различных частей плода

**333. [T004162] В НОРМЕ ПОТУГИ ДОЛЖНЫ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА**

- А) не выше узкой части полости малого таза
- Б) в широкой полости таза
- В) в плоскости входа в малый таз
- Г) над входом в малый таз

**334. [T004163] ПРЯМОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 12,5
- Б) 11
- В) 10,5
- Г) 13

**335. [T004164] ПРАВЫМ КОСЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ**

- А) правым крестцово-подвздошным сочленением и левым лобковым бугорком
- Б) верхним краем лобкового симфиза и мысом
- В) левым крестцово-подвздошным сочленением и правым лобковым бугорком
- Г) наиболее отдаленными точками безымянных линий

**336. [T004165] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 10,5
- Б) 11
- В) 13
- Г) 12,5

**337. [T004166] ЛЕВЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 12
- Б) 11
- В) 13
- Г) 10,5

**338. [T004167] ПРЯМОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 10,5
- Б) 12
- В) 12,5
- Г) 11

**339. [T004168] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 12,5
- Б) 11
- В) 13
- Г) 10,5

**340. [T004169] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 11
- Б) 12,5
- В) 13
- Г) 9

**341. [T004170] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 15-20
- Б) 20-30
- В) 5-10
- Г) 30-40

**342. [T004171] БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- А) теменными буграми
- Б) границей волосистой части лба и затылочным бугром
- В) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- Г) наиболее отдаленными точками венечного шва

**343. [T004172] ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- А) серединой большого родничка и подъязычной костью
- Б) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- В) теменными буграми
- Г) затылочным бугром и подбородком

**344. [T004173] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛЕЧИКОВ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 12-12,5
- Б) 8,5-9,0
- В) 10,5-11,0
- Г) 11,0-11,5

**345. [T004174] ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- А) переносицей и затылочным бугром
- Б) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- В) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- Г) серединой большого родничка и подъязычной костью

**346. [T004175] МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 9,5
- Б) 10,5
- В) 12
- Г) 11

**347. [T004176] РАССТОЯНИЕ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ГОЛОВКИ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ**

- А) прямым
- Б) средним косым
- В) малым косым
- Г) вертикальным

**348. [T004177] СРЕДНИЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 10-10,5
- Б) 11-11,5
- В) 12-12,5
- Г) 13-13,5

**349. [T004178] РАССТОЯНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА ГОЛОВКИ ПЛОДА ДО ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ**

- А) вертикальным
- Б) малым косым
- В) прямым
- Г) большим косым

**350. [T004179] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- А) наиболее удаленными точками венечного шва
- Б) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- В) теменными буграми
- Г) переносицей и затылочным бугром

**351. [T004180] БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- А) подбородком и затылочным бугром
- Б) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- В) наиболее удаленными точками венечного шва
- Г) теменными буграми

**352. [T004181] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 8
- Б) 11
- В) 13
- Г) 12

**353. [T004182] МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ**

- А) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- Б) переносицей и затылочным бугром
- В) серединой большого родничка и подъязычной костью
- Г) затылочным бугром и подбородком

**354. [T004183] ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот головки кпереди
- Г) внутренний поворот головки затылком кзади

**355. [T004184] ЧЕТВЕРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) наружный поворот головки, внутренний поворот плечиков
- Б) внутренний поворот головки
- В) сгибание
- Г) разгибание головки

**356. [T004185] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ**

- А) малым косым размером
- Б) малым поперечным размером
- В) большим поперечным размером
- Г) большим косым размером

**357. [T004186] ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ**

- А) средним косым размером
- Б) малым косым размером
- В) большим косым размером
- Г) прямым размером

**358. [T004187] РОЖЕНИЦЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТУЖИТЬСЯ**

- А) при прорезывании теменных бугров
- Б) при наружном повороте головки
- В) после рождения головки
- Г) при положительных признаках отделения последа

**359. [T004188] БИОМЕХАНИЗМОМ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) совокупность движений плода по родовому каналу
- Б) врезывание головки плода
- В) поворот плода «на ножку»
- Г) внутренний поворот головки

**360. [T004189] ЗАЩИТУ ПРОМЕЖНОСТИ ПРОВОДЯТ В ПЕРИОДЕ**

- А) изгнания плода
- Б) раннем послеродовом
- В) рождения последа
- Г) раскрытия шейки матки

**361. [T004190] РАЗМЕР, В КОТОРОМ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) прямой
- Б) правый косой
- В) левый косой
- Г) прямой и поперечный

**362. [T004191] ГРАНИЦАМИ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) верхний край симфиза, безымянная линия, мыс
- Б) проекции вертлужных впадин, середина крестца
- В) низ симфиза, седалищные ости, мыс
- Г) низ симфиза, седалищные бугры, край копчика

**363. [T004192] К НАРУЖНОМУ СЛОЮ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ АППАРАТ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ**

- А) седалищно-пещеристые
- Б) лобково-копчиковые
- В) подвздошно- копчиковые
- Г) седалищно- копчиковые

**364. [T004193] К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ**

- А) крестцово-маточные
- Б) широкие
- В) воронко-тазовые
- Г) круглые

**365. [T004194] К ПОДВЕШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ**

- А) круглые
- Б) крестцово-маточные
- В) пузырно-маточные
- Г) кардинальные

**366. [T004195] МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ**

- А) внутренней подвздошной артерии
- Б) аорты
- В) половой артерии
- Г) наружной подвздошной артерии

**367. [T004196] ПЯтым моментом акушерского пособия является**

- А) освобождение плечевого пояса и рождение туловища
- Б) бережное выведение головки вне потуг
- В) регулирование потуг
- Г) рассечение промежности

**368. [T004197] При переднем виде затылочного предлежания первым моментом биомеханизма родов является**

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) внутренний поворот плечиков

**369. [T004198] ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА ПРИМЕНЯЮТ СПОСОБ**

- А) Абуладзе
- Б) Шредера
- В) Довженко
- Г) Малиновского

**370. [T004199] ПРИ ОСМОТРЕ ПОСЛЕДА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ**

- А) плаценты и оболочек
- Б) только долек плаценты
- В) только оболочек
- Г) краев плаценты

**371. [T004200] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПОСЛЕ ОТХОЖДЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 5-10
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 30-40

**372. [T004201] ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 120-160
- Б) 100-110
- В) 170-180
- Г) 105-110

**373. [T004202] ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) уменьшение напряжения промежности в период прорезывания и рождения теменных бугров
- Б) освобождение плечевого пояса и рождение туловища
- В) защита малых половых губ от разрыва
- Г) защита клитора от разрыва

**374. [T004203] С ПОМОЩЬЮ ЧЕТВЕРТОГО ПРИЕМА ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО В МАТКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- А) отношение предлежащей части к входу в малый таз
- Б) отношение предлежащей части к плоскостям малого таза
- В) массу плода
- Г) положение, позицию плода

**375. [T004204] ПОТУГИ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОВТОРЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 2-3 МИНУТЫ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 50-60
- Б) 30-40
- В) 20-30
- Г) 15-20

**376. [T004205] ВО ВТОРОМ МОМЕНТЕ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ АКУШЕРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- А) бережное выведение головки из половой щели вне потуг
- Б) защиту промежности
- В) регулирование потуг
- Г) освобождение плечевого пояса и рождение туловища

**377. [T004206] В ТРЕТЬЕМ МОМЕНТЕ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОИСХОДИТ**

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) боковое сгибание туловища

**378. [T004207] В ЧЕТВЕРТОМ МОМЕНТЕ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОИСХОДИТ**

- А) разгибание головки
- Б) сгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) боковое сгибание туловища

**379. [T004208] КОЛИЧЕСТВО МОМЕНТОВ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 5
- Б) 4
- В) 3
- Г) 6

**380. [T004209] СХОЖИМИ МОМЕНТАМИ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ВИДАХ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) боковое сгибание в поясничном отделе
- Г) боковое сгибание в шейно-грудном отделе

**381. [T004210] ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- А) полным раскрытием маточного зева
- Б) рождением ребенка
- В) рождением последа
- Г) прорезыванием головки плода

**382. [T004211] АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ НАЧИНАЮТ ОКАЗЫВАТЬ**

- А) при прорезывании головки плода
- Б) после рождения головки плода
- В) после рождения плечиков плода
- Г) при угрозе разрыва промежности

**383. [T004212] СПОСОБ АБУЛАДЗЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ**

- А) наличии признаков отделения плаценты и отсутствии самостоятельного рождения последа
- Б) кровотечении из влагалища
- В) задержки в матке дольки плаценты
- Г) задержки в матке оболочек

**384. [T004213] ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ**

- А) рождения плода
- Б) отделения плаценты
- В) пересечения пуповины плода
- Г) рождения плечиков

**385. [T004214] ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С ЦЕНТРА НАЗВАНО СПОСОБОМ**

- А) Шульцца
- Б) Дункана
- В) Шредера
- Г) Гентера

**386. [T004215] ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С КРАЯ НАЗВАНО СПОСОБОМ**

- А) Дункана
- Б) Шредера
- В) Гентера
- Г) Шульцца

**387. [T004216] ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- А) темпу сглаживания и раскрытия шейки матки
- Б) частоте и продолжительности схваток
- В) времени излития околоплодных вод
- Г) длительности родов

**388. [T004217] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) разгибание головки
- Б) сгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) внутренний поворот плечиков

**389. [T004218] МАЛЫЙ РОДНИЧОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ**

- А) переднем виде затылочного предлежания
- Б) заднем виде затылочного предлежания
- В) лобном предлежании
- Г) переднетеменном предлежании

**390. [T004219] ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) наличия признаков отделения плаценты
- Б) длительности первого периода родов
- В) длительности второго периода родов
- Г) длительности безводного периода

**391. [T004220] САМОЙ ВАЖНОЙ ТЕМОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) физиология родов
- Б) внутриутробное развитие плода
- В) медикаментозное обезболивание родов
- Г) уход за новорожденным

**392. [T004221] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ СЧИТАЮТСЯ**

- А) групповые занятия
- Б) индивидуальные занятия
- В) самостоятельное самообучение
- Г) занятия он-лайн

**393. [T004225] АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ФИЗИОПРОФИЛАКТИКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) угроза прерывания данной беременности
- Б) нежелание женщины
- В) токсикозы первой половины беременности
- Г) дисфункция вегетативной нервной системы

**394. [T004226] ГЛАВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

- А) реже наблюдается слабость родовой деятельности
- Б) сокращается продолжительность родов
- В) реже наблюдается асфиксия плода
- Г) реже наблюдается преждевременное отхождение вод

**395. [T004229] ДОЛЖНЫ ЛИ В ПСИХОПРОФИЛАКТИКУ ВХОДИТЬ ЛЕКЦИИ О ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ**

- А) должны
- Б) нет, важно думать о родах
- В) все вопросы надо решать по мере поступления
- Г) грудное вскармливание это естественный процесс он не требует подготовки

**396. [T004383] ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 10-12
- Б) 20-22
- В) 23-25
- Г) 26-28

**397. [T004384] ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 30-32
- Б) 32-40
- В) 20-22
- Г) 22-24

**398. [T004385] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 40
- Б) 32
- В) 24
- Г) 18

**399. [T004386] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В МЕСЯЦАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8

**400. [T004387] ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНО ФОРМИРУЮТСЯ В ПЕРИОД**

- А) эмбриональный
- Б) плацентарный
- В) интранатальный
- Г) постнатальный

**401. [T004388] АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД**

- А) новорожденности
- Б) внутриутробный
- В) грудной
- Г) пубертатный

**402. [T004389] ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- А) I
- Б) II
- В) III
- Г) IV

**403. [T004390] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 7
- Б) 3
- В) 5
- Г) 10

**404. [T004391] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗДНЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

- А) с 7-го по 28-й
- Б) с 5-го по 15-й
- В) с 7-го по 20-й
- Г) с 10-го по 30-й

**405. [T004392] СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 3000-3500
- Б) 2000-2500
- В) 2500-3000
- Г) 3500-4000

**406. [T004393] СРЕДНЯЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 50-54
- Б) 55-59
- В) 46-49
- Г) 42-45

**407. [T004394] МИНИМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2500
- Б) 2000
- В) 2300
- Г) 2700

**408. [T004395] МИНИМАЛЬНЫЙ РОСТ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 46
- Б) 47
- В) 49
- Г) 50

**409. [T004396] ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) лицевая часть мала по сравнению с мозговой
- Б) морщинистая кожа
- В) половая щель зияет
- Г) писклявый крик

**410. [T004397] У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ**

- А) громкий крик
- Б) низкое расположение пупочного кольца
- В) мышечная гипотония
- Г) непропорциональное телосложение

**411. [T004398] ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 38 – 42
- Б) 28 – 30
- В) 32 – 34
- Г) 35 – 37

**412. [T004399] ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР В БАЛЛАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 8 – 10
- Б) 2 – 4
- В) 5 – 7
- Г) 10 – 12

**413. [T004400] ПУШКОВЫЕ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) ланugo
- Б) стридор
- В) склерема
- Г) себорея

**414. [T004401] ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) циклично
- Б) хаотично
- В) по половому признаку
- Г) по шкале Апгар

**415. [T004402] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ**

- А) в родильном зале
- Б) после перевода в послеродовое отделение
- В) через 6 часов после родов
- Г) на вторые сутки после родов

**416. [T004403] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) тетрациклическую мазь
- Б) фурацилин
- В) хлорид натрия
- Г) полиглюкин

**417. [T004404] СКОБКА НА ПУПОВИНУ ОТ ГРАНИЦЫ КОЖИ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ**

- А) 1 см
- Б) 5 мм
- В) 1 мм
- Г) 3 см

**418. [T004406] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ ПРИВОДИТ К**

- А) получению материнской микробной флоры
- Б) ранней эпителизации пупочной ранки
- В) исчезновению физиологической эритемы
- Г) нормализации дыхания

**419. [T004407] ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 40-60
- Б) 16-20
- В) 30-35
- Г) 100-120

**420. [T004408] ДЫХАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК**

- А) аритмичное поверхностное
- Б) ритмичное глубокое
- В) ритмичное поверхностное
- Г) аритмичное глубокое

**421. [T004409] К ОСОБЕННОСТИМ СТРОЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСЯТСЯ ПРИЗНАКИ**

- А) носовые ходы узкие, хорошая васкуляризация
- Б) носовые ходы узкие, слабая васкуляризация
- В) носовые ходы широкие, хорошая васкуляризация
- Г) носовые ходы широкие, слабая васкуляризация

**422. [T004410] ДЛЯ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНА ОСОБЕННОСТЬ**

- А) короткая и широкая
- Б) короткая и узкая
- В) длинная и широкая
- Г) длинная и узкая

**423. [T004411] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ**

- А) 120-140
- Б) 110-120
- В) 90-100
- Г) 70-80

**424. [T004412] АПНОЭ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) остановкой дыхания
- Б) остановкой сердца
- В) общим цианозом
- Г) приступом судорог

**425. [T004413] ДЛЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ ОСОБЕННОСТИ**

- А) хорошо развиты
- Б) не сформированы
- В) не имеют протоков
- Г) развиты, но не функционируют

**426. [T004414] У НОВОРОЖДЕННОГО ПЛОХО РАЗВИТА ФУНКЦИЯ КОЖИ**

- А) защитная
- Б) дыхательная
- В) выделительная
- Г) образовательная

**427. [T004415] У ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ВСЕГДА ОТКРЫТ РОДНИЧОК**

- А) большой
- Б) малый
- В) правый боковой
- Г) левый боковой

**428. [T004416] У НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ**

- А) гипертония мышц-сгибателей
- Б) гипертония мышц-разгибателей
- В) гипотония мышц-сгибателей
- Г) гипотония мышц-разгибателей

**429. [T004417] КАРДИАЛЬНЫЙ СФИНКТЕР НОВОРОЖДЕННОГО РАЗВИТ**

- А) плохо
- Б) хорошо
- В) очень хорошо
- Г) удовлетворительно

**430. [T004418] ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО**

- А) высокая
- Б) незначительная
- В) слабая
- Г) не выражена

**431. [T004419] СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ К СРЫГИВАНИЮ ОБУСЛОВЛЕНА**

- А) слабым развитием кардиального сфинктера
- Б) хорошим развитием кардиального сфинктера
- В) слабым развитием пилорического сфинктера
- Г) хорошим развитием пилорического сфинктера

**432. [T004420] ФАКТОРАМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИМИ СОСАНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) комочки Биша, большой язык
- Б) комочки Биша, маленький язык
- В) обильное слюнотечение, большой язык
- Г) обильное слюнотечение, маленький язык

**433. [T004421] ЕМКОСТЬ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 30-35
- Б) 50-55
- В) 100-155
- Г) 250-300

**434. [T004422] ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 30-50
- Б) 50-70
- В) 70-80
- Г) 80-100

**435. [T004423] К ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ ПРИЗНАК**

- А) малая воздушность
- Б) большое количество альвеол
- В) мало соединительной ткани
- Г) много эластической ткани

**436. [T004424] ЧИСЛО МОЧЕИСПУСКАНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 20-25
- Б) 15-20
- В) 8-10
- Г) 6-8

**437. [T004425] СЕРДЦЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- А) горизонтальное
- Б) с наклоном влево
- В) с наклоном вправо
- Г) вертикальное

**438. [T004426] КОСТНАЯ ТКАНЬ НОВОРОЖДЕННОГО**

- А) склонна к деформации
- Б) плохо кровоснабжена
- В) содержит мало воды
- Г) бедна органическими веществами

**439. [T004427] ОСОБЕННОСТЬЮ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отсутствие изгибов
- Б) шейный лордоз
- В) грудной кифоз
- Г) поясничный лордоз

**440. [T004428] ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО НАБЛЮДАЕТСЯ В ДНИ ЖИЗНИ**

- А) 3-4-й
- Б) 5-6-й
- В) 1-2-й
- Г) 7-8-й

**441. [T004429] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ В % ДО**

- А) 8
- Б) 14
- В) 20
- Г) 30

**442. [T004430] СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 7-10
- Б) 3-4
- В) 15-20
- Г) 25-30

**443. [T004431] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 3-4
- Б) 1-2
- В) 5-6
- Г) 7-8

**444. [T004432] ПОЛОВОЙ КРИЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- А) увеличением грудных желез
- Б) повышением температуры тела
- В) увеличением массы тела
- Г) снижением температуры тела

**445. [T004433] СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОЛОВОГО КРИЗА У НОВОРОЖДЕННОГО В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ**

- А) 2-3
- Б) 3-4
- В) 5-6
- Г) 6-7

**446. [T004434] ПРИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УБЫЛИ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) потеря жидкости
- Б) разрушение эритроцитов
- В) накопление билирубина в крови
- Г) перестройка обменных процессов

**447. [T004435] ПРИЧИНОЙ ПОЛОВОГО КРИЗА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) переход гормонов матери к ребенку
- Б) перестройка обменных процессов
- В) разрушение эритроцитов
- Г) потеря жидкости

**448. [T004436] СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ В ДНЯХ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЮТ**

- А) 10-12-й
- Б) 7-8-й
- В) 5-6-й
- Г) 3-4-й

**449. [T004437] ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) желтушное окрашивание кожи
- Б) вялость
- В) темное окрашивание мочи
- Г) отказ от груди

**450. [T004438] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- А) половой криз
- Б) метеоризм
- В) диарея
- Г) гипертонус мышц

**451. [T004439] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННЫХ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 22 – 24
- Б) 20 – 21
- В) 18 – 19
- Г) 24 – 25

**452. [T004440] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 5 – 7
- Б) 1 – 4
- В) 8 – 11
- Г) 12 - 15

**453. [T004441] ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ВАННА НОВОРОЖДЕННОМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ**

- A) ежедневно
- Б) через день
- В) через три дня
- Г) по мере необходимости

**454. [T004442] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ СКЛАДКИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ**

- A) стерильным растительным маслом
- Б) физиологическим раствором
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором альбуцида

**455. [T004443] ВО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО ТУАЛЕТА НОВОРОЖДЕННОГО ГЛАЗА ОБРАБАТЫВАЮТ**

- A) кипяченой водой
- Б) ретинолом
- В) раствором альбуцида
- Г) перекисью водорода

**456. [T004444] ПУПОВИННЫЙ ОСТАТОК ОТПАДАЕТ НА ДЕНЬ ЖИЗНИ**

- A) 3 – 4
- Б) 5 – 7
- В) 8 – 10
- Г) 12 – 14

**457. [T004445] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) ватные жгутики, смоченные растительным маслом
- Б) сухие ватные жгутики
- В) ватные шарики
- Г) марлевые шарики

**458. [T004446] ПОЛОСТЬ РТА ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОТИРАЮТ**

- А) только при крайней необходимости
- Б) один раз в день
- В) три раза в день
- Г) после каждого кормления

**459. [T004447] МЕКОНИЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО**

- А) в первые 2-3 дня
- Б) в течение первой недели
- В) до 2 недель жизни
- Г) в течение первого месяца жизни

**460. [T004448] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) сухие ватные жгутики
- Б) жгутики, смазанные стерильным маслом
- В) марлевые шарики
- Г) жгутики с фурацилином

**461. [T004449] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 37
- Б) 38
- В) 35
- Г) 40

**462. [T004450] ПОСЛЕ КУПАНИЯ КОЖУ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ**

- А) стерильным растительным маслом
- Б) фурацилином
- В) фукарцином
- Г) спиртовым раствором

**463. [T004451] ПАТРОНАЖ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ОБУЧАЮТ МАМУ УХОДУ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) первый врачебно-сестринский
- Б) первый дородовый
- В) второй дородовый
- Г) целевой патронаж

**464. [T004452] ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ЖИЗНИ**

- А) 3 – 7
- Б) 1 – 3
- В) 8 – 12
- Г) 15 – 19

**465. [T004453] ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**

- А) туберкулеза
- Б) дифтерии
- В) коклюша
- Г) кори

**466. [T004454] ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ**

- А) 4 – 6 недель
- Б) 2 – 3 дня
- В) 2 – 3 месяца
- Г) 6 – 8 месяцев

**467. [T004455] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ**

- А) в первые 12 часов жизни
- Б) на 3 – 7 день
- В) на 8 – 12 день
- Г) на 15 – 19 день

**468. [T004456] ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ВВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННОМУ**

- А) внутримышечно в бедро
- Б) внутрикожно в плечо
- В) подкожно в предплечье
- Г) внутримышечно в ягодицу

**469. [T004457] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) кровь
- Б) меконий
- В) мочу
- Г) слюну

**470. [T004458] НОВОРОЖДЕННОМУ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВСКАРМЛИВАНИЕ**

- А) естественное
- Б) смешанное
- В) искусственное
- Г) парентеральное

**471. [T004459] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ГРУДНОГО МОЛОКА ПЕРЕД КОРОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) оптимальное соотношение пищевых веществ
- Б) высокое содержание белка
- В) высокое содержание витаминов
- Г) высокая калорийность

**472. [T004460] ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ МАТЕРИ ПРОВОДЯТ**

- А) сразу после рождения
- Б) через 6 часов
- В) через 12 часов
- Г) через 24 часа

**473. [T004461] НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ ДОКОРМ НАЗНАЧАЮТ ПРИ**

- А) гипогалактии
- Б) недостатке витаминов
- В) расстройстве питания
- Г) избытке веса

**474. [T004462] КОНТРОЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- А) количества высосанного молока из груди матери
- Б) массы тела
- В) количества прикорма
- Г) усвоения пищи

**475. [T004463] ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 3
- Б) 1
- В) 5
- Г) 8

**476. [T004464] СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МОЛОКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1/5 от массы тела
- Б) 1/6 от массы тела
- В) 1/7 от массы тела
- Г) 1/8 от массы тела

**477. [T004465] КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 6
- Б) 7
- В) 5
- Г) 4

**478. [T004466] СИМПТОМЫ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК ОБЪЯСНЯЮТСЯ**

- А) высоким содержанием мочевой кислоты
- Б) примесью крови в моче
- В) высоким содержанием белка
- Г) выделением билирубина с мочой

**479. [T004467] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДОКОРМОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) молочная смесь
- Б) молочная каша
- В) овощное пюре
- Г) яблочный сок

**480. [T004468] ЦЕЛЬЮ ВВЕДЕНИЯ ДОКОРМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) обеспечение недостающего суточного и разового объема питания
- Б) увеличение поступления соли в организм
- В) увеличение поступления жиров
- Г) уменьшение количества материнского молока

**481. [T004469] ПРИЗНАКОМ НЕДОКОРМА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выраженное беспокойство
- Б) частое мочеиспускание
- В) обильный стул
- Г) повышение температуры

**482. [T004470] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ РЕБЕНКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ**

- А) смесь «Бона»
- Б) кипяченую воду
- В) манную кашу
- Г) картофельное пюре

**483. [T004471] АДАПТИРОВАННОЙ СМЕСЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ СМЕСЬ**

- А) приближенная по составу к женскому молоку
- Б) которая нравится ребенку
- В) обогащенная белками
- Г) обогащенная жирами

**484. [T004472] К АДАПТИРОВАННЫМ СЛАДКИМ ДЕТСКИМ МОЛОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСИТСЯ**

- А) «Хипп комбиотик»
- Б) «Наринэ»
- В) коровье молоко
- Г) «Бифилакт»

**485. [T004473] К АДАПТИРОВАННЫМ КИСЛЫМ ДЕТСКИМ МОЛОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСИТСЯ**

- А) «Бифилакт»
- Б) цельный кефир
- В) «Симила克»
- Г) «Хипп комбиотик»

**486. [T004474] ДОКОРМ ВВОДИТСЯ**

- А) после кормления грудным молоком
- Б) до кормления грудным молоком
- В) между кормлениями
- Г) «по требованию»

**487. [T004475] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЮТ**

- А) прием жидкости за 20 минут до кормления
- Б) ограничение жидкости
- В) ограничение белков
- Г) прием пряностей за 20 минут до кормления

**488. [T004476] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОРМЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО**

- А) «по требованию»
- Б) через 4 часа
- В) через 3 часа
- Г) через 2 часа

**489. [T004477] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ ГРУДИ МАТЕРИ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 30
- Б) 10
- В) 40
- Г) 60

**490. [T004478] СЦЕЖИВАНИЕ ОСТАТКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- А) профилактики гипогалактии
- Б) профилактики гипотрофии
- В) снижения иммунитета
- Г) повышения иммунитета

**491. [T004479] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отсутствие молока
- Б) самопроизвольное истечение молока
- В) затруднение выделения молока
- Г) быстрое поступление молока

**492. [T004480] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА СМЕШАННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) недокорм
- Б) паратрофия
- В) срыгивание
- Г) дисфагия

**493. [T004481] СМЕСЬ ИЗ СОСКИ ДОЛЖНА ВЫТЕКАТЬ**

- А) редкими каплями
- Б) быстро
- В) обильно
- Г) тонкой струйкой

**494. [T004482] ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ**

- А) бифидобактерии
- Б) кишечная палочка
- В) энтерококки
- Г) протей

**495. [T004483] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ**

- А) энтерококки
- Б) бифидобактерии
- В) пневмококки
- Г) хламидии

**496. [T004484] СУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ ДЛЯ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ В ЛИТРАХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ**

- А) 2.0 – 2.5
- Б) 0.5 – 1.0
- В) 1.0 – 1.5
- Г) 3.0 – 3.5

**497. [T004485] В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО МОЛОКА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) молочные смеси
- Б) фруктовые соки
- В) овощные отвары
- Г) молочные каши

**498. [T004486] ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСОВ В ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ**

- А) порока сердца
- Б) пневмонии новорожденного
- В) асфиксии новорожденного
- Г) гемолитической болезни новорожденного

**499. [T004487] ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) знакомство с семьей будущего новорожденного
- Б) обучение женщины уходу за новорожденным
- В) контроль состояния беременной
- Г) информирование о заболеваниях у детей раннего возраста

**500. [T004488] ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) обучение созданию благоприятных условий для новорожденного дома
- Б) выяснение анамнеза беременности
- В) выяснение профессиональных вредностей у родителей
- Г) постановка на учет в женской консультации

**501. [T004489] ОСОБЕННОСТЬЮ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) нежная, легкоранимая, сухая
- Б) плохое кровоснабжение
- В) бедна водой
- Г) плохая регенерация

**502. [T004490] ОСОБЕННОСТЬЮ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) плохое развитие кардиального сфинктера
- Б) плохое кровоснабжение
- В) вертикальное положение
- Г) малый объем

**503. [T004491] К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) сальные железы
- Б) лимфатические узлы
- В) слюнные железы
- Г) железы внутренней секреции

**504. [T004492] В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ ЧАСТОТА СТУЛА В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 4 – 6
- Б) 1 – 2
- В) 10 – 12
- Г) 20 – 25

**505. [T004493] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- А) иммуноглобулина А
- Б) иммуноглобулина М
- В) свободного билирубина
- Г) насыщенных жиров

**506. [T004494] ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гиперемия и шелушение кожи
- Б) желтушное окрашивание
- В) общий цианоз кожи
- Г) бледность, «мраморный» рисунок

**507. [T004495] УХОД ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) смазывание кожи стерильным растительным маслом
- Б) обработку кожи бриллиантовой зеленью
- В) обильное питье
- Г) свободное пеленание

**508. [T004496] ПРИЧИНОЙ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) накопление в организме кристаллов мочевой кислоты
- Б) воспалительный процесс
- В) недостаток железа
- Г) недостаток кальция и фосфора

**509. [T004497] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) экстрагенитальное заболевание в стадии декомпенсации
- Б) гипогалактия
- В) физиологическая желтуха новорожденного
- Г) отсутствие молока

**510. [T004498] СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ЗРЕЛОГО МОЛОКА» У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ**

- А) 2 – 3
- Б) 1 – 3
- В) 4 – 5
- Г) 3 – 4

**511. [T004499] СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2:1
- Б) 1:2
- В) 3:1
- Г) 2:4

**512. [T004500] БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У НОВОРОЖДЕННОГО ИМЕЕТ ФОРМУ**

- А) ромбовидную
- Б) овальную
- В) окружлую
- Г) треугольную

**513. [T004501] ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гипертонус мышц - сгибателей
- Б) мышечная гипотония
- В) тремор конечностей
- Г) гипертонус мышц - разгибателей

**514. [T004502] ПОД РЕФЛЕКСОМ БАБКИНА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС**

- А) ладонно-ротовой
- Б) хватания
- В) ползания
- Г) охватывания

**515. [T004503] ПОД РЕФЛЕКСОМ ПОЛЗАНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС**

- А) Бауэра
- Б) Моро
- В) Бабкина
- Г) Робинсона

**516. [T004504] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПУПОВИНУ НАКЛАДЫВАЮТ ЗАЖИМЫ КОХЕРА**

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

**517. [T004505] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО**

- А) в родильном зале
- Б) после перевода в послеродовое отделение
- В) в течение суток
- Г) на вторые сутки после родов

**518. [T004506] НАГРУБАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОСЛЕ РОДОВ ЧАЩЕ ВСЕГО НАСТУПАЕТ С СУТОК**

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 4

**519. [T004507] ПРИЧИНОЙ ТРЕЩИН НА СОСКАХ У РОДИЛЬНИЦЫ ЧАЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) неправильное прикладывание ребенка к груди
- Б) гипогалактия
- В) нагрубание молочных желез
- Г) не соблюдение женщиной гигиены

**520. [T004508] МАССОЙ ТЕЛА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СЧИТАЮТ РЕЗУЛЬТАТ ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ**

- А) 1 часа
- Б) 2 часов
- В) 1 суток
- Г) 2 суток

**521. [T004510] НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЛАКТИНА У ЖЕНЩИНЫ  
ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ**

- А) сна
- Б) физической активности
- В) состояния покоя
- Г) кормления

**522. [T004819] НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

- А) внутривенно
- Б) подкожно
- В) внутримышечно
- Г) сублингвально

**523. [T004820] СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВАЛИДОЛ» ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сублингвальный
- Б) пероральный
- В) ректальный
- Г) внутривенный

**524. [T004821] ПОД ЭНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ**

- А) ректальный
- Б) подкожный
- В) ингаляционный
- Г) внутривенный

**525. [T004822] ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) эргометринамалеат
- Б) динопрост
- В) сальбутамол
- Г) магния сульфат

**526. [T004823] ПРЕДНИЗОЛОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ГРУППЕ**

- А) глюокортикоиды
- Б) мочегонные средства
- В) снотворные средства
- Г) антигистаминные средства

**527. [T004824] К АНТИГИСТАМИННЫМ СРЕДСТВАМ, БЛОКИРУЮЩИМ Н1 ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ОТНОСИТСЯ**

- А) лоратадин
- Б) валериана
- В) капотен
- Г) глюкоза

**528. [T004825] ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) местное
- Б) резорбтивное
- В) рефлекторное
- Г) кумулятивное

**529. [T004826] РАСТВОР БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) красители
- Б) антибиотики
- В) противовирусные
- Г) антигистаминные

**530. [T004827] К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) альмагель
- Б) мотилиум
- В) ранитидин
- Г) рифампицин

**531. [T004828] ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ПРИВОДЯЩЕЕ К ГИБЕЛИ ЗАРОДЫША**

- А) эмбриотокическое
- Б) эмбриолетальное
- В) мутагенное
- Г) фетотокическое

**532. [T004829] ПРИ ВВЕДЕНИИ БЕТА АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ**

- А) гипотрофия плаценты и плода
- Б) потеря слуха
- В) поражение кожных покровов
- Г) геморрагический синдром

**533. [T004830] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) амоксицилин
- Б) тетрациклин
- В) ванкомицин
- Г) гентамицин

**534. [T004831] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- А) перекись водорода
- Б) фурациллин
- В) омепрозол
- Г) диакарб

**535. [T004832] АНТИСЕПТИК, КОТОРЫЙ ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА**

- А) борная кислота
- Б) фурациллин
- В) перекись водорода
- Г) бриллиантовый зеленый

**536. [T004833] НАРУШЕНИЕ РОСТА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ**

- А) тетрациклина
- Б) ампициллина
- В) цефтриаксона
- Г) джозамицина

**537. [T004834] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОМИЦЕТИНА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) «серый синдром»
- Б) угнетение функции почек
- В) угнетение функции печени
- Г) дисбактериоз

**538. [T004835] К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) ацикловир
- Б) ремантадин
- В) зидовутдин
- Г) азитромицин

**539. [T004836] НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- А) кавинтон
- Б) супрастин
- В) валидол
- Г) этилизол

**540. [T004837] ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) окситоцин
- Б) прогестерон
- В) анальгин
- Г) амоксиклав

**541. [T004838] СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ**

- А) проводится по показаниям
- Б) проводится при инфекционных заболеваниях
- В) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе
- Г) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете

**542. [T004839] БОЛЬНЫМ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК ПРОТИВОПОКАЗАНЫ**

- А) гентамицин
- Б) пефлоксацин
- В) стрептомицин
- Г) пипольфен

**543. [T004840] БЕРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАН**

- А) стрептомицин
- Б) ванкомицин
- В) арбидол
- Г) азитромицин

**544. [T004841] ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ**

- А) кандидоз полости рта
- Б) лунообразное лицо
- В) стероидный диабет
- Г) стероидная язва

**545. [T004842] К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) дифлюкан
- Б) пирацетам
- В) пантогам
- Г) омнопон

**546. [T004843] К ИНГИБИТОРАМ АПФ ОТНОСИТСЯ**

- А) каптоприл
- Б) анаприлин
- В) нитроглицерин
- Г) диакарб

**547. [T004844] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ**

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) анаприлин
- В) морфин
- Г) сумамед

**548. [T004845] ГИПОТИАЗИД СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ**

- А) утром с препаратами калия
- Б) вечером с препаратами калия
- В) утром
- Г) вечером

**549. [T004846] АЛЬМАГЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) антациды
- Б) н2гистаминоблокаторы
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) антигистаминные

**550. [T004848] К МЯГКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) паста
- Б) таблетка
- В) раствор
- Г) аэрозоль

**551. [T004849] АЛЬБУМИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) плазмозаменители
- Б) ненаркотические анальгетики
- В) антибиотики
- Г) антикоагулянты

**552. [T004850] К ВИТАМИНАМ , НАЗНАЧАЕМЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ,ОТНОСИТСЯ**

- А) эргокальциферол
- Б) ретинол
- В) аскорбиновая кислота
- Г) пиридоксин

**553. [T004851] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кровотечение в раннем послеродовом периоде
- Б) удушье
- В) приступ стенокардии
- Г) гипертонический криз

**554. [T004852] К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ**

- А) метилэрлометрин
- Б) гепарин
- В) аскорбиновая кислота
- Г) конвулекс

**555. [T004853] ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кардиотонический
- Б) антиангинальный
- В) диуретический
- Г) желчегонный

**556. [T004854] ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАРАЦЕТАМОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) анальгезирующий
- Б) желчегонный
- В) противоаллергический
- Г) антибактериальный

**557. [T004855] К СЕДАТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) валериана
- Б) женьшень
- В) настойка календулы
- Г) левзея

**558. [T004856] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ЦЕРУКАЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) противорвотное
- Б) антиаритмическое
- В) гипотензивное
- Г) диуретическое

**559. [T004857] ПОД РАЗОВОЙ ДОЗОЙ ПОНИМАЮТ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА ПРИНЯТОЕ**

- А) за один прием
- Б) в течение суток
- В) за три приема
- Г) в удвоенной средней терапевтической дозе принятой за один прием

**560. [T004858] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) усиление лактации
- Б) уменьшение лактации
- В) повышает АД
- Г) гипогликемия

**561. [T004859] ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) раствор
- Б) таблетка
- В) мазь
- Г) порошок

**562. [T004860] ДИАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) транквилизатор
- Б) анальгетик
- В) муколитик
- Г) антибиотик

**563. [T004862] К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ**

- А) гепарин
- Б) аспирин
- В) диклофенак- натрия
- Г) ибуклин

**564. [T004863] К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) эссенциале
- Б) аспирин
- В) пирацетам
- Г) лазолван

**565. [T004864] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ДИМЕДРОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) крапивница
- Б) ринит
- В) головная боль
- Г) судороги

**566. [T004865] НИТРОГЛИЦЕРИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) нитраты
- Б) антикоагулянты
- В) антибиотики
- Г) анальгетики

**567. [T004866] АЛЛОХОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) желчегонные
- Б) противорвотные
- В) гемостатические
- Г) антисептики

**568. [T004867] ВЛИЯНИЕ КОАГУЛЯНТОВ НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ**

- А) повышают
- Б) не изменяют
- В) угнетают
- Г) понижают

**569. [T004868] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ АНТИБИОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) антимикробное
- Б) жаропонижающее
- В) противоаллергическое
- Г) адсорбирующее

**570. [T004869] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) головная боль, гипотензия
- Б) гипертермия
- В) сужение коронарных артерий
- Г) расширение коронарных артерий

**571. [T004870] СИМПТОМОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) пиурия

**572. [T004872] СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- А) галидор
- Б) де-нол
- В) пепсин
- Г) фестал

**573. [T004873] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ УРОСЕПТИК**

- А) невиграмон
- Б) лазикс
- В) гепарин
- Г) баралгин

**574. [T004874] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА "СУПРАСТИН"  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сонливость
- Б) алопеция
- В) лихорадка
- Г) запор

**575. [T004875] СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА  
ЗАВИСИТ ОТ**

- А) дозы
- Б) периода полувыведения
- В) способа приема
- Г) объема распределения

**576. [T004876] ДИАПАЗОН МЕЖДУ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  
МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ЛЕКАРСТВА В  
ПЛАЗМЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) широтой терапевтического действия
- Б) периодом полувыведения
- В) тахифилаксией
- Г) толерантностью

**577. [T004877] ПРИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) блокаторы кальциевых каналов
- Б) бета адреноблокаторы
- В) альфа адреноблокаторы
- Г) нитраты

**578. [T004878] К ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) беклометазон
- Б) преднизолон
- В) дексаметазон
- Г) полькорталон

**579. [T004879] ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кандидоз полости рта
- Б) головная боль
- В) полиурия
- Г) тошнота

**580. [T004880] РАННИМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) стероидный диабет
- Б) катаркта
- В) миопатия
- Г) остеопороз

**581. [T004881] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) атропин
- Б) прозерин
- В) унитиол
- Г) мускарин

**582. [T004882] К КРИСТАЛЛОИДНЫМ ИНФУЗИОННЫМ ПРЕПАРАТАМ  
ОТНОСИТСЯ**

- А) 0,9% раствор натрия хлорида
- Б) желатиноль
- В) полиглюкин
- Г) реополиглюкин

**583. [T004883] ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО  
ВВЕСТИ ВНУТРИВЕННО**

- А) адреналин
- Б) преднизолон
- В) аспирин
- Г) дицинон

**584. [T004884] ПРИ ЛИХОРАДКЕ СВЫШЕ 39 ГРАДУСОВ У ДЕТЕЙ  
ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- А) ацетилсалициловой кислоты
- Б) парацетамола
- В) ибупрофена
- Г) анальгина

**585. [T004885] КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ , ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ  
ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) спирт 70%
- Б) фурацилин
- В) спирт 40%
- Г) перекись водорода

**586. [T004886] ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН  
ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) этиотропная
- Б) патогенетическая
- В) симптоматическая
- Г) заместительная

**587. [T004887] ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) симптоматическая
- Б) патогенетическая
- В) этиотропная
- Г) заместительная

**588. [T004888] К ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ОБЛАДАЮЩЕЙ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- А) порошок
- Б) карамель
- В) паста
- Г) мазь

**589. [T004889] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ АНТИДОТ**

- А) унитиол
- Б) атропин
- В) налорфин
- Г) бемегрид

**590. [T004890] ВСАСЫВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, БИОТРАНСФОРМАЦИЮ И ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗУЧАЕТ**

- А) фармакокинетика
- Б) фармакодинамика
- В) фармакопея
- Г) хронофармакология

**591. [T004891] БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА В**

- А) системном кровотоке
- Б) моче
- В) желудочном соке
- Г) панкреатическом соке

**592. [T004892] БОЛЬНЫМ С НЕВРИТОМ СЛУХОВОГО НЕРВА ПРОТИВОПОКАЗАН**

- А) стрептомицин
- Б) но-шпа
- В) фестал
- Г) нитроглицерин

**593. [T004893] АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пефлоксацин
- Б) карбенициллин
- В) рифампицин
- Г) стрептомицин

**594. [T004894] ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К**

- А) бронхоскопии
- Б) томографии
- В) рентгеноскопии
- Г) флюорографии

**595. [T004895] ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ**

- А) бициллин
- Б) рифампицин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

**596. [T004896] ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭФФЕКТИВЕН**

- А) амоксициллин
- Б) фурагин
- В) пенициллин
- Г) фамотидин

**597. [T004897] ЦИМЕТИДИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) H2гистаминоблокаторы
- Б) холинолитики
- В) спазмолитики
- Г) анальгетики

**598. [T004899] ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРОТИВОПОКАЗАН**

- А) морфин
- Б) омнопон
- В) атропин
- Г) папаверин

**599. [T004900] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) интерферон
- Б) папаверин
- В) холосас
- Г) пенициллин

**600. [T004901] ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ ЭФФЕКТИВЕН**

- А) пенициллин
- Б) фурадонин
- В) изониазид
- Г) оmez

**601. [T004902] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ АДРЕНОБЛОКАТОР**

- А) атенолол
- Б) лазикс
- В) оmez
- Г) изоптин

**602. [T004904] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ Н2-ГИСТАМИНОБЛОКАТОР**

- А) фамотидин
- Б) вентер
- В) маалокс
- Г) платифиллин

**603. [T004905] ХЕНОФАЛЬК ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) холеретики
- Б) анальгетики
- В) спазмолитики
- Г) уросептики

**604. [T004908] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ФЕНКАРОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сонливость
- Б) запор
- В) лихорадка
- Г) аллопеция

**605. [T004909] ДЕ-НОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) гастропротекторы
- Б) гепатопротекторы
- В) холинолитики
- Г) слабительные

**606. [T004910] ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) фамотидин
- Б) сайтотек
- В) солкосерил
- Г) но-шпа

**607. [T004911] ОМЕЗ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) блокаторы протонового насоса
- Б) блокаторы гистаминовых H<sub>2</sub>-рецепторов
- В) М-холиноблокаторы
- Г) блокаторы гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов;

**608. [T004912] ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ КАШЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) либексин
- Б) тавегил
- В) мукалтин
- Г) гентамицин

**609. [T004913] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБДАДАЮЩИЙ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) де-нол
- Б) гастал
- В) омепразол
- Г) ранитидин

**610. [T004914] К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) внутривенный
- Б) сублингвальный
- В) ректальный
- Г) пероральный

**611. [T004916] К МУКОЛИТИКАМ ОТНОСЯТ**

- А) ацетилцистеин
- Б) сальметерол
- В) кодеин
- Г) кромогликат натрия

**612. [T004918] К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- А) цефазолин
- Б) беродуал
- В) винпоцетин
- Г) сумамед

**613. [T004919] ВАНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) гликопептиды
- Б) пенициллины
- В) макролиды
- Г) аминогликозиды

**614. [T004921] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ОТНОСИТСЯ**

- А) рондамицин
- Б) рифампицин
- В) сумамед
- Г) парацетамол

**615. [T004923] ЛИНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) линкозамиды
- Б) гликопептиды
- В) аминогликозиды
- Г) пенициллины

**616. [T004924] ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, РАССЛАБЛЯЮЩИМ МИОМЕТРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гинипрал
- Б) окситоцин
- В) динопрост
- Г) макропен

**617. [T004925] РЕФЛЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА**

- А) на орган через рефлекторную дугу
- Б) в месте его нанесения
- В) в токсических дозах
- Г) после накопления в организме

**618. [T004927] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БИОХИНОЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) сифилис
- Б) тонзиллит
- В) бронхит
- Г) трахеит

**619. [T004928] БИЙОХИНол относится к фармакологической группе препаратов**

- А) препараты висмута
- Б) антигистаминные
- В) антибиотики
- Г) анальгетики

**620. [T004929] Болезнь «БЕРИ-БЕРИ» развивается при недостатке витамина**

- А) тиамина бромид
- Б) рибофлавин
- В) эргокальциферол
- Г) цианокобаламин

**621. [T004987] Демографическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время характеризуется**

- А) нулевым естественным приростом
- Б) отрицательным естественным приростом
- В) увеличением естественного прироста
- Г) демографическим взрывом

**622. [T004988] Предметом изучения социальной гигиены (медицины) в обобщенном виде является**

- А) общественное здоровье и факторы, влияющие на него
- Б) здоровье индивидуума
- В) эпидемиология заболеваний
- Г) здоровье работающего населения

**623. [T004989] Основной фигурой в системе профилактики являются**

- А) участковые врачи поликлиники
- Б) специалисты центров Роспотребнадзора
- В) врачи центра медицинской профилактики
- Г) врачи психоневрологического диспансера

**624. [T004990] В ПОНЯТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВХОДЯТ ПЕРИОДЫ**

- А) антенатальный + интранатальный+ ранний неонатальный
- Б) антенатальный + интранатальный
- В) антенатальный + неонатальный
- Г) интранатальный + неонатальный + ранний неонатальный

**625. [T004991] ПОКАЗАТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) абсолютный прирост населения
- Б) темп прироста населения
- В) темп роста
- Г) показатель рождаемости

**626. [T004992] В ПОНЯТИЕ ПОСТНЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВХОДИТ ПЕРОД**

- А) со второго месяца жизни до года
- Б) первой недели жизни
- В) первых суток жизни
- Г) первого месяца жизни

**627. [T004993] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию
- Б) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением инвалидности
- В) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мероприятий по материальному обеспечению социально-незащищенных семей
- Г) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового риска по обязательному социальному страхованию

**628. [T004994] К СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ОТНОСЯТ**

- А) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- Б) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством
- В) обязательные платежи в Фонд обязательного медицинского страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- Г) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством.

**629. [T004995] ОТЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ (РАБОТОДАТЕЛЯ) НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)**

- А) 2,9
- Б) 26,0
- В) 3,1
- Г) 5,1

**630. [T004996] СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) фонд социального страхования
- Б) пенсионный Фонд
- В) фонд обязательного медицинского страхования
- Г) фонд регионального развития

**631. [T004997] В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНИМАЮТ**

- А) острые респираторные заболевания
- Б) травмы, отравления и несчастные случаи
- В) заболевания сердечно-сосудистой системы
- Г) заболевания периферической нервной системы

**632. [T004998] ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ**

- А) на 70 дней со дня рождения ребенка
- Б) на 90 дней со дня рождения ребенка
- В) на 156 дней со дня рождения ребенка
- Г) на 56 дней со дня рождения ребенка

**633. [T004999] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЕ ПЛОДА В ОСНОВНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) в акушерском отделении родильного дома
- Б) в женской консультации
- В) в поликлинике для взрослого населения
- Г) в отделении новорожденных родильного дома

**634. [T005000] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ ДО 15 ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ**

- А) детские поликлиники, женские консультации
- Б) диспансеры
- В) гинекологические отделения взрослых поликлиник
- Г) школьные врачи

**635. [T005001] ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) акушерские кровотечения
- Б) экстрагенитальная патология
- В) сепсис
- Г) гестозы

**636. [T005002] ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАНИМАЮТ БОЛЕЗНИ**

- А) воспалительные
- Б) врожденные аномалии
- В) осложнения беременности
- Г) онкологические

**637. [T005003] В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ**

- А) психические расстройства и расстройства поведения
- Б) болезни органов дыхания
- В) врожденные аномалии
- Г) болезни нервной системы

**638. [T005004] К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОТНОСИТСЯ**

- А) перинатальная смертность
- Б) младенческая смертность
- В) летальность
- Г) повозрастная смертность в детском возрасте

**639. [T005005] К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) младенческая смертность
- Б) мертворождаемость
- В) перинатальная смертность
- Г) ранняя неонатальная смертность

**640. [T005006] ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗАНИМАЮТ**

- А) внутричерепная родовая травма
- Б) врожденные пороки
- В) сепсис
- Г) гноино-септические заболевания новорожденных

**641. [T005007] ДОСТУПНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- А) развитием широкой сети медицинских организаций и наличием необходимого количества медицинских работников
- Б) производством и закупкой недостающих медикаментов за рубежом
- В) развитием широкой сети учебно-методических медицинских центров
- Г) финансированием научно-исследовательского сектора

**642. [T005008] ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В АКУШЕРСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) женская консультация
- Б) станция скорой медицинской помощи
- В) диспансер
- Г) поликлиника

**643. [T005009] МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА**

- А) сохранение здоровья
- Б) снижение летальности
- В) увеличение рождаемости
- Г) борьбу с абортами

**644. [T005010] СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ**

- А) 800
- Б) 750
- В) 700
- Г) 1200

**645. [T005011] ВЗНОС НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ В ФОНД МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

- А) работодателями
- Б) работающими гражданами
- В) администрацией муниципального образования
- Г) из бюджета РФ

**646. [T005012] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС) РЕГУЛИРУЕТСЯ**

- А) государством
- Б) фондами ОМС
- В) страховыми организациями
- Г) медицинскими учреждениями

**647. [T005013] ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) фонды медицинского страхования
- Б) индивидуальный бюджет
- В) инвестиции
- Г) федеральный бюджет

**648. [T005014] НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЦЕНЫ**

- А) тарифные
- Б) договорные
- В) свободные
- Г) бюджетные

**649. [T005015] ТИП ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ**

- А) регрессивный
- Б) стабильный
- В) прогрессивный
- Г) смешанный

**650. [T005016] ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

- А) родильного дома
- Б) поликлиники
- В) женской консультации
- Г) стационара

**651. [T005017] К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОсят**

- А) обязательное
- Б) коллективное
- В) индивидуальное
- Г) профессиональное

**652. [T005018] СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- A) страховой случай
- Б) типовой случай
- В) рисковый случай
- Г) страховой риск

**653. [T005019] ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГАРАНТИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БЮДЖЕТНО-СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- A) страховой полис
- Б) паспорт
- В) медицинская карта амбулаторного больного
- Г) медицинская карта стационарного больного

**654. [T005020] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ**

- А) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
- Б) получение медицинской помощи минимального объема
- В) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
- Г) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности

**655. [T005021] ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ**

- А) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх установленных программой ОМС
- Б) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского страхования
- В) может осуществляться только региональными фондами ОМС
- Г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского страхования.

**656. [T005022] ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) территориальной программой ОМС
- Б) лечебным учреждение
- В) Законом РФ «О медицинском страховании»
- Г) страховой компанией

**657. [T005023] СТРАХОВЩИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) страховая медицинская организация
- Б) гражданин обладатель страхового полиса
- В) тот, кто уплачивает страховые взносы
- Г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС

**658. [T005024] СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

- А) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи
- Б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении жалоб от пациентов
- В) участвует в аттестации медицинских работников
- Г) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений

**659. [T005025] ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 2-Х ИЛИ БОЛЕЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ**

- А) на 110 дней со дня рождения детей
- Б) на 90 дней со дня рождения детей
- В) на 156 дней со дня рождения детей
- Г) на 70 дней со дня рождения детей

**660. [T005026] ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)**

- А) 3,6
- Б) 26,0
- В) 3,1
- Г) 2,9

**661. [T005027] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ**

- А) законодательством РФ, на региональном уровне может увеличиваться
- Б) только законодательством РФ
- В) только законодательными актами субъектов РФ
- Г) законодательством РФ, на региональном уровне уменьшается

**662. [T005028] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СРОКИ**

- А) в любые сроки беременности
- Б) до 12 недель беременности
- В) до 22 недель беременности
- Г) до 28 недель беременности

**663. [T005029] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ**

- А) муж женщины
- Б) донор
- В) донор или муж женщины
- Г) никто не записывается

**664. [T005030] СОГЛАСИЕ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**

- А) обязательно получать в любом случае
- Б) необязательно получать
- В) необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- Г) необязательно, если имеется угроза его жизни

**665. [T005031] ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ФЗ РФ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»**

- А) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

**666. [T005032] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

- А) до 12 недель беременности
- Б) до 28 недель беременности
- В) в любые сроки беременности
- Г) до 22 недель беременности

**667. [T005033] МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ**

- А) только по письменному заявлению, в возрасте старше 35 лет или женщинам, имеющим не менее двух детей
- Б) по достижению возраста 35 лет
- В) при наличие двух детей
- Г) при наличие трех и более детей

**668. [T005034] ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗАКРЕПЛЕНО**

- А) конституцией Российской Федерации
- Б) уголовным кодексом РФ
- В) гражданским кодексом РФ
- Г) кодексом об административных правонарушениях

**669. [T005035] ЦЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- А) лишение человека способности к воспроизведству потомства и как метод контрацепции
- Б) только как метод контрацепции
- В) лишение человека способности к воспроизведству потомства
- Г) лишение человека способности к воспроизведству при психических заболеваниях

**670. [T005036] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ**

- А) коллективным договором
- Б) правительством РФ
- В) правилами внутреннего распорядка
- Г) органами местного самоуправления

**671. [T005037] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 140 календарных дней
- Б) 170 календарных дней
- В) 120 календарных дней
- Г) 150 календарных дней

**672. [T005038] РАБОТАЮЩИМ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1,5 ЛЕТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ В ЧАСАХ КАЖДЫЕ**

- А) три
- Б) три с половиной
- В) два
- Г) четыре

**673. [T005039] РАБОТАЮЩИМ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1,5 ЛЕТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В МИНУТАХ НЕ МЕНЕЕ**

- А) 30
- Б) 35
- В) 40
- Г) 20

**674. [T005040] ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ**

- А) один выходной без сохранения заработной платы
- Б) три дополнительных выходных дня
- В) три оплачиваемых дня
- Г) один оплачиваемый выходной день

**675. [T005041] СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ**

- А) в определенных случаях изменения социального или материального положения
- Б) при утрате имущества
- В) только в ситуациях, возникших неожиданно
- Г) только в следствии стихийных бедствий

**676. [T005042] К ВЫПЛАТАМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ОТНОСЯТСЯ**

- А) выплаты по беременности и родам
- Б) компенсация материального ущерба
- В) компенсация морального ущерба
- Г) компенсации вследствие стихийных бедствий

**677. [T005043] СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА  
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ**

- А) вносятся с согласия пациента
- Б) вносятся без согласия пациента
- В) вносятся по решению администрации
- Г) не вносятся

**678. [T005044] ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) правительство РФ
- Б) президентом РФ
- В) государственной думой РФ
- Г) местной администрацией

**679. [T005046] ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЕЕ  
ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО**

- А) на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи
- Б) на халатное отношение со стороны медицинских работников
- В) на дефекты в оформлении медицинской документации
- Г) не имеет право на возмещение вреда причиненного здоровью

**680. [T005047] МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) специализированная
- Б) медико-социальная
- В) паллиативная
- Г) квалифицированная

**681. [T005048] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ**

- А) только по желанию гражданина
- Б) на усмотрение лечащего врача
- В) с согласия родственников
- Г) в любом случае

**682. [T005049] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ**

- А) результаты проведения анализов, обследований, а также диагноз
- Б) о медицинской организации
- В) противоправные действия в отношении пациента
- Г) угроза массового распространения инфекционного заболевания

**683. [T005052] МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ ПРОВОДИТСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ**

- А) муниципальной и государственной систем здравоохранения
- Б) муниципальной системы здравоохранения
- В) государственной системы здравоохранения
- Г) частной системы здравоохранения

**684. [T005053] УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) информированное добровольное согласие пациента
- Б) добровольное согласие пациента
- В) согласие пациента, заверенное нотариусом
- Г) согласие пациента не требуется

**685. [T005054] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- А) 84
- Б) 70
- В) 80
- Г) 86

**686. [T005055] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ РОЖДЕНИИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- А) 110
- Б) 70
- В) 80
- Г) 84

**687. [T005056] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- А) 86
- Б) 70
- В) 80
- Г) 84

**688. [T005057] В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА ЖЕНЩИНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА**

- А) 3 лет
- Б) 1.5 года
- В) 1.5 лет
- Г) 1 года

**689. [T005058] ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК И ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ**

- А) До 15 лет
- Б) 1 года
- В) 3 лет
- Г) 7 лет

**690. [T005059] К РАБОТЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ**

- А) беременные
- Б) старше 20 лет
- В) старше 60 лет
- Г) имеющие совершеннолетних детей

**691. [T005060] СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ**

- А) имеющая собственного здорового ребенка, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте 20 – 35 лет
- Б) имеющая не менее двух собственных детей, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте до 40 лет
- В) здоровая женщина в возрасте от 20 – 35 лет
- Г) здоровая женщина в возрасте от 17 до 50 лет

**692. [T005063] ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**

- А) члену семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком
- Б) отцу ребенка
- В) близкому родственнику
- Г) только матери ребенка

**693. [T005065] ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

- А) федеральный закон РФ « Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- Б) федеральный закон РФ « О медицинском страховании граждан»
- В) федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»
- Г) трудовой Кодекс РФ

**694. [T005069] ВИДОМ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) предупреждение
- Б) замечание
- В) увольнение
- Г) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

**695. [T005353] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ БРОНХИТОВ ОТНОСЯТ**

- А) бактериальную и вирусную инфекцию
- Б) курение
- В) алкоголизм
- Г) переохлаждение

**696. [T005354] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- А) кашель с мокротой
- Б) слабость
- В) легочное кровотечение
- Г) головная боль

**697. [T005355] К ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- А) курение
- Б) бактериальную и вирусную инфекцию
- В) переохлаждение
- Г) гиповитаминоз

**698. [T005356] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- А) одышку
- Б) недомогание
- В) повышение температуры
- Г) головную боль

**699. [T005357] ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНА МОКРОТА**

- А) слизистая
- Б) стекловидная
- В) "ржавая"
- Г) розовая пенистая

**700. [T005358] К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ**

- А) хроническую дыхательную недостаточность
- Б) острую сосудистую недостаточность
- В) острую сердечную недостаточность
- Г) легочное кровотечение

**701. [T005359] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ**

- А) приступ удушья
- Б) кашель с гнойной мокротой
- В) кровохарканье
- Г) инспираторная одышка

**702. [T005360] ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА**

- А) сидя, с упором на руки
- Б) горизонтальное с приподнятыми ногами
- В) лежа на боку
- Г) горизонтальное

**703. [T005361] НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЯЗКОЙ СТЕКЛОВИДНОЙ МОКРОТЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ**

- А) бронхиальной астме
- Б) абсцессе легкого
- В) пневмонии
- Г) экссудативном плеврите

**704. [T005362] ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ НА ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- А) сальбутамол
- Б) либексин
- В) кодеин
- Г) тусупрекс

**705. [T005363] ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) эозинофилы
- Б) эластические волокна
- В) атипичные клетки
- Г) лейкоциты

**706. [T005364] К ПРИНЦИПАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСИТСЯ**

- А) прекращение контакта с аллергеном
- Б) устранение гиподинамии
- В) отказ от алкоголя
- Г) сбалансированное питание

**707. [T005365] ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

- А) пиковой скорости выдоха
- Б) жизненной емкости легких
- В) остаточного объема
- Г) дыхательного объема

**708. [T005366] К ОСНОВНОМУ ВОЗБУДИТЕЛЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- А) пневмококк
- Б) микобактерию
- В) вирус
- Г) кишечную палочку

**709. [T005367] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ**

- А) боль в грудной клетке, одышка, лихорадка
- Б) слабость, головная боль, стекловидная мокрота
- В) длительный субфебрилитет, утомляемость
- Г) отеки, повышение АД, нарушение ритма

**710. [T005368] ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- А) пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) острым бронхите
- Г) сухом плеврите

**711. [T005369] «РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- А) пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) острым бронхите
- Г) сухом плеврите

**712. [T005370] К ВОЗМОЖНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) асфиксия
- Б) кожный зуд
- В) судороги
- Г) непроизвольное мочеиспускание

**713. [T005371] К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- А) антибактериальных средств
- Б) отхаркивающих средств
- В) бронхолитических средств
- Г) жаропонижающих средств

**714. [T005372] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) острая дыхательная недостаточность
- Б) лихорадка
- В) боль в грудной клетке
- Г) лёгочное кровотечение

**715. [T005373] ПРИ КРИТИЧЕСКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ПНЕВМОНИИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ**

- А) коллапс
- Б) острая дыхательная недостаточность
- В) острая коронарная недостаточность
- Г) легочное кровотечение

**716. [T005374] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛЫХ В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ (УД/МИН)**

- А) 16-20
- Б) 20-40
- В) 60-80
- Г) 6-10

**717. [T005375] ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ**

- А) сухой банкой
- Б) сухой пробиркой
- В) стерильной пробиркой
- Г) стерильной банкой

**718. [T005376] ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПАЦИЕНТКИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ**

- А) дисбактериоз
- Б) лихорадка
- В) отеки
- Г) увеличение массы тела

**719. [T005377] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гиперлипидемия
- Б) природно-экологические факторы
- В) неблагоприятные климатические условия
- Г) рациональное питание

**720. [T005379] К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РЕВМАТИЗМА ОТНОСЯТ**

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) золотистый стафилококк
- В) вирусы
- Г) риккетсии

**721. [T005380] К РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ**

- А) очаг хронической инфекции
- Б) гиподинамия
- В) стрессы
- Г) нерациональное питание

**722. [T005381] ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ КЛАПАН СЕРДЦА**

- А) митральный
- Б) аортальный
- В) пульмональный
- Г) трехстворчатый

**723. [T005382] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ОТНОСЯТ**

- А) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
- Б) повышение температуры, стойкая деформация суставов
- В) поражение мелких суставов, скованность
- Г) недомогание,monoартрит с деформацией

**724. [T005383] ПРИ РЕВМАТИЗМЕ НА КОЖЕ НАБЛЮДАЮТСЯ**

- А) кольцевидная эритема
- Б) диффузный цианоз
- В) "сосудистые звездочки"
- Г) акроцианоз

**725. [T005384] ДЛЯ ИСХОДА РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА  
ХАРАКТЕРНО**

- А) отсутствие остаточных деформаций
- Б) деформация сустава
- В) кровоизлияние в полость сустава
- Г) анкилоз

**726. [T005385] ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ЭТИОТРОПНОЙ ЦЕЛЬЮ  
ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- А) амоксициллин
- Б) нитроглицерин
- В) анальгин
- Г) фурагин

**727. [T005386] ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ  
ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- А) нестероидные противовоспалительные препараты
- Б) нитраты
- В) анальгетики
- Г) мочегонные

**728. [T005387] К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ  
ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТ**

- А) повышение АД, гипергликемия, синдром Иценко-Кушинга
- Б) головная боль, снижение АД
- В) одышка, легочное кровотечение
- Г) лихорадка, нарушение слуха

**729. [T005388] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) бициллинопрофилактику
- Б) витаминизированное питание
- В) санация очагов стафилококковой инфекции
- Г) занятия спортом

**730. [T005389] БИЦИЛЛИНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ**

- А) 5 лет
- Б) 1 года
- В) 2 лет
- Г) 6 месяцев

**731. [T005390] К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНAM ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ОТНОСЯТ**

- А) ревматизм
- Б) инфаркт миокарда
- В) стенокардия
- Г) гипертоническая болезнь

**732. [T005391] СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- А) акроцианоз
- Б) иктеричность
- В) диффузный цианоз
- Г) гиперемия

**733. [T005393] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 110 УДАРОВ В МИНУТУ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- А) тахикардия
- Б) брадикардия
- В) экстрасистолия
- Г) норма

**734. [T005394] ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- А) ограничение жидкости и соли
- Б) увеличение жидкости и белков
- В) ограничение жиров и углеводов
- Г) увеличение жиров и белков

**735. [T005395] К ВОЗМОЖНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ**

- А) нервно-психическое перенапряжение
- Б) очаг хронической инфекции
- В) гиповитаминоз
- Г) переохлаждение

**736. [T005396] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТ**

- А) головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами
- Б) кровохарканье, головная боль, одышка
- В) изжога, рвота, шум в ушах
- Г) отрыжка, слабость

**737. [T005397] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- А) эналаприл, атенолол
- Б) дигоксин, димедрол
- В) целанид, корвалол
- Г) атропин, аспаркам

**738. [T005398] К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ**

- А) инсульт, инфаркт миокарда
- Б) обморок, коллапс
- В) ревматизм, порок сердца
- Г) пневмония, плеврит

**739. [T005399] ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- А) гипертоническом кризе
- Б) кардиогенном шоке
- В) коллапсе
- Г) обмороке

**740. [T005400] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ СЕРДЦА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- А) разъяснение сущности исследования пациентке
- Б) осуществление очистительная клизма
- В) отсутствие подготовки к
- Г) накануне легкий ужин

**741. [T005401] К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТ**

- А) высокий уровень холестерина
- Б) занятия физической культурой
- В) неотягощенная наследственность
- Г) рациональное питание

**742. [T005402] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ**

- А) артерии
- Б) вены
- В) капилляры
- Г) мышцы

**743. [T005403] К ОСЛОЖНЕНИЯМ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ**

- А) инсульт, инфаркт миокарда
- Б) асцит, анасарка
- В) пиелонефрит, цистит
- Г) пневмония, бронхит

**744. [T005404] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ**

- А) головная боль, ухудшение памяти
- Б) загрудинную боль, нарушение ритма сердца
- В) снижение аппетита и массы тела
- Г) тошноту, рвоту

**745. [T005405] ДЛЯ СИМПТОМА АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА**

- А) загрудинная боль
- Б) головная боль
- В) одышка
- Г) тошнота

**746. [T005406] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТНОСЯТ**

- А) боли в икроножных мышцах при ходьбе, зябкость конечностей
- Б) отеки, повышение АД
- В) одышку, аритмию
- Г) слабость, тахикардию

**747. [T005407] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖАТСЯ В ПРОДУКТАХ**

- А) яйца, икра
- Б) овощи, фрукты
- В) рыба, ягоды
- Г) крупы, бобовые

**748. [T005408] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТНОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- А) ишемическую болезнь сердца
- Б) гипертоническую болезнь
- В) пороки сердца
- Г) ревматизм

**749. [T005409] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) гипертоническая болезнь
- В) пороки сердца
- Г) ревматизм

**750. [T005411] ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- А) стенокардии
- Б) ревмокардите
- В) остеохондрозе
- Г) инфаркте миокарда

**751. [T005412] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гиперлипидемия
- Б) переохлаждение
- В) гиповитаминоз
- Г) гипотония

**752. [T005413] К АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ**

- А) нитроминт
- Б) эналаприл
- В) клексан
- Г) атенолол

**753. [T005414] К НИТРАТУ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) нитроглицерин
- Б) нитрогранулонг
- В) сустак-форте
- Г) оликард

**754. [T005415] ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (МИН.)**

- А) 1-3
- Б) 10-15
- В) 20-25
- Г) 30-40

**755. [T005416] К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСЯТ**

- А) головную боль
- Б) лихорадку
- В) отеки
- Г) асцит

**756. [T005417] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ**

- А) 15 минут
- Б) 60 минут
- В) 120 минут
- Г) 180 минут

**757. [T005418] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- А) нитраты, бета-адреноблокаторы
- Б) анальгетики, наркотики
- В) гипотензивные, диуретики
- Г) ганглиоблокаторы, диуретики

**758. [T005419] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ**

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) порок сердца
- В) ревматический эндокардит
- Г) ревматический миокардит

**759. [T005420] ДЛЯ ОСНОВНОГО СИМПТОМА АНГИНОЗНОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНЫ**

- А) загрудинная боль
- Б) головная боль
- В) отеки на ногах
- Г) сердцебиение

**760. [T005421] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ**

- А) загрудинная боль, которая не купируется нитроглицерином
- Б) загрудинная боль, которая купируется нитроглицерином
- В) колющая боль в области сердца
- Г) ноющая боль в области сердца

**761. [T005422] ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ангинозную
- Б) абдоминальную
- В) астматическую
- Г) безболевую

**762. [T005423] ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кардиогенный шок
- Б) артриты
- В) повышение АД
- Г) одышка

**763. [T005424] ДЛЯ ОСНОВНОГО СИМПТОМА АСТМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНЫ**

- А) приступ удушья
- Б) загрудинная боль
- В) боль в животе
- Г) головная боль

**764. [T005425] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ОТНОСЯТ**

- А) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс
- Б) приступ удушья
- В) лихорадка, рвота
- Г) резкое повышение АД, напряженный пульс

**765. [T005426] ПОЯВЛЕНИЕ УДУШЬЯ, ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- А) отека легких
- Б) пневмонии
- В) кровохарканья
- Г) легочного кровотечения

**766. [T005427] ПОД ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ ПОНИМАЮТ**

- А) преждевременное сокращение сердца
- Б) увеличение частоты сердечных сокращений
- В) нарушение проводимости
- Г) уменьшение частоты сердечных сокращений

**767. [T005428] ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ПРАВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД**

- А) красный
- Б) желтый
- В) зеленый
- Г) черный

**768. [T005429] ДЛЯ МЕСТА УСТАНОВКИ ГРУДНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ЗАПИСИ  
ОТВЕДЕНИЯ V4 ХАРАКТЕРНО**

- А) пятое межреберье по левой среднеключичной линии
- Б) четвертое межреберье слева от грудины
- В) пятое межреберье слева от грудины
- Г) четвертое межреберье справа от грудины

**769. [T005430] ПРИНЦИПОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО С  
НЕОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) транспортировка на носилках
- Б) в кресле-каталке
- В) самостоятельное передвижение
- Г) передвижение в сопровождении медработника

**770. [T005431] ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА  
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ**

- А) в первые часы заболевания
- Б) на 2-е сутки заболевания
- В) на 3-и сутки заболевания
- Г) на 4-е сутки заболевания

**771. [T005432] ПОД ОБМОРОКОМ ПОНИМАЮТ ФОРМУ ОСТРОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

- А) сосудистой
- Б) левожелудочковой
- В) правожелудочковой
- Г) коронарной

**772. [T005433] ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) острая гипоксия мозга
- Б) резкое повышение АД
- В) высокая температура тела
- Г) метеоризм

**773. [T005434] ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ**

- А) с приподнятыми ногами
- Б) с приподнятым изголовьем
- В) на левом боку
- Г) на правом боку

**774. [T005435] К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) рефлекторное воздействие нашатырного спирта
- Б) введение мезатона
- В) введение пентамина
- Г) проведение оксигенотерапии через пеногасители

**775. [T005436] ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ОБМОРОКЕ НЕОБХОДИМО**

- А) напоить пациента крепким горячим чаем
- Б) поставить банки
- В) поставить горчичники
- Г) провести кровопускание

**776. [T005437] ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ**

- А) недостаточности кровообращения
- Б) инфаркта миокарда
- В) стенокардии
- Г) гипертонической болезни

**777. [T005438] ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ**

- А) вечером на ногах
- Б) утром на ногах
- В) вечером на лице
- Г) утром на лице

**778. [T005439] ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) ограничить прием жидкости и соли
- Б) ограничить прием белков и жиров
- В) увеличить прием жидкости и соли
- Г) увеличить прием белков и жиров

**779. [T005440] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 54 УДАРОВ В МИНУТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- А) брадикардия
- Б) тахикардия
- В) экстрасистолия
- Г) норма

**780. [T005441] В РАЦИОНЕ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ**

- А) растительные жиры
- Б) мясо
- В) кофе, чай
- Г) продукты, богатые углеводами

**781. [T005442] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ГАСТРАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ**

- А) боль в животе
- Б) головная боль
- В) загрудинная боль
- Г) приступ удушья

**782. [T005443] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В ОТНОСИТСЯ**

- А) хеликобактериальная инфекция
- Б) аутоиммунные нарушения
- В) нерациональное питание
- Г) отравление

**783. [T005444] НАЗВАНИЕ СИНДРОМА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА**

- А) диспепсический
- Б) гипертонический
- В) интоксикационный
- Г) гепатолиенальный

**784. [T005447] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) болезненность в эпигастральной области
- Б) положительный симптом Ортнера
- В) положительный симптом Пастернацкого
- Г) положительный симптом Щеткина-Блюмберга

**785. [T005448] ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ**

- А) язвенная болезнь
- Б) холецистит
- В) цирроз печени
- Г) рак желудка

**786. [T005449] РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ**

- А) фиброгастродуоденоскопия
- Б) желудочное зондирование
- В) лапароскопия
- Г) рентгенография желудка

**787. [T005450] К ОСЛОЖНЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С РЕЗКО СНИЖЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ**

- А) рак желудка
- Б) холецистит
- В) цирроз печени
- Г) язвенная болезнь

**788. [T005451] ИНФОРМАЦИЮ О СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ**

- А) желудочное зондирование
- Б) общий анализ кала
- В) рентгенологическое исследование
- Г) дуоденальное зондирование

**789. [T005452] В ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ВХОДЯТ ПРАВИЛА**

- А) «вечером - легкий ужин, утром – натощак»
- Б) «вечером - очистительная клизма»
- В) «вечером и утром - очистительная клизма»
- Г) подготовки не требуется

**790. [T005453] ДИЕТА № 1 ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- А) тщательное измельчение пищи
- Б) повышенное содержание кальция
- В) исключение молочных продуктов
- Г) исключение крупяных блюд

**791. [T005454] НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ**

- А) рациональное питание
- Б) устранение гиподинамии
- В) закаливание
- Г) нормализация массы тела

**792. [T005457] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИKОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) хеликобактериальная инфекция
- Б) переохлаждение, переутомление
- В) физическая перегрузка, переохлаждение
- Г) вирусная инфекция, переохлаждение

**793. [T005458] РАННЯЯ БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ ЕДЫ В ТЕЧЕНИЕ**

- А) 30 минут после еды
- Б) 2 часов после еды
- В) 3 часов до еды
- Г) 4 часов до еды

**794. [T005459] К САМОМУ ЧАСТОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ**

- А) желудочное кровотечение
- Б) кахексию
- В) обезвоживание
- Г) кишечную непроходимость

**795. [T005460] ХАРАКТЕР КАЛА ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ОПИСЫВАЕТСЯ КАК**

- А) дегтеобразный
- Б) кровянистый
- В) обесцвеченный
- Г) жирный

**796. [T005461] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- А) панзинорм, фестал
- Б) викалин, циметидин
- В) клацид, омез
- Г) атропин, гастроцепин

**797. [T005462] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) эндоскопическое исследование с биопсией
- Б) ирригоскопия
- В) ультразвуковое исследование
- Г) желудочное зондирование

**798. [T005464] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К АНАЛИЗУ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ИЗ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ**

- А) мясо
- Б) молоко
- В) манную кашу
- Г) черный хлеб

**799. [T005466] ПРИОРИТЕТ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- А) блокаторам H2-гистаминовых рецепторов
- Б) спазмолитикам
- В) ферментам
- Г) анальгетикам

**800. [T005467] ПАЦИЕНТУ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) частое дробное питание
- Б) уменьшение калорийности рациона
- В) ограничение жидкости
- Г) голодание

**801. [T005470] ПРИ ЗАПОРЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) продукты, богатые клетчаткой
- Б) ограничение поваренной соли
- В) ограничение жидкости
- Г) продукты с малым содержанием клетчатки

**802. [T005472] ПОД ИРРИГОСКОПИЕЙ ПОНИМАЮТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

- А) толстого кишечника
- Б) желудка
- В) тонкого кишечника
- Г) пищевода

**803. [T005473] ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ИСКЛЮЧАЮТ**

- А) жареные блюда
- Б) кисломолочные блюда
- В) фрукты
- Г) пшеничный хлеб

**804. [T005474] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ**

- А) прием жирной пищи
- Б) переохлаждение
- В) прием углеводов
- Г) стресс

**805. [T005475] СИМПТОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) боль в правом подреберье
- Б) гектическая лихорадка
- В) мелена
- Г) слабость

**806. [T005476] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ**

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) грибковая инфекция
- В) кишечная палочка
- Г) микобактерии

**807. [T005477] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ**

- А) клубочки
- Б) канальцы
- В) лоханки
- Г) чашечки

**808. [T005478] СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- А) почек
- Б) легких
- В) сердца
- Г) печени

**809. [T005479] ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ АНГИНЫ ЧЕРЕЗ**

- А) 1-2 недели
- Б) 3-4 дня
- В) 1-2 дня
- Г) 1-2 месяца

**810. [T005480] ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ**

- А) утром на лице
- Б) утром на ногах
- В) вечером на ногах
- Г) вечером на лице

**811. [T005481] РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
- Б) гидроперикард
- В) увеличение живота
- Г) гидроторакс

**812. [T005482] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОЧА ИМЕЕТ ЦВЕТ**

- А) "мясных помоев"
- Б) "пива"
- В) соломенно-желтый
- Г) бесцветный

**813. [T005483] МОЧА ЦВЕТА "МЯСНЫХ ПОМОЕВ" ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА**

- А) эритроцитов
- Б) лейкоцитов
- В) цилиндротов
- Г) бактерий

**814. [T005484] ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ**

- А) сухой банкой
- Б) сухой пробиркой
- В) стерильной банкой
- Г) стерильной пробиркой

**815. [T005485] ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ОБЪЕМА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В 400 МЛ**

- А) олигурия
- Б) анурия
- В) полиурия
- Г) протеинурия

**816. [T005486] ПОД АНУРИЕЙ ПОНИМАЮТ**

- А) отсутствие мочи
- Б) нормальное количество мочи
- В) преобладание ночного диуреза над дневным
- Г) много мочи

**817. [T005487] ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ОТРАЖАЮТСЯ В**

- А) гематурии, протеинурии, цилиндрозурии
- Б) гематурии, глюкозурии, цилиндрозурии
- В) лейкоцитурии, протеинурии, цилиндрозурии
- Г) лейкоцитурии, протеинурии, бактериурии

**818. [T005488] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ**

- А) строгий постельный
- Б) постельный
- В) палатный
- Г) общий

**819. [T005489] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЗНАЧАЮТ**

- А) до исчезновения отеков и нормализации АД
- Б) до исчезновения боли в поясничной области
- В) до нормализации анализов мочи
- Г) до нормализации температуры тела

**820. [T005490] ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ**

- А) жидкости и соли
- Б) белков и углеводов
- В) белков и жиров
- Г) жидкости и углеводов

**821. [T005491] ПОД НИКТУРИЕЙ ПОНИМАЮТ**

- А) преобладание ночного диуреза над дневным
- Б) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл
- В) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
- Г) болезненное мочеиспускание

**822. [T005492] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- А) антибиотики, гормоны, дезагреганты
- Б) анальгетики, спазмолитики
- В) нитраты, сердечные гликозиды
- Г) сульфаниламиды, нитрофураны

**823. [T005493] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ОТНОСИТСЯ**

- А) восходящая инфекция мочевых путей
- Б) нерациональное питание
- В) переохлаждение
- Г) стрессы

**824. [T005494] ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ**

- А) чашечки
- Б) клубочки
- В) канальцы и клубочки
- Г) канальцы

**825. [T005495] ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТСЯ**

- А) боль в пояснице, дизурия, лихорадка
- Б) жажда, полиурия, полидипсия
- В) диспепсия, боль в правом подреберье
- Г) слабость, кожный зуд, артриты

**826. [T005496] ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- А) лейкоцитурия, бактериурия
- Б) гематурия, протеинурия
- В) глюкозурия, цилиндрурия
- Г) глюкозурия, протеинурия

**827. [T005497] РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ**

- А) экскреторная урография
- Б) томография
- В) хромоцистоскопия
- Г) ирригоскопия

**828. [T005498] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) хроническая кровопотеря
- Б) дефицит витаминов
- В) избыточное употребление углеводов
- Г) избыточное употребление белков

**829. [T005499] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЮТСЯ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И ОБОНИЯНИЯ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) железодефицитная анемия
- Б) хронический лейкоз
- В) острый лейкоз
- Г) В12-дефицитная анемия

**830. [T005500] ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ**

- А) бледные
- Б) гиперемированные
- В) желтушные
- Г) цианотичные

**831. [T005501] ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- А) гипохромная
- Б) гиперхромная
- В) нормохромная
- Г) гемолитическая

**832. [T005502] ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЮТСЯ**

- А) снижение гемоглобина и цветового показателя
- Б) лейкопения, уменьшение СОЭ
- В) лейкоцитоз, увеличение СОЭ
- Г) увеличение гемоглобина и эритроцитов

**833. [T005503] К ПРЕПАРАТАМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- А) феррум-лек
- Б) тотема
- В) ферроплекс
- Г) мальтофер

**834. [T005504] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- А) мальтофер
- Б) аскорутин
- В) панзинорм
- Г) цианокобаламин

**835. [T005505] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) аскорбиновую кислоту
- Б) цианокобаламин
- В) ретинол
- Г) эргокальциферол

**836. [T005506] К НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК (ММОЛЬ/Л) ОТНОсят**

- А) 3,3-5,5
- Б) 2,2-3,3
- В) 1,1-2,2
- Г) 6,6-8,8

**837. [T005507] ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ**

- А) гормонов Т3, Т4, ТТГ
- Б) гемоглобина, цветового показателя
- В) лейкоцитов, СОЭ
- Г) инсулина, глюкагона

**838. [T005508] ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ ЙОДА В ПИЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ**

- А) эндемический зоб
- Б) ожирение
- В) сахарный диабет
- Г) диффузный токсический зоб

**839. [T005509] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЙОДИРОВАТЬ**

- А) хлеб, поваренную соль
- Б) крупы, молоко
- В) растительное масло, маргарин
- Г) сахар, конфеты

**840. [T005510] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) сахарный диабет
- Б) диффузный токсический зоб
- В) гипотиреоз
- Г) эндемический зоб

**841. [T005511] К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ**

- А) жажда, кожный зуд
- Б) отеки, боли в пояснице
- В) сухой кашель, одышка
- Г) снижение памяти, запоры

**842. [T005512] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- А) гипергликемия
- Б) гипопротеинемия
- В) гиперпротеинемия
- Г) гипербилирубинемия

**843. [T005513] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- А) глюкозурия
- Б) бактериурия
- В) фосфатурия
- Г) пиурия

**844. [T005514] К ОСЛОЖНЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ**

- А) кетоацидотическая кома
- Б) гипертонический криз
- В) отек легких
- Г) легочное кровотечение

**845. [T005515] К ПРЕПАРАТАМ, ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ, ОТНОСЯТ**

- А) антибиотики
- Б) диуретики
- В) гипотензивные
- Г) цитостатики

**846. [T005516] К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КРАПИВНИЦЫ ОТНОСЯТ**

- А) сыпь, кожный зуд
- Б) одышка, сухой кашель
- В) тошнота, рвота
- Г) боль за грудиной, одышка

**847. [T005517] СЫПЬ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ**

- А) на любых участках тела
- Б) на туловище
- В) на конечностях
- Г) на лице

**848. [T005518] ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ АНТИСЕПТИКИ В ХИРУРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) Листер
- Б) Пирогов
- В) Пастер
- Г) Дьяконов

**849. [T005519] ПОД ГЕМАТОМОЙ ПОНИМАЮТ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В**

- А) тканях и органах
- Б) плевральной полости
- В) полости перикарда
- Г) полости сустава

**850. [T005520] РЕЗУС-КОНФЛИКТ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ КРОВЬ**

- А) матери - резус-отрицательная, а плода - резус-положительная
- Б) матери и плода - резус-положительная
- В) матери и плода - резус-отрицательная
- Г) матери - резус-положительная, а плода - резус-отрицательная

**851. [T005521] ДОСТОВЕРНЫМ (АБСОЛЮТНЫМ) ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) патологическая подвижность
- Б) отек
- В) местное повышение температуры
- Г) боль

**852. [T005522] ДОСТОВЕРНЫМ (АБСОЛЮТНЫМ) ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отсутствие активных движений в суставе
- Б) боль
- В) отек
- Г) патологическая подвижность

**853. [T005523] ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отек мягких тканей в зоне перелома
- Б) абсолютное укорочение конечности
- В) деформация
- Г) крепитация

**854. [T005524] САМЫМ ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) метод Постникова
- Б) правило "девяток"
- В) правило ладони
- Г) спиртовая проба

**855. [T005525] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) нахождение суставного конца в необычном месте
- Б) гематома в зоне перелома
- В) крепитация
- Г) отек мягких тканей сустава

**856. [T005526] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) транспортная иммобилизация
- Б) наложение гипсовой повязки
- В) применение скелетного вытяжения
- Г) наложение жгута

**857. [T005527] ОТСУТСТВИЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ**

- А) повреждению сосудов и нервов конечности
- Б) замедленному формированию костной мозоли
- В) развитию травматического остеомиелита
- Г) развитию пролежней

**858. [T005528] К ВОЗРАСТНЫМ ИНТЕРВАЛАМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, ОТНОСЯТ**

- А) 35 -45 лет
- Б) 20-25 лет
- В) 15-18 лет
- Г) 25-35 лет

**859. [T005529] РЕЗУС-КОНФЛИКТА МАТЕРИ И ПЛОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) выкидышу, мертворождению
- Б) врожденным уродствам
- В) хромосомным аномалиям
- Г) олигофрении

**860. [T005530] К ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ОТНОСЯТ**

- А) 10-13 недель
- Б) 4-6 недель
- В) 7-9 недель
- Г) 14-16 недель

**861. [T005531] ПОД ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОНИМАЮТ**

- А) комплекс мероприятий, направленный на предупреждение рождения или зачатия больного ребенка
- Б) комплекс мероприятий, направленный на предотвращение заболевания
- В) генотипическая коллекция дефекта
- Г) фенотипическая коллекция дефекта

**862. [T005532] К АНОМАЛИЯМ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ГЕННЫЕ МУТАЦИИ, ОТНОСЯТСЯ**

- А) полидактилия и синдактилия
- Б) синдромы Дауна и Эдвардса
- В) синдромы Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера
- Г) транслокационные формы хромосомных синдромов

**863. [T005533] К ГРУППАМ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ**

- А) беременные женщины
- Б) потребители инъекционных наркотиков
- В) мужчины, имеющие секс с мужчинами
- Г) коммерческие секс работники

**864. [T005534] У БЕРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЕТ**

- А) вирусный гепатит Е
- Б) вирусный гепатит А
- В) вирусный гепатит С
- Г) вирусный гепатит В

**865. [T005535] СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРИЮ, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГЕПАТИТА «В» НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ**

- А) в первые 24 часа жизни
- Б) в 12 месяцев
- В) в 6 лет
- Г) в 18 лет

**866. [T005536] БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕПАТИТА «А» ПРОТИВОПОКАЗАНО**

- А) прерывание беременности
- Б) проведение любых лабораторных исследований
- В) применение глюкозо-солевых растворов
- Г) употребление в пищу кисломолочных продуктов

**867. [T005537] ЗАБОЛЕВАНИЕ МАЛЯРИЕЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) гипотрофии плода
- Б) микроцефалии
- В) порокам развития
- Г) снижению лактации

**868. [T005538] ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ**

- А) амоксициллин
- Б) противоклещевой иммуноглобулин
- В) ципрофлоксацин
- Г) доксициклин

**869. [T005539] ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛИХОРАДКОЙ ЗИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОПАСНО В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА**

- А) микроцефалии
- Б) гемолитической анемии
- В) аутоиммунного гепатита
- Г) почечной недостаточности

**870. [T005540] К ФОРМИРОВАНИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ПРИВОДИТ ПЕРЕНЕСЁННАЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) краснуха
- Б) ВИЧ-инфекция
- В) пищевая токсикоинфекция
- Г) рожа

**871. [T005541] ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ОТ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ**

- А) во 2 и 3 триместре
- Б) в 1 триместре
- В) только по жизненным показаниям
- Г) непосредственно перед родоразрешением

**872. [T005542] ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ НОВОРОЖДЁННОГО ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА  
НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- А) флюорографическое обследование матери
- Б) пробу Манту
- В) пробу Пирке
- Г) диаскин-тест

**873. [T005543] ДЛЯ БРУЦЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО**

- А) привычное невынашивание беременности
- Б) развитие преэклампсии и эклампсии
- В) спонтанная ремиссия во время беременности
- Г) тяжёлое течение в послеродовом периоде

**874. [T005544] В РАМКАХ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ  
НА НАЛИЧИЕ HBV-ИНФЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ МАРКЁР**

- А) HBs-ag
- Б) HBcor-ag
- В) anti-HBs
- Г) суммарные антитела

**875. [T005545] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ ВО ВРЕМЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- А) антиретровирусных препаратов
- Б) антибиотиков широкого спектра действия
- В) цитостатиков
- Г) синтетических аналогов женских половых гормонов

**876. [T005546] ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К  
РЕБЕНКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) грудное вскармливание
- Б) приём антиретровирусных препаратов во время беременности
- В) плановое кесарево сечение
- Г) совместное пребывание матери и ребёнка в послеродовом периоде

**877. [T005547] ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПОКАЗАНО**

- А) проведение регидратации
- Б) применение антибиотиков широкого спектра действия
- В) прерывание беременности
- Г) введение антитоксической сыворотки по методу Безредко

**878. [T005548] К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИЗЕНТЕРИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- А) цефтриаксон
- Б) ципрофлоксацин
- В) тетрацклин
- Г) гентамицин

**879. [T005549] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ АНТИТЕЛ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- А) иммунный блоттинг
- Б) бактериологический посев крови
- В) микроскопию толстой капли крови
- Г) реакцию Райта и Хеддельсона

**880. [T005550] ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- А) гепатита С
- Б) дифтерии
- В) дизентерии
- Г) гепатита А

**881. [T005551] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «Е» У БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) развитием печёночной недостаточности
- Б) преобладанием безжелтушных форм
- В) наиболее тяжёлым течением в 1 триместре
- Г) замедленным антителообразованием

**882. [T005552] ПРИ ВРОЖДЁННОЙ КРАСНУХЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- А) катаракта, микроцефалия, пороки сердца
- Б) желтуха, увеличение печени и селезёнки
- В) увеличение околоушных слюнных желёз, орхит, панкреатит
- Г) триада Гетчинсона

**883. [T005553] БЕРЕМЕННОСТЬ, НАСТУПИВШАЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «В»,**

- А) повышает риски обострения гепатита
- Б) не влияет на течение гепатита
- В) приводит к спонтанному выздоровлению
- Г) способствует формированию токсического гепатита

**884. [T005554] СПОСОБ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) вирусной нагрузки
- Б) ВИЧ-статуса полового партнёра
- В) возраста
- Г) срока гестации

**885. [T005555] БЕРЕМЕННОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ**

- А) бешенства
- Б) туберкулёза
- В) ветряной оспы
- Г) брюшного тифа

**886. [T005556] ЗАРАЖЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД РОДАМИ ПРИВОДИТ К**

- А) врождённой ветрянке
- Б) порокам развития плода
- В) гипотрофии плода
- Г) формированию вторичного иммунодефицита у новорождённого

**887. [T005557] К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- А) озельтамивир
- Б) анаферон
- В) антигриппин
- Г) ацикловир

**888. [T005558] БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ**

- А) в левой подвздошной области
- Б) в эпигастрции
- В) в околопупочной области
- Г) в правом подреберье

**889. [T005559] ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО**

- А) жидкий, обильный, зловонный стул, имеющий вид «болотной тины»
- Б) инкубационный период 10-14 суток
- В) увеличение печени и селезенки
- Г) нормальная температура тела

**890. [T005560] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ХОЛЕРЫ ОТНОСИТСЯ**

- А) выраженная дегидратация
- Б) стул в виде «малинового желе»
- В) схваткообразные боли по ходу кишечника
- Г) повышение температуры тела

**891. [T005561] ВОЗБУДИТЕЛЬ ХОЛЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕН**

- А) из рвотных масс
- Б) из ликвора
- В) из смызов носоглотки
- Г) из мокроты

**892. [T005562] НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМ БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) параличи
- Б) интоксикация
- В) серозный менингит
- Г) увеличение селезёнки

**893. [T005563] ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- А) анатаксины
- Б) антибиотики
- В) иммуноглобулины
- Г) сыворотки

**894. [T005564] ХАРАКТЕРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ «А» ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) водный
- Б) парентеральный
- В) половой
- Г) через укус комара

**895. [T005565] СЫПЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ИМЕЕТ ХАРАКТЕР**

- А) розеолёзный, появляется на 8-10 день болезни в области живота и нижней части грудной клетки
- Б) розеолёзно-петехиальный на туловище и верхних конечностях
- В) геморрагическая на бёдрах и пояснице
- Г) скарлатиноподобный со сгущением в естественных складках

**896. [T005566] К СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) гепатит В
- Б) токсоплазмоз
- В) пневмоцистная пневмония
- Г) саркома Капоши

**897. [T005567] К ЗАРАЖЕНИЮ ЛЕПТОСПИРОЗОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ**

- А) купание в непроточном водоёме
- Б) укус клеща
- В) беспорядочные половые связи
- Г) употребление в пищу вяленой рыбы

**898. [T005568] В ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ**

- А) бруцеллёз
- Б) туляремия
- В) чума
- Г) сальмонеллёз

**899. [T005569] К ВЕДУЩЕМУ КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ ЗЕВА ОТНОСЯТ**

- А) отёк подкожной клетчатки шеи
- Б) распространение налётов за пределы миндалин
- В) увеличение регионарных лимфоузлов
- Г) поражение глаз

**900. [T005570] ПРИ ВЫЯСНЕНИИ ЭПИДАНАМНЕЗА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ**

- А) при дизентерии – употребление немытых овощей и фруктов
- Б) при малярии - употребление сырого молока
- В) при сыпном тифе - употребление некипячёной воды
- Г) при иксодовом клещевом боррелиозе - укусы комаров

**901. [T005571] ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) геморрагическая сыпь
- Б) симптом Кернига
- В) регидность затылочных мышц
- Г) длительный субфебрилитет

**902. [T005572] К ЛОКАЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) менингококковый назофарингит
- Б) менингококцемия
- В) смешанная форма
- Г) менингококковый менингит

**903. [T005573] К ПЕРЕНОСЧИКАМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОТНОСЯТСЯ**

- А) иксодовые клещи
- Б) лобковые вши
- В) песчаные блохи
- Г) комары рода Anopheles

**904. [T005574] ТИПИЧНЫМ КОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кольцевидная эритема
- Б) уртикарная сыпь
- В) очаговая склеродермия
- Г) карбункул

**905. [T005575] СИМПТОМОКОМПЛЕКС, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ БЕШЕНСТВА, ВКЛЮЧАЕТ**

- А) гидрофобия, аэрофобия, фотофобия, акустикофобия
- Б) тошнота, повторная рвота, жидкий стул
- В) гиперемия зева, плотные налёты серого цвета
- Г) розеолёзная сыпь, артриты, распространенные отеки

**906. [T005576] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- А) антирабическая вакцина
- Б) лечение больных бешенством животных
- В) экстренная антибиотикопрофилактика
- Г) антирабический анатоксин

**907. [T005577] К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МАЛЯРИЙНОГО ПАРОКСИЗМА ОТНОСЯТСЯ**

- А) озноб, жар, пот
- Б) тошнота, рвота, диарея
- В) жажда, сухость во рту, олигоурия
- Г) бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение

**908. [T005578] ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕШЕНСТВА НАИБОЛЕЕ ДЛИННЫЙ ПРИ УКУСЕ В ОБЛАСТИ**

- А) голени
- Б) лица
- В) шеи
- Г) промежности

**909. [T005579] РАЗВИТИЕ ОТЁКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- А) трихинеллёза
- Б) аскаридоза
- В) энтеробиоза
- Г) дифиллоботриоза

**910. [T005580] ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ЧУМНОГО БУБОНА**

- А) плотной консистенции, болезненный, периаденит
- Б) безболезненный, мягкий
- В) поражаются только заднешейные лимфоузлы
- Г) безболезненный, размер до 1 см

**911. [T005581] ДЛЯ МЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РОЖЕ ХАРАКТЕРНЫ**

- А) гиперемия с чёткими контурами
- Б) рыхлый отёк
- В) колликационный некроз
- Г) кольцевидная эритема

**912. [T005582] К ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИИ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ**

- А) хирургическое лечение карбункула
- Б) применение антибиотиков
- В) введение противосибириязвенного иммуноглобулина
- Г) повторное заражение

**913. [T005638] НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ  
СРОКЕ ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ ДО**

- А) 37
- Б) 38
- В) 39
- Г) 40

**914. [T005639] НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С  
МАССОЙ ТЕЛА В ГРАММАХ МЕНЕЕ**

- А) 2500
- Б) 2700
- В) 2300
- Г) 2000

**915. [T005643] ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- A) 24 – 26
- Б) 26 – 28
- В) 18 – 20
- Г) 28 – 29

**916. [T005646] К ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ**

- А) непропорциональное телосложение
- Б) громкий крик
- В) мышечный гипертонус
- Г) кожа бархатистая, розовая

**917. [T005655] «ЯДЕРНАЯ» ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ**

- А) ЦНС
- Б) сердца
- В) легких
- Г) почек

**918. [T005665] ПРИ РАХИТЕ НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН**

- А) кальция, фосфора
- Б) калия, магния
- В) калия, железа
- Г) кальция, железа

**919. [T005666] ПОТЛИВОСТЬ И ОБЛЫСЕНИЕ ЗАТЫЛКА У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ**

- А) рахите
- Б) потнице
- В) опрелости
- Г) менингите

**920. [T005669] ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СПАЗМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) судороги
- Б) отеки
- В) запоры
- Г) кровоизлияния

**921. [T005670] БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) болезни Дауна
- Б) фенилкетонурии
- В) гемофилии
- Г) рахита

**922. [T005671] АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТИТА У ДЕТЕЙ**

- А) короткая и широкая
- Б) короткая и узкая
- В) длинная и широкая
- Г) длинная и узкая

**923. [T005672] КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) апноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахипноэ
- Г) асфиксия

**924. [T005673] ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) одышка
- Б) боль в грудной клетке
- В) лихорадка
- Г) слабость

**925. [T005679] ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) ринит
- Б) отит
- В) ларингит
- Г) трахеит

**926. [T005681] ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОСТРОМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) боль в ухе
- Б) кашель
- В) одышка
- Г) боль в грудной клетке

**927. [T005688] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЗНАКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) боль в животе
- Б) повышение артериального давления
- В) диарея
- Г) потеря массы тела

**928. [T005702] ВЫЯВЛЕНИЕ ЯИЦ В СОСКОБАХ КОЖИ ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- А) энтеробиоза
- Б) аскаридоза
- В) лямблиоза
- Г) описторхоза

**929. [T005706] ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОТЕКОВ, ГЕМАТУРИИ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- А) гломерулонефрита
- Б) цистита
- В) пиелонефрита
- Г) нефроптоза

**930. [T005725] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) полифагия, полидипсия, полиурия
- Б) лихорадка, кашель с мокротой, одышка
- В) боль в пояснице, отеки, лихорадка
- Г) тахикардия, трепет, экзофтальм

**931. [T005726] ПЕРЕДОЗИРОВКА ИНСУЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВЕДЕТ К РАЗВИТИЮ КОМЫ**

- А) гипогликемической
- Б) печеночной
- В) уремической
- Г) гипергликемической (диабетической)

**932. [T005731] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ**

- А) конфеты
- Б) кефир
- В) нежирное мясо
- Г) гречневую крупу

**933. [T005733] ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ КОМЕ**

- А) диабетической
- Б) гипогликемической
- В) печеночной
- Г) уремической

**934. [T005734] ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗЫ**

- А) щитовидной
- Б) поджелудочной
- В) гипофиза
- Г) вилочковой

**935. [T005735] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ИНСУЛИН ВВОДИТСЯ**

- А) подкожно
- Б) внутривенно
- В) внутримышечно
- Г) внутрижожно

**936. [T005736] ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ**

- А) активный, естественный
- Б) активный, искусственный
- В) пассивный, искусственный
- Г) пассивный, естественный

**937. [T005737] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОРВИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пневмония
- Б) лейкоз
- В) сахарный диабет
- Г) туберкулез

**938. [T005738] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОРВИ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) обильное питье
- Б) горчичники
- В) оксигенотерапию
- Г) обливание прохладной водой

**939. [T005739] ПРИ ОРВИ В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ**

- А) противовирусные
- Б) противокашлевые
- В) отхаркивающие
- Г) жаропонижающие

**940. [T005740] ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) вирус
- Б) шигелла
- В) пневмококк
- Г) микобактерия

**941. [T005741] ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА**

- А) слизистой щек
- Б) лице
- В) туловище
- Г) кончностях

**942. [T005742] ПЕРВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ ПРИ КОРИ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА**

- А) лице
- Б) туловище
- В) руках
- Г) ногах

**943. [T005743] АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДЯТ ДЕТЬЯМ**

- А) живой коревой вакциной
- Б) человеческим иммуноглобулином
- В) туберкулином
- Г) сывороткой

**944. [T005744] КРАСНУХА, ВОЗНИКШАЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ОПАСНА РАЗВИТИЕМ**

- А) врожденных пороков у ребенка
- Б) сахарного диабета у женщины
- В) обострения пиелонефрита у женщины
- Г) бронхиальной астмы у женщины

**945. [T005746] ПОЛИМОРФИЗМ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- А) ветряной оспы
- Б) кори
- В) краснухи
- Г) скарлатины

**946. [T005748] УВЕЛИЧЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- А) эпидемического паротита
- Б) краснухи
- В) кори
- Г) ветряной оспы

**947. [T005750] ПРИСТУПООБРАЗНЫЙ СПАЗМАТИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- А) коклюша
- Б) ветряной оспы
- В) эпидемического паротита
- Г) риновирусной инфекции

**948. [T005751] ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗВОЧКИ НА УЗДЕЧКЕ ЯЗЫКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- А) коклюше
- Б) кори
- В) ветряной оспе
- Г) риновирусной инфекции

**949. [T005752] ВОЗБУДИТЕЛЕМ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) стрептококк
- Б) стафилококк
- В) протей
- Г) вирус

**950. [T005753] АНГИНА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ**

- А) скарлатины
- Б) ветряной оспы
- В) кори
- Г) гриппа

**951. [T005754] ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) бактерия
- Б) вирус
- В) микоплазма
- Г) хламидия

**952. [T005755] АНТИТОКСИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ**

- А) дифтерии
- Б) гриппа
- В) кори
- Г) полиомиелита

**953. [T005756] ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ СЫПЬ ЗВЕЗДЧАТОЙ ФОРМЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- А) менингококковой инфекции
- Б) кори
- В) краснухи
- Г) скарлатины

**954. [T005758] ГЕПАТИТ А ВЫЗЫВАЕТСЯ**

- А) вирусами
- Б) бактериями
- В) грибами
- Г) простейшими

**955. [T005759] ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ ГЕПАТИТА А ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРИОД**

- А) осенне-зимний
- Б) зимне-весенний
- В) весенне-летний
- Г) летне-осенний

**956. [T005764] ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) парентеральный
- Б) фекально-оральный
- В) контактно-бытовой
- Г) водный

**957. [T005765] ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) шигелла
- Б) эшерихия
- В) сальмонелла
- Г) энтеровирус

**958. [T005766] ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ СЛИЗИ И ПРОЖИЛОК КРОВИ У ДЕТЕЙ («РЕКТАЛЬНЫЙ ПЛЕВОК») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- А) дизентерии
- Б) сальмонеллеза
- В) эшерихиоза
- Г) энтеровирусной инфекции

**959. [T005767] ТЕНЕЗМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) дизентерии
- Б) сальмонеллеза
- В) дисбактериоза
- Г) колиинфекции

**960. [T005768] ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРЕН СТУЛ В ВИДЕ**

- А) «болотной тины»
- Б) «рисового отвара»
- В) «крахмальных зерен»
- Г) «горохового пюре»

**961. [T005769] ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ ТУБЕРКУЛИН РЕБЕНКУ ВВОДЯТ**

- А) внутрикожно
- Б) подкожно
- В) внутримышечно
- Г) внутривенно

**962. [T005770] ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ НА СРОКЕ В ДНЯХ ЖИЗНИ**

- А) 3-7
- Б) 1-3
- В) 8-12
- Г) 15-19

**963. [T005774] НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) освобождение от стесняющей одежды
- Б) проведение оксигенотерапии
- В) введение бронхолитиков
- Г) введение глюкокортикоидов

**964. [T005776] ОСНОВНЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ У ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ибупрофен
- Б) анальгин
- В) ацетилсалициловая кислота
- Г) адреналин

**965. [T005777] ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА РЕБЕНКУ ВВОДЯТ**

- А) глюкозу
- Б) инсулин короткого действия
- В) инсулин пролонгированного действия
- Г) супрастин

**966. [T005793] ПОД ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ПОНИМАЮТ**

- А) диагностику болезни у эмбриона или плода
- Б) мероприятия по предотвращению беременности при высоком риске рождения больного ребенка
- В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания у ребенка
- Г) оценку риска развития заболевания будущего ребенка

**967. [T005800] ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН**

- А) минеральный
- Б) углеводный
- В) липидный
- Г) белковый

**968. [T005801] ВИТАМИН, КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ РАХИТА, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) эргокальциферол
- Б) пиридоксин
- В) ретинол
- Г) аскорбиновая кислота

**969. [T006026] НЕОТЛОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) дыхание увлажнённым кислородом
- Б) гипербарическая оксигенация
- В) искусственная вентиляция лёгких
- Г) применение ноотропов

**970. [T006029] ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРОТИВОПОКАЗАНО**

- А) быстрое снижение артериального давления
- Б) введение глюкокортикоидов
- В) самостоятельное дыхание
- Г) применение диуретиков

**971. [T006039] ПРИ БОТУЛИЗМЕ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО**

- А) параличом дыхательной мускулатуры
- Б) поражением паренхимы лёгких
- В) закупоркой дыхательных путей фибринозными плёнками
- Г) выраженной интоксикацией

**972. [T006040] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ НЕОБХОДИМО**

- А) обеспечить соблюдение строгого постельного режима
- Б) перевести больного на парентеральное питание
- В) изолировать в отдельную палату
- Г) регулярно промывать желудок

**973. [T006042] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) асфиксия
- Б) кожный зуд
- В) судороги
- Г) непроизвольное мочеиспускание

**974. [T006044] АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ**

- А) ужаление пчел
- Б) укус клещей
- В) укус комаров
- Г) укус вшей

**975. [T006054] НА СТАДИИ ИНФИЛЬТРАТА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНİТЬ**

- А) холод
- Б) разрез
- В) тепло
- Г) дренирование

**976. [T006055] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ СЕРОЗНОГО МАСТИТА ПРИМЕНЯЮТ**

- А) холод, поддерживающую повязку
- Б) обработку железы этиловым спиртом
- В) повязку с фурацилином
- Г) разрез, поддерживающую повязку

**977. [T006056] КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ**

- А) два
- Б) один
- В) четыре
- Г) три

**978. [T006057] КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПОСТРАДАВШИХ ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКЕ СОСТАВЛЯЮТ**

- А) пять
- Б) три
- В) четыре
- Г) две

**979. [T006058] ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ**

- А) обезболивание, тугое бинтование, иммобилизация, щелочное питье
- Б) наложение жгута, сосудорасширяющие, согревание, слабокислое питье
- В) обезболивание, наложение жгута, согревание, щелочное питье
- Г) тугое бинтование, слабокислое питье, согревание

**980. [T006060] МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 5-7
- Б) 1-2
- В) 3-5
- Г) 10-15

**981. [T006063] ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) шиной Дитерихса
- Б) воротником Шанца
- В) гипсовой повязкой
- Г) шиной Крамера

**982. [T006064] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) марлевая повязка, смоченная содовым раствором
- Б) марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты
- В) сухая марлевая повязка
- Г) промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной кислоты

**983. [T006066] К СТЕПЕНИ "ГЛУБОКОГО" ОЖОГА ОТНОСИТСЯ СТАДИЯ**

- А) IIIб
- Б) II
- В) I
- Г) IIIа

**984. [T006067] К СРЕДСТВУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) йодид калия
- Б) афин
- В) тарен
- Г) этаперазин

**985. [T006069] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ "УГАРНЫМ ГАЗОМ" ОТНОСИТСЯ**

- А) образование в крови карбоксигемоглобина
- Б) образование в крови метгемоглобина
- В) образование в крови миоглобина
- Г) образование в крови оксигемоглобина

**986. [T006070] ОЧЕРЕДНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫМ В СОСТОЯНИИ ШОКА**

- А) первая
- Б) отсроченная
- В) не подлежат эвакуации
- Г) вторая

**987. [T006071] ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ**

- А) запрокинута назад
- Б) согнута вперед
- В) повернута на бок
- Г) не имеет значения

**988. [T006072] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЕРТИ**

- А) появление на коже трупных пятен
- Б) отсутствие самостоятельного дыхания
- В) отсутствие рефлексов
- Г) отсутствие сердечной деятельности

**989. [T006073] К ГЛАВНОМУ ПРИЗНАКУ ОТЕКА ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ**

- А) клокочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой
- Б) систолические шумы
- В) эмфизема легких
- Г) набухшие вены

**990. [T006074] ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) судороги, рвотные движения.
- Б) клокочущее дыхание
- В) набухшие сосуды
- Г) головная боль

**991. [T006075] САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ С ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ОТЁКЕ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) вдыхание кислорода через пары спирта
- Б) озонотерапия
- В) ИВЛ
- Г) оксигенотерапия

**992. [T006076] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) фибрилляция желудочков сердца
- Б) угнетение дыхания
- В) кровотечения и переломы
- Г) отрыв конечностей

**993. [T006077] ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) гангреной, омертвением всех тканей
- Б) отеком, покалыванием
- В) гиперемией, болью
- Г) мраморностью кожи

**994. [T006078] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ, ОТНОСИТСЯ**

- А) Дезо
- Б) окклюзионная
- В) спиральная
- Г) черепашья

**995. [T006079] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ГОЛЕНОСТОПНЫХ СВЯЗОК, ОТНОСИТСЯ**

- А) восьмиобразная
- Б) черепашья
- В) уздечка
- Г) колосовидная

**996. [T006080] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАНЕНИЯХ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ОТНОСИТСЯ**

- А) "чепец"
- Б) т-образная
- В) восьмиобразная
- Г) уздечка

**997. [T006081] ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1000-1500мл
- Б) 900мл
- В) 600-700мл
- Г) 2000-2500 мл

**998. [T006082] ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ**

- А) большой кровопотери
- Б) длительного безводного периода
- В) нарушения метаболизма
- Г) стремительных родов

**999. [T006083] К ПРИЧИНАМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ОТНОСЯТСЯ**

- А) обширные ожоги
- Б) пневмония
- В) хронический цистит
- Г) хронический гломерулонефрит

**1000. [T006084] К ТАБЕЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВАМ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
ОТНОСИТСЯ**

- А) аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный противохимический пакет
- Б) ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз
- В) костюм противохимической защиты
- Г) фильтрующий противогаз

**1001. [T006085] К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ НА ЭТАПАХ  
МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ОТНОСЯТ**

- А) эвакуационно-транспортную, внутрипунктовую
- Б) диагностическую
- В) транспортную
- Г) внутреннюю

**1002. [T006086] ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ I СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРНО**

- А) судорожное сокращение мышц
- Б) потеря сознания
- В) расстройства дыхания и кровообращения
- Г) клиническая смерть

**1003. [T006087] ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОТРАВМАМИ**

- А) госпитализируются скорой помощью
- Б) направляются на прием к участковому врачу
- В) не нуждаются в дальнейшем обследованию и лечении
- Г) направляются на дополнительное обследование

**1004. [T006088] КЛИНИКА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ И ОТЕКА ЛЕГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- А) острой левожелудочковой недостаточности
- Б) острой правожелудочковой недостаточности
- В) острой сосудистой недостаточности
- Г) бронхиальной астме

**1005. [T006089] ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО С ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) положение с приподнятыми конечностями
- Б) положение на боку
- В) положение полусида
- Г) положение с приподнятым изголовьем

**1006. [T006091] ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ**

- А) 10 литров воды
- Б) 1 литров воды
- В) 2 литров воды
- Г) 5 литров воды

**1007. [T006092] БОЛЬНЫЕ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ**

- А) во всех случаях острых отравлений
- Б) при тяжелом состоянии больного
- В) в случаях, когда не удалось промыть желудок
- Г) при бессознательном состоянии больного

**1008. [T006093] ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ**

- А) в нижние этажи и подвалы
- Б) в верхние этажи зданий
- В) на улицу
- Г) оставаться на месте

**1009. [T006094] ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ХЛОРА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ**

- А) в верхние этажи зданий
- Б) оставаться на месте
- В) на улицу
- Г) в нижние этажи и подвалы

**1010. [T006095] ПАРЫ ХЛОРА И АММИАКА ВЫЗЫВАЮТ**

- А) слезотечение
- Б) возбуждение и эйфорию
- В) раздражение верхних дыхательных путей
- Г) ларингоспазм

**1011. [T006096] ОБИЛЬНАЯ ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- А) отека легких
- Б) пневмонии
- В) легочного кровотечения
- Г) кровохарканья

**1012. [T006099] НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ**

- А) лежа на спине на твердой поверхности
- Б) произвольном
- В) с опущенной вниз головой
- Г) с приподнятой ножным концом

**1013. [T006101] К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ**

- А) отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях
- Б) отсутствие сознания, дыхания, аритмия
- В) нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз
- Г) отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия

**1014. [T006102] К МЕТОДУ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО СВОЕВРЕМЕННО ОКАЗАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ МАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИИ ПОРАЖЕННЫХ, ОТНОСЯТ**

- А) медицинскую сортировку
- Б) оказание неотложной помощи
- В) организованную эвакуацию
- Г) выведение из очага

**1015. [T006103] К ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) перелом ребер
- Б) перелом позвоночника
- В) травма внутренних органов
- Г) перелом нижней челюсти

**1016. [T006104] КАРДИОГЕННЫЙ ШОК МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- А) инфаркта миокарда
- Б) кровотечения
- В) обширных ожогов
- Г) воздействия бактериальных токсинов

**1017. [T006105] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО**

- А) гиперемированные
- Б) желтушные
- В) бледные
- Г) цианотичные

**1018. [T006107] ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ С ОТСЛОЙКОЙ ЭПИДЕРМИСА И ОБРАЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЕЙ СО СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГОМ**

- А) 2 степени
- Б) 1 степени
- В) 3 степени
- Г) 4 степени

**1019. [T006108] К ПРЕПАРАТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА, ОТНОСИТСЯ**

- А) адреналин
- Б) мезатон
- В) фуросемид
- Г) анальгин

**1020. [T006109] К ПРИЗНАКУ АСИСТОЛИИ ОТНОСИТСЯ ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА НА АРТЕРИИ**

- А) сонной
- Б) тыла стопы
- В) подколенной
- Г) лучевой

**1021. [T006111] ПОД ШОКОВЫМ ИНДЕКСОМ ПОНИМАЮТ**

- А) отношение частоты пульса к величине систолического АД, равное 0,5
- Б) отношение частоты пульса к величине систолического АД, равное 1
- В) отношение частоты пульса к величине диастолического АД, равное 1
- Г) отношение частоты пульса к величине диастолического АД, равное 0,5

**1022. [T006112] ВЕЛИЧИНА АД И ЧАСТОТА ПУЛЬСА РОДИЛЬНИЦЫ ПОМОГАЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОЦЕНИТЬ**

- А) стадии геморрагического шока
- Б) стадии ДВС -синдрома
- В) аномалию родовой деятельности
- Г) степень гипоксии плода

**1023. [T006114] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) угнетение центральной нервной системы
- Б) нарушение гемодинамика
- В) нарушение мочеиспускания
- Г) гипотермия

**1024. [T006115] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) быстрое воздействие на организм
- Б) соблюдение стерильности
- В) медленное постепенное влияние на организм
- Г) удобство применения

**1025. [T006116] ПАРЕНТЕРАЛЬНО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТ**

- А) внутривенно, внутримышечно
- Б) через дыхательные пути
- В) в прямую кишку
- Г) через рот

**1026. [T006117] ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВЛИВАНИЯ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕНЫ**

- А) локтевого сгиба
- Б) кисти
- В) стопы
- Г) головы

**1027. [T006118] ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ**

- А) анафилактического шока
- Б) аллергический ринит
- В) крапивницы
- Г) покраснения

**1028. [T006119] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ ИЛИ ЩЕЛОЧАМИ ЗАПРЕЩЕНО ВВЕДЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗаторов в ЖЕЛУДОК из-за**

- А) угрозы возникновения острого расширения желудка, образующимся углекислым газом, что может привести к значительному ухудшению состояния пациента;
- Б) угрозы возникновения перфорации желудка;
- В) угрозы отравления организма образующимся углекислым газом;
- Г) возникновения анафилактического шока.

**1029. [T006120] К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА отНОСЯт**

- А) желудочное кровотечение
- Б) отравление грибами
- В) отравление алкоголем
- Г) эндогенная интоксикация азотистыми шлаками

**1030. [T006121] КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ БЕЗЗОНДОВОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА, (Л)**

- А) 2-3
- Б) 0,1-0,5
- В) 3-5
- Г) 5-10

**1031. [T006122] ПРИ КРОВОХАРКАНИИ И ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО:**

- А) ставить банки и горчичники на грудную клетку
- Б) усадить и успокоить пациента
- В) положить пузырь со льдом на грудную клетку
- Г) приподнять головной конец туловища

**1032. [T006123] ПОД ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ПИТАНИЕ**

- А) минуя желудочно-кишечный тракт
- Б) через желудочный зонд
- В) с помощью питательных клизм
- Г) через гастростому

**1033. [T006124] ПРИ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЗОНДА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) тонкий желудочный зонд
- Б) дуоденальный зонд
- В) толстый желудочный зонд
- Г) газоотводную трубку

**1034. [T006125] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА**

- А) наличие у него дыхания и центрального пульса
- Б) поиск возможных медицинских документов
- В) поиск документов, удостоверяющих личность
- Г) общий осмотр

**1035. [T006126] ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) травмы не совместимые с жизнью
- Б) онкологические заболевания
- В) старческий возраст
- Г) алкоголизм, наркомания

**1036. [T006127] К ОСНОВНОМУ ДЕЙСТВИЮ АДРЕНАЛИН ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) повышение возбудимости миокарда
- Б) появление злокачественную тахикардию
- В) понижение возбудимости миокарда
- Г) появление брадикардию

**1037. [T006128] ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ 1 СТЕПЕНИ КРОВОПОТЕРЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 0,5 л
- Б) 1 л
- В) 1,5 л
- Г) 2 л

**1038. [T006129] ПРИ НЕСТЕРПИМЫХ «КИНЖАЛЬНЫХ» БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИ ТАЛЬНОМ ЭТАПЕ**

- А) анальгетики не вводят
- Б) можно вводить только ненаркотические анальгетики
- В) анальгетики можно давать таблетированно (таблетку рассосать или разжевать)
- Г) можно давать таблетки, содержащие анальгетики и спазмолитики одновременно (ревалгин)

**1039. [T008828] ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) женская консультация
- Б) отделение гинекологии
- В) перинатальный центр
- Г) федеральный научно-исследовательский центр

**1040. [T008829] ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) женская консультация
- Б) отделение гинекологии
- В) перинатальный центр
- Г) федеральный научно-исследовательский центр

**1041. [T008860] ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) Приказ № 514н Минздрава России
- Б) Приказ № 353 Минздрава России
- В) Приказ № 689н Минздрава России
- Г) Приказ № 928 Минздрава России

**1042. [T008865] ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЕ ДЕВОЧКИ И ДЕВОЧКИ С ФАКТОРАМИ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОсятся К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- А) I
- Б) II
- В) III
- Г) IV

**1043. [T008872] ЖЕНЩИНЫ, НАБЛЮДАЮЩИЕСЯ ПО ПОВОДУ  
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- A) V
- Б) I
- В) II
- Г) III

**1044. [T008878] ЖЕНЩИНЫ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- A) 5
- Б) 2
- В) 1
- Г) 4

**1045. [T008879] ЖЕНЩИНЫ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ И БЕСПЛОДИЕМ  
ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ**

- A) 5
- Б) 2
- В) 1
- Г) 4

**1046. [T008911] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- A) нейроэндокринными синдромами
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

**1047. [T008912] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- A) бесплодием
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

**1048. [T008913] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- А) неправильным положением половых органов
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

**1049. [T008914] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- А) доброкачественными заболеваниями шейки матки
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

**1050. [T008915] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С**

- А) трихомонадным кольпитом
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

**1051. [T008916] ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выявление визуальных форм онкологических заболеваний
- Б) проведение лапароскопии
- В) проведение гистероскопии
- Г) проведение вагиноскопии

**1052. [T008917] ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) проведение санитарно-просветительной работы
- Б) проведение лапароскопии
- В) проведение гистероскопии
- Г) проведение вагиноскопии

**1053. [T008918] ДИАГНОЗЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ АКУШЕРКОЙ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) ориентировочными
- Б) окончательными
- В) заключительными
- Г) дополнительными

**1054. [T008919] ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА УСТАНАВЛИВАЕТ**

- А) врач соответствующего профиля
- Б) акушерка
- В) медицинская сестра
- Г) медицинский регистратор

**1055. [T008920] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ**

- А) с 8:00 до 20:00 ч
- Б) с 10:00 до 20:00 ч
- В) с 10:00 до 18:00 ч
- Г) С 8:00 ДО 24:00 ч

**1056. [T008921] РАБОТА ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- А) 2 смены
- Б) 3 смены
- В) 1 смену
- Г) 4 смены

**1057. [T008922] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В СУББОТНИЕ ДНИ**

- А) с 8:00 до 18:00 ч
- Б) с 10:00 до 20:00 ч
- В) с 10:00 до 18:00 ч
- Г) с 8:00 до 10:00 ч

**1058. [T008923] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ**

- А) с 8:00 до 18:00 ч
- Б) с 10:00 до 20:00 ч
- В) с 10:00 до 18:00 ч
- Г) с 8:00 до 10:00 ч

**1059. [T008924] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ**

- А) с 8:00 до 18:00 ч
- Б) с 10:00 до 20:00 ч
- В) с 10:00 до 18:00 ч
- Г) с 8:00 до 10:00 ч

**1060. [T008925] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ**

- А) по методам контрацепции
- Б) по санаторно-курортному лечению
- В) по физиотерапии
- Г) по лечебной гимнастике

**1061. [T008926] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) работу с женщинами группы риска наступления нежелательной беременности
- Б) консультирование по санаторно-курортному лечению
- В) консультирование по методам физиотерапии
- Г) консультирование по методам лечебной гимнастике

**1062. [T008927] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) мониторинг репродуктивного поведения женщин после родов и абортов
- Б) консультирование по санаторно-курортному лечению
- В) консультирование по физиотерапии
- Г) консультирование по лечебной гимнастике

**1063. [T008928] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) использование современных методов контрацепции
- Б) консультирование по санаторно-курортному лечению
- В) консультирование по физиотерапии
- Г) консультирование по лечебной гимнастике

**1064. [T008929] ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СПИСКИ**

- А) женщин прикрепленного района
- Б) всех жителей прикрепленного района
- В) детей прикрепленного района
- Г) инвалидов прикрепленного района

**1065. [T008930] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗЕРВОМ**

- А) снижения онкологических заболеваний женских половых органов
- Б) повышения госпитализаций
- В) повышения иммунизации
- Г) снижения частоты вирусных инфекций

**1066. [T008931] УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНИТАЛИЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДЯТ**

- А) 1 раз в год
- Б) 2 раз в год
- В) 3 раз в год
- Г) 4 раз в год

**1067. [T008932] ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ АНАЛИЗИРУЮТ ПО ДАННЫМ**

- А) профилактической работы и ее результатов
- Б) санаторно-курортного лечения
- В) физиотерапевтического лечения
- Г) паллиативного лечения

**1068. [T008933] ПОД ВНЕДРЕНИЕМ ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКИ В ЭНДОМЕТРИЙ ПОНИМАЮТ**

- А) имплантацию
- Б) овуляцию
- В) секрецию
- Г) менструацию

**1069. [T008934] ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) дыхательная
- Б) выработка антител
- В) выделительная
- Г) свертывающая

**1070. [T008935] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В МОЧЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК**

- А) пиурию
- Б) глюкозурию
- В) полиурию
- Г) гематурию

**1071. [T008936] ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- А) полиурия
- Б) изостенурия
- В) олигурия
- Г) гипостенурия

**1072. [T008937] ПРИ ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ ВНЕШНИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МОЖНО ВЫЯВИТЬ**

- А) рак кожи
- Б) рак эндометрия
- В) опухоль яичников
- Г) рак мочевого пузыря

**1073. [T008938] ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК НЕ ИМЕЕТ**

- А) ворсинок
- Б) сальниковых отростков
- В) гаустр
- Г) продольных мышечных лент

**1074. [T008939] В СОСТАВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ВХОДИТ  
КИШКА**

- 
- А) ободочная
  - Б) тощая
  - В) подвздошная
  - Г) 12-перстная

**1075. [T008940] АППЕНДИКС ВЫПОЛНЯЕТ \_\_\_\_\_ ФУНКЦИЮ**

- А) иммунную
- Б) пищеварительную
- В) депонирующую
- Г) кроветворную

**1076. [T008942] СЛИЗИСТАЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СОДЕРЖИТ**

- А) солитарные фолликулы, бокаловидные клетки
- Б) пейеровы бляшки
- В) круговые складки
- Г) пилорические железы

**1077. [T008943] ОБКЛАДОЧНЫЕ КЛЕТКИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА ВЫРАБАТЫВАЮТ**

- А) соляную кислоту
- Б) гастрин
- В) пепсиноген
- Г) мукопротеидный секрет

**1078. [T008944] В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПРОИСХОДИТ**

- А) расщепление и всасывание питательных веществ
- Б) механическая обработка питательных веществ
- В) расщепление питательных веществ с помощью микрофлоры
- Г) оценка качества питательных веществ

**1079. [T008945] В СОСТАВ СЛЮНЫ ВХОДЯТ ФЕРМЕНТЫ РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ**

- А) углеводы
- Б) нуклеиновые кислоты
- В) жиры
- Г) белки

**1080. [T008946] ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- А) кишечных ворсинок, пейеровых бляшек, круговых складок
- Б) продольных складок
- В) кишечных полей
- Г) полуулунных складок

**1081. [T008949] БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ НА ДВА ГЛАВНЫХ БРОНХА ПРОИСХОДИТ НА УРОВНЕ ПОЗВОНКОВ**

- А) 4-5 грудных
- Б) 7 шейного - 1 грудного
- В) 2-3 грудных
- Г) 6-7 грудных

**1082. [T008950] АНТИТЕЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЛКИ**

- А) глобулины
- Б) альбумины
- В) ферменты
- Г) фибриноген

**1083. [T008951] АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ РЕЗУС РАСПОЛОЖЕНЫ НА**

- А) эритроцитах
- Б) белках
- В) тромбоцитах
- Г) лейкоцитах

**1084. [T008952] К АГГЛЮТИНОГЕНАМ 1 ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСЯТ**

- А) 0
- Б) АВ
- В) А
- Г) В

**1085. [T008953] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТА СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 120 дней
- Б) 40 дней
- В) 80 дней
- Г) 20 дней

**1086. [T008954] АЛЬБУМИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ**

- А) поддержание онкотического давления
- Б) фагоцитоз
- В) постоянство температуры тела
- Г) сохранение постоянства осмотического давления

**1087. [T008955] ОКСИТОЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В**

- А) гипофизе
- Б) надпочечниках
- В) вилочковой железе
- Г) эпифизе

**1088. [T008956] АГГЛЮТИНОГЕНЫ СОДЕРЖАТСЯ В**

- А) эритроцитах
- Б) тромбоцитах
- В) плазме
- Г) сыворотке

**1089. [T008957] АГГЛЮТИНИНЫ СОДЕРЖАТСЯ В**

- А) плазме
- Б) эритроцитах
- В) тромбоцитах
- Г) лейкоцитах

**1090. [T008958] СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В ЩЕЛОЧНУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- А) алкалоз
- Б) ацидоз
- В) пиноцитоз
- Г) гемостаз

**1091. [T008959] ПОД ГЕМАТОКРИТОМ ПОНИМАЮТ ОТНОШЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ К**

- А) плазме
- Б) лейкоцитам
- В) сыворотке
- Г) тромбоцитам

**1092. [T008960] ЯИЧНИКОВЫЕ АРТЕРИИ ОТХОДЯТ ОТ**

- А) брюшной аорты
- Б) почечной артерии
- В) внутренней подвздошной артерии
- Г) нижней брыжеечной артерии

**1093. [T008961] СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- А) ацидоз
- Б) гемостаз
- В) алкалоз
- Г) пиноцитоз

**1094. [T008962] В 1 МКЛ КРОВИ ЖЕНЩИНЫ В НОРМЕ СОДЕРЖИТСЯ ЭРИТРОЦИТОВ**

- А) 4.0-4.5
- Б) 3-4
- В) 6-7
- Г) 7-8

**1095. [T008963] ПОД ФИБРИНОГЕНОМ В КРОВИ ПОНИМАЮТ БЕЛОК КОТОРЫЙ**

- А) растворен в плазме
- Б) содержится в эритроцитах
- В) содержится в лейкоцитах
- Г) способствует кровотечению

**1096. [T008964] К АГГЛЮТИНИНАМ IV ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ**

- А) 0
- Б) альфа, бета
- В) альфа
- Г) бета

**1097. [T008965] КЛЕТКИ КРОВИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НОСЯТ НАЗВАНИЕ**

- А) лейкоциты
- Б) эритроциты
- В) тромбоциты
- Г) фибриноген

**1098. [T008966] К АГГЛЮТИНОГЕНАМ II ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСИТСЯ**

- А) А
- Б) АВ
- В) 0
- Г) В

**1099. [T008967] ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЯИЧНИКА СОЕДИНЯЕТСЯ С**

- А) широкой маточной связкой
- Б) маткой
- В) боковой стенкой таза
- Г) круглой маточной связкой

**1100. [T008968] ВРЕМЯ ПОЛНОГО СВЕРТЫВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МИН)**

- А) 3-5
- Б) 1-3
- В) 5-7
- Г) 7-9

**1101. [T008969] АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ БЕЛОК**

- А) фибриноген
- Б) гепарин
- В) альбумин
- Г) глобулин

**1102. [T008970] ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ (%)**

- А) 40-45
- Б) 35-39
- В) 46-50
- Г) 51-55

**1103. [T008971] ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ПЛАЗМА СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- А) 55-60
- Б) 50-54
- В) 61-65
- Г) 66-70

**1104. [T008973] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭПИТЕЛИЕМ**

- А) цилиндрическим мерцательным
- Б) железистым
- В) кубическим
- Г) плоским

**1105. [T008974] НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- А) энурез
- Б) гематурия
- В) пиурия
- Г) глюкозурия

**1106. [T008976] ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ (МЛ)**

- А) 250-500
- Б) 500-700
- В) 100-200
- Г) 1000-1300

**1107. [T008977] К ЭЛЕМЕНТУ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ**

- А) синусовый узел, предсердно-желудочный узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье
- Б) симпатические и парасимпатические нервы
- В) венечный синус, ушки предсердий
- Г) сосочковые мышцы, сухожильные нити

**1108. [T008978] В ВОРОТНУЮ ВЕНУ ОТТЕКАЕТ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТ**

- А) кишечника
- Б) почки
- В) надпочечников
- Г) диафрагмы

**1109. [T008979] НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ СЛИЯНИИ ВЕН**

- А) общих подвздошных
- Б) поясничных
- В) селезеночных
- Г) печеночных

**1110. [T008980] В НОРМЕ ГЛАВНЫМ ВОДИТЕЛЕМ РИТМА СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) синусно-предсердный узел
- Б) предсердно-желудочный узел
- В) предсердно-желудочный пучок
- Г) волокна Пуркинье

**1111. [T008981] ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАНОМ**

- А) двустворчатым (митральным)
- Б) четырехстворчатым
- В) трехстворчатым
- Г) полуулунным

**1112. [T008982] САМЫМ КРУПНЫМ НЕРВОМ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) седалищный
- Б) запирательный
- В) бедренный
- Г) срединный

**1113. [T008983] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН В СМОТРОВЫХ КАБИНЕТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- А) акушерка
- Б) онколог
- В) медицинская сестра
- Г) терапевт

**1114. [T008984] РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТ (МИН)**

- А) 15
- Б) 30
- В) 40
- Г) 60

**1115. [T008985] ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В СМОТРОВОЙ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- А) 40-60
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 80-90

**1116. [T008986] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гигрометр
- Б) термометр
- В) барометр
- Г) анемометр

**1117. [T008987] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) барометр
- Б) термометр
- В) анемометр
- Г) гигрометр

**1118. [T008988] ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ (°C)**

- A) 22-25
- Б) 18-20
- В) 15-18
- Г) 27-28

**1119. [T008989] К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- A) медицинская карта стационарного больного
- Б) бланк экстренного извещения
- В) направление на санаторно-курортное лечение
- Г) направление в стационар

**1120. [T008990] СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- A) водным балансом
- Б) суточным диурезом
- В) дневным диурезом
- Г) никтурией

**1121. [T008991] КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ**

- A) утром натощак
- Б) после завтрака
- В) в любое время дня
- Г) на ночь

**1122. [T008992] ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)**

- A) 10
- Б) 5
- В) 7
- Г) 3

**1123. [T008993] ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ БАЗАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЯМОЙ КИШКЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)**

- А) 7-10
- Б) 11-12
- В) 5-6
- Г) 3-5

**1124. [T008994] ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (УДАРОВ В МИН)**

- А) 60-80
- Б) 90-100
- В) 40-60
- Г) 100-110

**1125. [T008995] В НОРМЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 16-20
- Б) 10-12
- В) 22-26
- Г) 28-32

**1126. [T008996] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ОТРАЖАЕТ**

- А) соотношение массы тела (кг) к длине тела ( $\text{м}^2$ )
- Б) соотношение длины тела ( $\text{м}^2$ ) к массе тела (кг)
- В) соотношение массы тела (кг) к возрасту (лет)
- Г) соотношение длины тела ( $\text{м}^2$ ) к возрасту (лет)

**1127. [T008997] ЗА ТРИ ДНЯ ДО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ**

- А) молоко, овощи, черный хлеб
- Б) гречневую кашу, гранат
- В) яйца, белый хлеб, шоколад
- Г) мясо, рыбу, творог

**1128. [T008998] ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ**

- А) боль, ощущение жжения при мочеиспускании
- Б) увеличение суточного диуреза
- В) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время
- Г) моча соломенно-желтого цвета

**1129. [T008999] РАЗНОСТЬ МЕЖДУ СИСТОЛИЧЕСКИМ И ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) пульсовым давлением
- Б) максимальным артериальным
- В) минимальным артериальным
- Г) дефицитом пульса

**1130. [T009000] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ.РТ.СТ.)**

- А) 40-50
- Б) 60-89
- В) 80-100
- Г) 100-139

**1131. [T009001] МАКСИМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) систолическим
- Б) диастолическим
- В) аритмическим
- Г) пульсовым

**1132. [T009002] К ФАКТОРУ, СНИЖАЮЩЕМУ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) уменьшение объема циркулирующей крови
- Б) повышение потребления поваренной соли
- В) применение сосудосуживающих средств
- Г) прием алкоголя

**1133. [T009003] МИНИМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) диастолическим
- Б) аритмическим
- В) пульсовым
- Г) систолическим

**1134. [T009004] КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) апноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахипноэ
- Г) асфиксия

**1135. [T009005] ПО НАПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ ПУЛЬС**

- А) полный, пустой
- Б) ритмичный, аритмичный
- В) скорый, медленный
- Г) твердый, мягкий

**1136. [T009006] УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) тахипноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахикардия
- Г) брадикардия

**1137. [T009007] ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ВОЗНИКАЕТ ОДЫШКА**

- А) физиологическая
- Б) смешанная
- В) патологическая
- Г) инспираторная

**1138. [T009008] СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕПРИЯТНЫМ ОЩУЩЕНИЕМ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) удушьем
- Б) бронхиальной астмой
- В) диспноэ
- Г) сердечной астмой

**1139. [T009009] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЫВАЕТ НИЖЕ**

- А) утром
- Б) днем
- В) вечером
- Г) после физической нагрузки

**1140. [T009010] В МЕСТАХ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДОЛЖНО БЫТЬ  
ОТСУТСВИЕ**

- А) гиперемии, припухлости
- Б) волосяного покрова
- В) родинок
- Г) пигментных пятен

**1141. [T009011] СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ  
ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) лизис
- Б) фебрилитет
- В) кризис
- Г) субфебрилитет

**1142. [T009012] В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ**

- А) бланк экстренного извещения УФ№ 058\у
- Б) медицинскую карту стационарного больного
- В) статистическую карту, выбывшего из стационара
- Г) журнал приема и регистрации больных

**1143. [T009013] ОПРЕЛОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- А) воспалением кожи в области естественных складок
- Б) некротическим повреждением ткани
- В) воспалением мышечной ткани
- Г) воспалением подкожно- жировой клетчатки

**1144. [T009014] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) ростомер
- Б) тонометр
- В) урометр
- Г) динамометр

**1145. [T009015] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) весы
- Б) тонометр
- В) урометр
- Г) динамометр

**1146. [T009207] ГНОЕВИДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) гонореи
- Б) трихомонадной инфекции
- В) сифилиса
- Г) кандидоза

**1147. [T009208] ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА ВОЗМОЖНО ПРИ ИНФЕКЦИИ**

- А) хламидийной
- Б) кандидозной
- В) трихомонадной
- Г) уреаплазмой

**1148. [T009219] ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НАЗНАЧАЮТ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ**

- А) сразу после аборта
- Б) через 1 месяц
- В) через 2 месяца
- Г) через 3 месяца

**1149. [T009222] КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НАЧАВШЕГОСЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кровянистые выделения из половых путей
- Б) нависание сводов влагалища
- В) болезненность придатков матки при пальпации
- Г) положительный френикус-симптом

**1150. [T009223] ОДНИМ ИЗ РАННИХ СИМПТОМОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) контактное кровотечение
- Б) нарушение мочеиспускания
- В) гематурия
- Г) симптом Щёткина-Блюмберга

**1151. [T009227] ВОЗБУДИТЕЛЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) стафилококк
- Б) хламидия
- В) гонококк
- Г) трихомонада

**1152. [T009228] ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) переход в хроническую форму
- Б) эндоцервицит
- В) развитие хронического кольпита
- Г) развитие хронического цистита

**1153. [T009230] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) презерватив
- Б) прерванный половой акт
- В) влагалищная диафрагма
- Г) шеечные колпачки

**1154. [T009231] БАРТОЛИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕМ**

- А) желез предверия влагалища
- Б) яичниковой ткани
- В) молочных желез
- Г) параректальной клетчатки

**1155. [T009232] ВНУТРИМАТОЧНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ**

- А) воспалительных заболеваниях половых органов
- Б) резус-отрицательной принадлежности крови пациента
- В) низкой массе тела
- Г) ожирении

**1156. [T009233] К ГРУППЕ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ИНФЕКЦИЙ,  
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ**

- А) ведущие беспорядочную половую жизнь
- Б) работающие в детских лечебных учреждениях
- В) не живущие половой жизнью
- Г) страдающие гипертонией

**1157. [T009234] ОСЛОЖНЕНИЕМ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) невынашивание беременности
- Б) миома матки
- В) эндометриоз
- Г) увеличение подмышечных лимфоузлов

**1158. [T009262] ОПЕРАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) миомэктомия
- Б) тубэктомия
- В) овариоэктомия
- Г) сальпингоэктомия

**1159. [T009263] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) хирургический
- Б) медикаментозный
- В) физиотерапевтический
- Г) санаторно-курортный

**1160. [T009264] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) медикаментозный
- Б) хирургический
- В) физиотерапевтический
- Г) санаторно-курортный

**1161. [T009265] ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) аменореей
- Б) дисменореей
- В) ациклическим маточным кровотечением
- Г) меноррагией

**1162. [T009266] СКУДНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) гипоменореей
- Б) гиперменореей
- В) полименореей
- Г) альгоменореей

**1163. [T009267] ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ, НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК, С КРОВОПОТЕРЕЙ БОЛЕЕ 150 МЛ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) гиперменореей
- Б) олигоменореей
- В) альгоменореей
- Г) гипоменореей

**1164. [T009268] ДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) полименореей
- Б) гиперменореей
- В) альгоменореей
- Г) гипоменореей

**1165. [T009269] ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С АЦИКЛИЧЕСКИМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) менометроррагией
- Б) полименореей
- В) альгоменореей
- Г) гипоменореей

**1166. [T009270] МЕЖМЕНСТРУАЛЬНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) метроррагией
- Б) менометроррагией
- В) полименореей
- Г) альгоменореей

**1167. [T009271] КОРОТКИЕ (ЦИКЛИЧЕСКИЕ) МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) олигоменореей
- Б) метроррагией
- В) менометроррагией
- Г) полименореей

**1168. [T009272] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) изменение цикличности, объема и длительности менструального кровотечения
- Б) резкая боль внизу живота
- В) патологические выделения из половых путей
- Г) иррадиация боли в прямую кишку

**1169. [T009273] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1170. [T009274] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1171. [T009275] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1172. [T009276] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ДО ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ ПЕРИОД НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1173. [T009277] АМЕНОРЕЯ ПРИ АТРЕЗИИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1174. [T009278] АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1175. [T009279] АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

**1176. [T009345] ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТ ПАЦИЕНТКИ**

- А) письменное согласие
- Б) денежное вознаграждение
- В) словесную благодарность
- Г) карту больного

**1177. [T009346] СПОСОБОМ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД БИМАНУАЛЬНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гигиенический
- Б) хирургический
- В) не требует обработки
- Г) обработка ладонной поверхности антисептиком

**1178. [T009348] КАЖДОЕ ПРЕДМЕТНОЕ СТЕКЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНО ДЕЛИТСЯ НА КОЛИЧЕСТВО ЧАСТЕЙ**

- А) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 5

**1179. [T009378] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- А) состояние внутренней половых органов и связанного аппарата
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

**1180. [T009379] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- А) положение, величину, болезненность матки
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

**1181. [T009380] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- А) состояние придатков матки
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

**1182. [T009381] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- А) связанного аппарата малого таза
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

**1183. [T009382] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ**

- А) состояние внутренних половых органов
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

**1184. [T009414] УКОРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) внутрибрюшного кровотечения
- Б) острого холецистита
- В) кишечной непроходимости
- Г) миомы матки

**1185. [T009415] УКОРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) острого воспаления с явлениями пельвиоперитонита
- Б) острого панкреатита
- В) кишечной непроходимости
- Г) миомы матки

**1186. [T009421] ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ФОРМОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) трубная беременность
- Б) яичниковая беременность
- В) брюшная беременность
- Г) межсвязочная беременность

**1187. [T009422] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО**

- А) ношение компрессионного трикотажа
- Б) обильное питье
- В) отложенная активизация пациенток
- Г) ранняя активизация пациенток

**1188. [T009423] ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) профилактика осложнений и реабилитация
- Б) назначение лечения
- В) общение с родственниками
- Г) беседы с пациенткой

**1189. [T009424] ФАЗОЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРИ ПЛНОВОЙ ОПЕРАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) первая
- Б) вторая
- В) середина цикла
- Г) не зависит от фазы

**1190. [T009425] «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) УЗИ и определение хорионального гонадотропина человека в сыворотке крови
- Б) бимануальное исследование
- В) осмотр в зеркалах
- Г) кульдоцентез

**1191. [T009426] РАЗРЫВ ЯИЧНИКА, СВЯЗАННЫЙ С РАЗРЫВОМ ФОЛЛИКУЛА В ПЕРИОД ОВУЛЯЦИИ ИЛИ РАЗРЫВОМ ЖЕЛТОГО ТЕЛА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) апоплексия яичника
- Б) киста яичника
- В) опухоль яичника
- Г) яичниковая беременность

**1192. [T009428] ДЛЯ НАРУШЕННОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРНО**

- А) приступ резких болей внизу живота с иррадиацией в прямую кишку в сочетании с нарушением менструального цикла
- Б) боль в промежности
- В) скучные кровянистые выделения из половых путей
- Г) увеличение живота

**1193. [T009431] ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- А) кисту яичника
- Б) миому матки
- В) прерывание беременности
- Г) роды

**1194. [T009433] ЗАПОДОЗРИТЬ НЕКРОЗ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- А) миому матки
- Б) прерывание беременности
- В) роды
- Г) кисту яичника

**1195. [T009434] ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) получить письменное согласие пациентки на экстренное оперативное вмешательство
- Б) накормить пациентку
- В) напоить пациентку
- Г) побеседовать с родственниками

**1196. [Т009435] ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) получить письменное согласие пациентки на плановое оперативное вмешательство
- Б) накормить пациентку
- В) напоить пациентку
- Г) побеседовать с родственниками

**1197. [Т009436] ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ ОПУХОЛИ ЯЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ**

- А) опухоль яичника
- Б) миому матки
- В) прерывание беременности
- Г) роды

**1198. [Т009437] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ РОЖДЕНИИ СУБМУКОЗНОГО УЗЛА МОЖЕТ БЫТЬ**

- А) выворот матки
- Б) разрыв матки
- В) разрыв промежности
- Г) выпадение петель кишечника

**1199. [Т009438] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) через третье лицо вызвать врача
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1200. [Т009439] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) вызвать бригаду скорой помощи
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1201. [T009440] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ  
АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) по назначению врача готовить пациентку к экстренной операции
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1202. [T009442] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ  
АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) вызвать лаборанта
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1203. [T009443] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ  
АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) оповестить операционных сестер
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1204. [T009444] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ  
АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) вызвать дополнительных сотрудников
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1205. [T009445] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ  
АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) по показаниям провести пункцию и катетеризацию второй периферической вены
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1206. [T009446] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) набрать кровь для анализов
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1207. [T009447] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) установить катетер в мочевой пузырь
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

**1208. [T009454] НЕЗАВИСИМЫМ ДЕЙСТВИЕМ АКУШЕРКИ ПРИ МАТОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) положить холод на низ живота
- Б) произвести выскабливание полости матки
- В) ввести сокращающие матку средства
- Г) ввести кровоостанавливающие препараты

**1209. [T009455] ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) обильные длительные, болезненные менструации
- Б) скучные, безболезненные менструации
- В) межменструальные кровянистые выделения
- Г) обильные пенистые выделения из половых путей

**1210. [T009456] КАЖДУЮ ОБНАРУЖЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК**

- А) потенциально злокачественную
- Б) воспалительную
- В) доброкачественную
- Г) злокачественную

**1211. [T009457] К ОСЛОЖНЕНИЯМ КИСТ ЯИЧНИКОВ ОТНОСИТСЯ**

- А) перекрут ножки с разрывом капсулы
- Б) рост кисты до больших размеров
- В) ущемление соседних органов
- Г) малигнизация кист

**1212. [T009458] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ НЕОБХОДИМО**

- А) цитологическое исследование аспирата из полости матки
- Б) лапароскопия
- В) пункция заднего свода влагалища
- Г) бактериоскопия

**1213. [T009459] ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) биопсия шейки матки с последующим гистологическим исследованием
- Б) лапароскопия
- В) пункция заднего свода влагалища
- Г) бактериоскопия

**1214. [T009460] ПРИОРИТЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АКУШЕРКИ ПРИ ПОДЗРЕНИИ У ПАЦИЕНТКИ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ**

- А) направление на консультацию к онкологу
- Б) проведение кольпоскопии
- В) проведение лабораторного исследования
- Г) приглашение на повторный прием

**1215. [T009461] НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ХОРИОНКАРЦИНОМА ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ**

- А) пузырного заноса
- Б) абортов
- В) родов
- Г) выкидышей

**1216. [T009463] ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПОКАЗАНА ПРИ**

- А) перекрут ножки опухоли
- Б) трихомонадном колпите
- В) гиперплазии эндометрия
- Г) кандидамикозе

**1217. [T009464] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРИЧИНОЙ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) нарушенная внематочная беременность
- Б) трихомонадный кольпит
- В) гиперплазия эндометрия
- Г) кандидамиоз

**1218. [T009466] ГНОЙ ПРИ ПУНКЦИИ ЗАДНЕГО СВОДА ВЛАГАЛИЩА УКАЗЫВАЕТ НА**

- А) пельвиоперитонит
- Б) острый эндометрит
- В) гиперплазию эндометрия
- Г) внематочную беременность

**1219. [T009467] ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТОМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) воспаление брюшины малого таза
- Б) воспаление околоматочной клетчатки
- В) воспаление придатков
- Г) воспаление матки

**1220. [T009468] ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ФОРМИРУЕТСЯ**

- А) оструя анемия
- Б) пельвиоперитонит
- В) абсцесс
- Г) матка Кувелера

**1221. [T009469] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) лапароскопия
- Б) кульдоцентез
- В) гистероскопия
- Г) кольпоскопия

**1222. [T009470] ДЛЯ РАСЧЕТА ШОКОВОГО ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА  
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ**

- А) тонометр
- Б) тазометр
- В) стетоскоп
- Г) фонендоскоп

**1223. [T009471] ПОД ТЕРМИНОМ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» ПОНИМАЕТСЯ**

- А) клинический симптомокомплекс
- Б) симптом
- В) заболевание
- Г) хроническая патология

**1224. [T009472] СОЧЕТАНИЕ МАТОЧНОЙ И ВНЕМАТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ПЛОДНОГО ЯЙЦА НАЗЫВАЕТСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ**

- А) гетеротопической
- Б) эктопической
- В) истмической
- Г) фимбриальной

**1225. [T009473] К ОСТРЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ  
ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТНОСИТСЯ**

- А) эндометрит
- Б) перекрут ножки опухоли яичника
- В) внематочная беременность
- Г) кровотечение из наружных половых органов

**1226. [T009475] ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- А) перфорации матки
- Б) эндометrite
- В) воспалении придатков матки
- Г) перекруте ножки опухоли яичника

**1227. [T009490] ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- А) внематочной беременности
- Б) перекруте ножки опухоли яичника
- В) эндометриите
- Г) воспалении придатков матки

**1228. [T009506] ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) раннее выявление и лечение воспалительных заболеваний женских половых органов
- Б) отказ от алкоголя
- В) наличие постоянного полового партнёра
- Г) отказ от спазмолитиков

**1229. [T009518] ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВНЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) внебольничный/кriminalный аборт
- Б) опасный аборт
- В) домашний аборт
- Г) несоответствующий медицинским стандартам аборт

**1230. [T009528] РЕЗКОЕ УСИЛЕНИЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ БЫСТРОМ СНЯТИИ ПАЛЬПИРУЮЩЕЙ РУКИ С ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ НАДАВЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ**

- А) Щёткина-Блюмберга
- Б) Раздольского
- В) Образцова
- Г) Мерфи

**1231. [T009531] ВОЗМОЖНЫМ УСЛОВИЕМ ПОПАДАНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ПОЛОСТЬ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) оказание медицинской помощи (введение маточных колец - пессариев, марлевых и ватных тампонов)
- Б) гигиеническая процедура
- В) профилактический осмотр
- Г) лечебная физкультура

**1232. [T009833] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- А) установления диагноза
- Б) поступления в стационар
- В) начала заболевания
- Г) начала подготовки к операции

**1233. [T009834] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) подготовка пациента к операции
- Б) улучшение состояния пациента
- В) установление точного диагноза
- Г) оформление пациента в стационар

**1234. [T009835] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- А) с момента начала операции
- Б) с момента окончания операции
- В) в день операции
- Г) за 30 минут до операции

**1235. [T009836] ПОСЛЕДНИМ ПРИЕМОМ ПИЩИ ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, НАЧИНАЮЩЕЙСЯ В 9 ЧАСОВ УТРА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) легкий ужин накануне операции
- Б) обед накануне операции
- В) завтрак в день операции
- Г) перед сном накануне операции

**1236. [T009837] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ**

- А) в день операции
- Б) непосредственно перед операцией
- В) за сутки до операции
- Г) накануне операции

**1237. [T009838] ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА**

- А) окончания операции
- Б) установления диагноза
- В) начала операции
- Г) через сутки после операции

**1238. [T009839] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) остановка сердца
- Б) нагноение раны
- В) лигатурные свищи
- Г) плевропневмония

**1239. [T009840] ОТДАЛЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ**

- А) выписки из стационара
- Б) снятия швов
- В) окончания операции
- Г) наложения швов

**1240. [T009841] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА БОЛЬНОМУ РАЗРЕШАЕТСЯ ПИТЬ ЧЕРЕЗ**

- А) 2 часа после операции
- Б) 6 часов после операции
- В) 24 часа после операции
- Г) 12 часов после операции

**1241. [T009842] ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) утром перед операцией
- Б) во время операции
- В) сразу после операции
- Г) через сутки после операции

**1242. [T009843] СМЕНА НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ**

- А) накануне операции
- Б) непосредственно перед операцией
- В) за сутки до операции
- Г) утром в день операции

**1243. [T009844] БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) утром в день операции
- Б) утром накануне операции
- В) вечером накануне операции
- Г) за двое суток до операции

**1244. [T009845] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСТАВАТЬ**

- А) на 2-й день
- Б) сразу после окончания операции
- В) на 5-й день
- Г) на 10-й день

**1245. [T009846] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

- А) подачей пациента в операционную
- Б) непосредственно по окончании операции
- В) накануне операции
- Г) после установления точного диагноза

**1246. [T009847] ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ**

- А) в ближайшие часы
- Б) в ближайшие дни
- В) в ближайшие недели
- Г) в ближайшие месяцы

**1247. [T009848] ПОД РЕЗЕКЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ**

- А) удаление части органа
- Б) выскабливание полостей
- В) полное удаление органа
- Г) удаление периферической части органа

**1248. [T009849] ПОД ЭКСТИРПАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ**

- А) полное удаление органа
- Б) удаление любой части органа
- В) выскабливание полостей
- Г) удаление патологически измененных тканей

**1249. [T009850] ПОД АМПУТАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ**

- А) удаление периферической части тела
- Б) полное удаление органа
- В) удаление любой части органа
- Г) удаление инородного тела

**1250. [T009851] ПОД ИССЕЧЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ**

- А) удаление патологически измененных тканей
- Б) полное удаление органа
- В) удаление периферической части органа
- Г) дренирование патологического очага

**1251. [T009852] ВАРИАНТОМ НОРМЫ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В 1-Е СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) субфебрильная температура
- Б) тромбозы и эмболии
- В) парез кишечника
- Г) острое кровотечение

**1252. [T009853] ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) радикальные
- Б) паллиативные
- В) симптоматические
- Г) пробные

**1253. [T009854] К ОПЕРАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧАВАЮЩИМ ТОЛЬКО ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО, ОТНОСИТСЯ**

- А) паллиативная
- Б) симптоматическая
- В) пробная
- Г) радикальная

**1254. [T009855] ЭНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пероральный
- Б) инъекционный
- В) подкожный
- Г) ингаляционный

**1255. [T009856] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) болевой синдром
- Б) бессонница
- В) беременность
- Г) период лактации

**1256. [T009857] ПРОМЕДОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) наркотических анальгетиков
- Б) транквилизаторов
- В) антибиотиков
- Г) муколитиков

**1257. [T009858] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ, КУПИРУЮЩЕМУ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСИТСЯ**

- А) сальбутамол
- Б) промедол
- В) фраксипарин
- Г) амоксикилав

**1258. [T009859] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЛИННОГО ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ**

- А) от нескольких минут до нескольких дней
- Б) от нескольких дней до нескольких недель
- В) от нескольких недель до одного месяца
- Г) несколько месяцев

**1259. [T009860] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭТАМЗИЛАТ НАТРИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

- А) гемостатическое
- Б) желчегонное
- В) иммуномодулирующее
- Г) диуретическое

**1260. [T009861] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ**

- А) феррум лек
- Б) лазикс
- В) фурагин
- Г) дифлюкан

**1261. [T009862] ВЕРОШПИРОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) диуретиков
- Б) спазмолитиков
- В) транквилизаторов
- Г) ненаркотических анальгетиков

**1262. [T009863] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гипотензивное
- Б) нейролептическое
- В) обезболивающее
- Г) противоаллергическое

**1263. [T009864] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ПРЕДНИЗОЛОН ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) противовоспалительное
- Б) иммуномодулирующее
- В) местноанестезирующее
- Г) гемостатическое

**1264. [T009865] ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОР**

- А) гибитана
- Б) перманганата калия
- В) йодоната
- Г) пероксида водорода

**1265. [T009866] К СЛАБИТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ  
ОТНОСИТСЯ**

- А) бисакодил
- Б) анаприлин
- В) бисептол
- Г) амоксиклав

**1266. [T009867] К ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ  
СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) зиртек
- Б) фраксипарин
- В) амосин
- Г) нитрофурил

**1267. [T009868] К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ  
ОТНОСИТСЯ**

- А) метилэргометрин
- Б) гепарин
- В) но-шпа
- Г) кларитин

**1268. [T009869] К ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ**

- А) время, прошедшее от поступления пациента в медицинскую организацию до начала операции
- Б) время, прошедшее от поступления пациента в приемный покой до времени оформления ее в палату
- В) время, прошедшее от вызова бригады скорой медицинской помощи до начала операции
- Г) время, прошедшее от назначения лабораторного обследования до начала операции

**1269. [T009870] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРАТКОВРЕМЕННОГО  
ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ**

- А) от нескольких минут до 50 минут
- Б) от 50 минут до нескольких дней
- В) от нескольких дней до месяца
- Г) от одного до нескольких месяцев

**1270. [T009871] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА**

- А) малые и большие
- Б) малые, средние и большие
- В) легкие и сложные
- Г) легкие, средней сложности и сложные

**1271. [T009872] ПО СРОЧНОСТИ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА**

- А) неотложные, срочные и плановые
- Б) несрочные и быстрые
- В) внеплановые и отсроченные
- Г) внеплановые и запланированные

**1272. [T009873] НЕОТЛОЖНЫЕ (ЭКСТРЕННЫЕ) ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ**

- А) немедленно или через 2-4 часа после поступления в стационар
- Б) через 24-48 часов после поступления в стационар
- В) через 8-10 дней после поступления в стационар
- Г) через 48-72 часа после поступления в стационар

**1273. [T009874] СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ**

- А) через 24-48 часов после поступления в стационар
- Б) через 2-4 часа после поступления в стационар
- В) через 48-72 часа после поступления в стационар
- Г) через 8-10 дней после поступления в стационар

**1274. [T009875] СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТСРОЧЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ**

- А) несколькими днями после поступления в стационар
- Б) несколькими часами после поступления в стационар
- В) несколькими неделями после поступления в стационар
- Г) несколькими минутами после поступления в стационар

**1275. [T009876] МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ**

- А) влагалищным путем под обезболиванием
- Б) влагалищным путем без обезболивания
- В) трансабдоминальным путем под обезболиванием
- Г) трансабдоминальным путем без обезболивания

**1276. [T009877] ВЛАГАЛИЩНЫМ ПУТЕМ ПОД ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ПРОВОДЯТ**

- А) малые гинекологические операции
- Б) большие гинекологические операции
- В) лапароскопические гинекологические операции
- Г) средние гинекологические операции

**1277. [T009878] РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1278. [T009879] АСПИРАЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1279. [T009880] НОЖЕВУЮ БИОПСИЮ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1280. [T009881] ПОЛИПЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1281. [T009882] УДАЛЕНИЕ РОДИВШЕГОСЯ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1282. [T009883] ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЮ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1283. [T009884] КРИОДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1284. [T009885] ЛАЗЕРНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1285. [T009886] РАДИОВОЛНОВУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1286. [T009887] ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СРОКОМ ДО 12 НЕД ОТНОСЯТ К**

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1287. [T009888] ТУБЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1288. [T009889] ОВАРИЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1289. [T009890] НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1290. [T009891] ЭКСТИРПАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К**

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1291. [T009892] ПАНГИСТЕРЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К**

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

**1292. [T009893] КВАРЦЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ**

- А) дезинфекции
- Б) дератизации
- В) дезинсекции
- Г) стерилизации

**1293. [T009894] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ**

- А) облегчения боли
- Б) для лучшего отхождения мокроты
- В) для удобства проведения манипуляции
- Г) в силу ослабленного состояния

**1294. [T009895] ПРИЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ПАЦИЕНТОМ ПРОВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В**

- А) 7 дней
- Б) 2 недели
- В) день
- Г) 10 дней

**1295. [T009896] ДЛЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ ХАРАКТЕРНО**

- А) устойчивая гиперемия, не проходящая после прекращения давления, кожный покров не нарушен
- Б) разрушение кожного покрова, жидкые выделения из раны
- В) нарушение целостности кожи, отслоика эпидермиса
- Г) образование полости с повреждением в ней нижележащих тканей

**1296. [T009897] ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ**

- А) клеенку, судно, салфетки, кувшин, корнцанг, воду
- Б) таз, раствор антисептика, шприц Жане, ватные тампоны, корнцанг
- В) грушевидный баллон, корнцанг, ватные тампоны, раствор антисептика
- Г) кувшин, корнцанг, таз, раствор антисептика, кружку Эсмарха

**1297. [T009898] НАХОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНОВ В СТАЦИОНАРЕ В ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЕ ДОПУСКАЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ**

- А) главного врача
- Б) лечащего врача
- В) старшей акушерки
- Г) врача приемного покоя

**1298. [T009899] ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- А) трахеостома
- Б) илеостома
- В) гастростома
- Г) эпицистостома

**1299. [T009900] ДЛЯ РАЗЖИЖЕНИЯ СЛИЗИ В ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО ЗАКАПАТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР**

- А) 0,9% хлорида натрия
- Б) 3% перекиси водорода
- В) 1% новокаина
- Г) 10% хлорида натрия

**1300. [T009901] ПОЛНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) дезинсекцию, дезинфекцию, гигиеническую ванну или душ
- Б) дезинсекцию, дезинфекцию, обмывание частей тела
- В) дезинсекцию, дезинфекцию, обтирание частей тела
- Г) обмывание или обтирание отдельных частей тела

**1301. [T009903] НА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ С ЦЕЛЬЮ УВЛАЖНЕНИЯ НАКЛАДЫВАЮТ САЛФЕТКУ, СМОЧЕННУЮ**

- А) дистиллированной водой
- Б) 0,5% раствором перманганата калия
- В) 3% раствором перекиси водорода
- Г) 0,9% раствором хлорида натрия

**1302. [T009904] НЕОХОДИМУЮ ДИЕТУ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗНАЧАЕТ**

- А) лечащий врач
- Б) пациент
- В) диетсестра
- Г) медицинская сестра

**1303. [T009905] ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЭНТЕРАЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ ПИЩИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ**

- А) 4 часов
- Б) 5 часов
- В) 6 часов
- Г) 3 часов

**1304. [T009906] ИЗДЕЛИЕМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) система для инфузионной терапии
- Б) дуоденальный зонд
- В) катетер
- Г) поильник

**1305. [T009907] ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПАРАНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) липофундин
- Б) викасол
- В) диклофенак
- Г) реополиглюкин

**1306. [T009908] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЛКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) постинъекционный инфильтрат
- Б) кровотечение
- В) гипотензия
- Г) аппендицит

**1307. [T009909] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) первые дни после операции на желудочно-кишечном тракте
- Б) постановка лекарственной клизмы
- В) задержка стула более 48 часов
- Г) подготовка к инструментальному исследованию

**1308. [T009910] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) травма мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
- Б) появление отеков
- В) острая задержка мочи более 6 часов
- Г) недержание мочи

**1309. [T009911] ПОД РАСТРОЙСТВОМ ПРОЦЕССА МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОНИМАЕТСЯ**

- А) дизурия
- Б) олигоурия
- В) полиурия
- Г) никтурия

**1310. [T009912] ХАРАКЕТРИНЫМИ СИМПТОМАМИ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) рвота «кофейной гущей» и «дегтеобразный стул»
- Б) понижение артериального давления, головокружение
- В) нитевидный пульс, слабость
- Г) слабость, головокружение, обморок

**1311. [T009913] ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) применении пузыря со льдом на область эпигастрия
- Б) постановке очистительной клизмы
- В) постановке горячей грелки на область эпигастрия
- Г) укладывании пациента на левый бок

**1312. [T009914] СИСТЕМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВВЕДЕННЫЕ В**

- А) рот
- Б) глаза
- В) уши
- Г) нос

**1313. [T009915] МЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВВЕДЕННЫЕ**

- А) в ухо
- Б) через рот
- В) посредством лекарственной клизмы
- Г) под язык

**1314. [T009916] ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ СНОТВОРНОЕ**

- А) за 30 мин до сна
- Б) до еды
- В) после еды
- Г) за 2 часа до сна

**1315. [T009917] ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ИХ ВДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) ингаляцией
- Б) инъекцией
- В) впрыскиванием
- Г) компрессом

**1316. [T009918] К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ**

- А) стерильные растворы
- Б) капсулы
- В) драже
- Г) мази

**1317. [T009919] РЕЖУЩЕ-КОЛЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ УТИЛИЗИРУЮТ**

- А) в непрокалываемые контейнеры однократного применения
- Б) в непрокалываемые контейнеры многократного применения
- В) в мягкую тару
- Г) в разобранном и измельченном виде

**1318. [T009920] ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ДОПУСКАЮТСЯ**

- А) лица, достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности
- Б) младший медицинский персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности
- В) технический персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности
- Г) клининговые компании

**1319. [T009921] ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ**

- А) 0,25% новокаин, 0,9% хлорид натрия
- Б) 2% новокаин, 0,9% хлорид натрия
- В) 2% новокаин, 10,0 % хлорид натрия
- Г) 0,25% новокаин, 10,0% хлорид натрия

**1320. [T009922] ПАЦИЕНТКЕ, ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ПЛНОВОЙ ОПЕРАЦИИ, АКУШЕРКА ЗАПЛАНИРУЕТ БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ**

- А) утром в день операции
- Б) вечером накануне операции
- В) за 1 сутки до операции
- Г) на операционном столе

**1321. [T009923] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО АКУШЕРКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) оказании помощи пациенту в самообслуживании
- Б) постановке инъекции антибиотиков каждые 4 часа
- В) смене дренажа
- Г) назначении пациенту рациональной диеты

**1322. [T009924] ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА**

- А) органах малого таза
- Б) сердце
- В) печени
- Г) почках

**1323. [T009925] ПРИОРИТЕТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) чувство страха
- Б) дефицит самоухода
- В) недооценка тяжести своего состояния
- Г) беспокойство за оставленную работу

**1324. [T009926] ПЕРЕД ПЛНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПАЦИЕНТУ ПРОВОДЯТ**

- А) полную санитарную обработку
- Б) обтирание кожи и смену белья
- В) частичную санитарную обработку
- Г) частичную санитарную обработку и смену белья

**1325. [T009927] ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ БОЛЬНЫМ ЗА 40 МИНУТ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ**

- А) удалить содержимое желудка через зонд
- Б) отложить операцию на сутки
- В) вызвать рвоту
- Г) назначить слабительное

**1326. [T009928] ПОСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ**

- А) противопоказана
- Б) необходима в любом случае
- В) необходима за 1 час
- Г) необходима непосредственно перед операцией

**1327. [T009929] ОСЛОЖНЕНИЕМ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) рвота
- Б) эвентрация кишечника
- В) бронхопневмония
- Г) лигатурный свищ

**1328. [T009930] ПРИЗНАКОМ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гиперемия, отек, усиление боли
- Б) промокание повязки кровью
- В) выхождение кишечных петель под кожу
- Г) побледнение краев

**1329. [T009931] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО**

- А) снять несколько швов, дренировать рану
- Б) наложить сухую стерильную повязку
- В) ввести наркотический анальгетик
- Г) наложить повязку с ихтиоловой мазью

**1330. [T009932] ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) активном послеоперационном ведении больного, применении антикоагулянтов
- Б) соблюдении строгого постельного режима, применении антикоагулянтов
- В) применении солевых кровезаменителей
- Г) применении баночного массажа на грудную клетку

**1331. [T009933] ОСНОВНЫМ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ С ИСКУСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) санация трахеобронхиального дерева
- Б) противокашлевые средства
- В) профилактика пролежней
- Г) питание через зонд

**1332. [T009934] ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНОГО В ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОВОДИТСЯ**

- А) лежа на каталке
- Б) самостоятельно больным
- В) сидя на коляске
- Г) под руку медицинским персоналом

**1333. [T009935] ПОЛОЖЕНИЕМ БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) лежа на спине без подушки, голова повернута набок
- Б) лежа с опущенным головным концом
- В) полусидя, с опорой на подушку
- Г) лежа на боку без подушки

**1334. [T009936] ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО**

- А) вызвать мочеиспускание рефлекторно
- Б) произвести катетеризацию мочевого пузыря
- В) ввести мочегонные средства
- Г) применить теплую грелку на низ живота

**1335. [T009937] ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАРЕЗОМ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ**

- А) введение подкожно прозерина
- Б) введение внутривенно физиологического раствора
- В) введение подкожно атропина
- Г) рациональное обезболивание

**1336. [T009938] НЕОБХОДИМЫМ АКУШЕРСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА "ОСТРЫЙ ЖИВОТ" ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пальпация живота
- Б) определение тургора тканей
- В) перкуссия грудной клетки
- Г) аускультация сердца

**1337. [T009939] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ МОЧЕВЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) потеря тонуса мочевого пузыря
- Б) недержание мочи
- В) пролежни
- Г) запор

**1338. [T009940] СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) промывание катетера 2 раз в день
- Б) своевременное опорожнение дренажного мешка
- В) обеспечение комфортных условий для мочеотделения
- Г) обеспечение пациенту достаточного времени для мочеиспускания

**1339. [T009941] ПРЕМЕДИКАЦИЮ БОЛЬНОМУ ПЕРЕД ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ НАЗНАЧАЕТ**

- А) врач-анестезиолог
- Б) лечащий врач
- В) врач приемного покоя
- Г) сестра-анестезистка

**1340. [T009942] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО**

- А) по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд
- Б) определить рост и вес пациента
- В) по назначению врача сделать очистительную клизму
- Г) обеспечить прием пациентом гигиенической ванны

**1341. [T009943] РЕАЛИЗАЦИЮ КРАТКОСРОЧНОЙ ЦЕЛИ "СНЯТИЕ ШВОВ" У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ МЕДСЕСТРА ЗАПЛАНИРУЕТ НА**

- А) седьмые сутки
- Б) десятые сутки
- В) трети сутки
- Г) двенадцатые сутки

**1342. [T009944] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЮТ**

- А) дыхательную гимнастику
- Б) интубацию трахеи
- В) диету, богатую белком
- Г) УВЧ на грудную клетку

**1343. [T009945] ЭКСТРЕННАЯ СМЕНА ПОВЯЗКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ**

- А) незначительном промокании серозным экссудатом
- Б) болезненности краев раны
- В) повышении температуры тела
- Г) пропитывании повязки кровью

**1344. [T010203] СЕКСУАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) состояние, позволяющее испытывать половое влечение и реализацию его, получая при этом удовольствие
- Б) наличие ежедневной половой жизни
- В) воздержание от беспорядочных половых связей
- Г) наличие нескольких половых партнеров

**1345. [T010204] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДОСТИГАЕТСЯ**

- А) безопасным прерыванием беременности
- Б) отказом от половой жизни
- В) отказом от проживания в городах
- Г) применением народных средств лечения

**1346. [T010205] ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- А) показателями рождаемости
- Б) наличием половой жизни
- В) количеством половых партнеров
- Г) социальными условиями

**1347. [T010206] КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ**

- А) рождаемости детей с врожденными пороками развития
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) расторжения браков
- Г) встречаемости родителей одиночек

**1348. [T010207] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) наследственность
- Б) неблагоприятная внешняя среда
- В) санитарное неблагополучие населения
- Г) модифицированные продукты питания

**1349. [T010208] ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) социально-экономический уровень жизни
- Б) соматическое здоровье
- В) аномалии полового развития
- Г) генетические заболевания

**1350. [T010209] ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) нарушение роста плода
- Б) генетические мутации
- В) проявление наследственных заболеваний
- Г) соматические заболевания матери

**1351. [T010210] РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) преждевременным родам
- Б) запоздалым родам
- В) слабой родовой деятельности
- Г) не оказывает влияние на беременность

**1352. [T010211] КУРЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) гипотрофии плода
- Б) гипертрофии плода
- В) чрезмерной родовой деятельности
- Г) не оказывает влияния на беременность

**1353. [T010212] РЕННЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ПОВЫШАЕТ**

- А) риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем
- Б) качество половенной жизни
- В) уровень сексуальной культуры
- Г) уровень репродуктивного здоровья

**1354. [T010213] СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) поздним вступлением в брак
- Б) ранним вступлением в брак
- В) преобладанием контрацепции над абортами
- Г) уменьшением количества половых партнеров

**1355. [T010214] ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА**

- А) развитие здравоохранения
- Б) ведение здорового образа жизни
- В) рационализацию режима труда и отдыха
- Г) гигиену семейных отношений

**1356. [T010215] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА**

- А) гигиеническое воспитание подрастающего поколения
- Б) расширение ассортимента продуктов питания
- В) обеспечение высокого уровня общественного здоровья
- Г) создание оптимальных условий труда и отдыха

**1357. [T010216] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) вакцинацию
- Б) борьбу со стрессом
- В) динамическое наблюдение
- Г) восстановительное лечение

**1358. [T010217] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) диспансеризацию
- Б) рациональное питание
- В) физическую активность
- Г) охрану окружающей среды

**1359. [T010218] ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выпадение половых органов
- Б) половой инфальтилизм
- В) аномалия развития половых органов
- Г) гермафродитизм

**1360. [T010219] СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) поздним деторождением
- Б) ранним вступлением в брак
- В) преобладанием контрацепции надabortами
- Г) уменьшением количества половых партнеров

**1361. [T010220] КОНТРАПЦЕТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- А) быть высокоеффективным
- Б) оказывать системное влияние на организм
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

**1362. [T010221] МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) подкожный имплант
- Б) прерванный половой акт
- В) спермицид
- Г) барьерный метод

**1363. [T010222] К БАРЬЕРНЫМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- А) презерватив
- Б) внутриматочный контрацептив
- В) прерванный половой акт
- Г) вазектомия

**1364. [T010223] МЕТОДОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) барьерный метод
- Б) биологический метод
- В) метод гормональной контрацепции
- Г) внутриматочная контрацепция

**1365. [T010225] САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РЕЖИМОМ ПРИЕМА КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) 21+7
- Б) 24+4
- В) 26+2
- Г) беспрерывный

**1366. [T010226] ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) регуляция менструального цикла
- Б) элиминация инфекций, передающихся половым путем
- В) лизис спаек в малом тазу
- Г) снижение минеральной плотности костей

**1367. [T010227] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) рак молочных желез
- Б) железодефицитная анемия
- В) нерегулярный менструальный цикл
- Г) дисменорея

**1368. [T010228] ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) превышение смертности над рождаемостью
- Б) быстрое увеличение численности населения
- В) быстрое увеличение численности населения на фоне высоких показателей материнской и детской смертности
- Г) равные показатели рождаемости и смертности

**1369. [T010229] ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ**

- А) гонадотропины
- Б) миорелаксанты
- В) иммунодепрессанты
- Г) антиагреганты

**1370. [T010230] МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) введение нативной или криоконсервированной спермы
- Б) стимуляция овуляции и сперматогенеза
- В) манипуляции с зародышевым материалом
- Г) перенос оплодотворенных яйцеклеток в матку

**1371. [T010231] ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ В МЕСЯЦАХ НЕ БОЛЕЕ**

- А) 3
- Б) 12
- В) 1
- Г) 4

**1372. [T010232] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) эндокринный фактор
- Б) сердечно-сосудистый фактор
- В) желудочно-кишечный фактор
- Г) нервно-мышечный фактор

**1373. [T010233] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) шеечный фактор
- Б) сфинктерный фактор
- В) рефлюксный фактор
- Г) антиперистальтический фактор

**1374. [T010234] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) трубно-перитонельный фактор
- Б) сфинктерный фактор
- В) рефлюксный фактор
- Г) антиперистальтический фактор

**1375. [Т010235] К ЧИСТО ПРОГЕСТИНОВЫМ КОНТРАЦЕПТИВАМ  
ОТНОСЯТСЯ**

- А) мини-пили
- Б) мини-свечи
- В) мини-тампоны
- Г) накожный пластырь

**1376. [Т010236] УРОВЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЗАВИСИТ ОТ**

- А) грамотного регулирования деторождения
- Б) взаимоотношения партнеров
- В) регулярности половой жизни
- Г) психологического климата семьи

**1377. [Т010237] ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) выкидыши и бесплодие
- Б) преждевременные роды
- В) эктопия шейки матки
- Г) эрозия шейки матки

**1378. [Т010238] РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ  
ВРЕМЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) увеличением числа заболеваний с хроническим и рецидивирующими течением
- Б) увеличением рождаемости
- В) снижением числа экстрагенитальных заболеваний
- Г) снижением числа инфекционных заболеваний

**1379. [Т010239] ФАКТОРОМ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИМ НА  
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) злоупотребление алкоголем
- Б) здоровый образ жизни
- В) физическая активность
- Г) острые кишечные инфекции

**1380. [T010240] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА МАЛОМ СРОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) медикаментозный аборт
- Б) вакуум-аспирация полости матки
- В) эвакуация плодного яйца кюреткой
- Г) введение гипертонического раствора в полость матки

**1381. [T010241] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кровотечение
- Б) лейомиома матки
- В) бартолинит
- Г) эрозия шейки матки

**1382. [T010242] В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФУНКЦИЮ**

- А) репродуктивную
- Б) социальную
- В) психоэмоциональную
- Г) воспитательную

**1383. [T010243] КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ**

- А) экстрагенитальной
- Б) туберкулезом
- В) гепатитом А
- Г) гепатитом В

**1384. [T010244] ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) профилактика первого аборта и незапланированной беременности
- Б) подавление сексуальности в подростковом возрасте
- В) ознакомление с техникой сексуального общения
- Г) частые обращения в женскую консультацию

**1385. [Т010245] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) необходимость дополнительных методов обследования
- Б) клиника «острого живота»
- В) необходимость консультации узкого специалиста
- Г) оформление медицинских документов

**1386. [Т010246] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) неэффективность амбулаторного лечения
- Б) клиника «острого живота»
- В) необходимость консультации узкого специалиста
- Г) оформление медицинских документов

**1387. [Т010247] О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ИНФОРМИРУЕТ**

- А) лечащий врач
- Б) главный врач
- В) акушерка
- Г) санитарка

**1388. [Т010248] ПРАВОМ ЧЕЛОВЕКА ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) репродуктивный выбор
- Б) моральный выбор
- В) социальный выбор
- Г) политический выбор

**1389. [Т010251] ЗАЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) материнством
- Б) карьерой
- В) реализацией
- Г) достижением

**1390. [Т010252] ЧИСЛО САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН К**

- А) вынашиванию беременности
- Б) родам
- В) овуляции
- Г) контрацепции

**1391. [Т010253] ЧИСЛО АБОРТОВ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УРОВЕНЬ**

- А) тяжелой заболеваемости беременных
- Б) отношений в паре
- В) фертильности
- Г) материальной обеспеченности

**1392. [Т010254] РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ**

- А) № 323-ФЗ
- Б) № 273-ФЗ
- В) № 152-ФЗ
- Г) № 52-ФЗ

**1393. [Т010255] РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ О**

- А) безопасном аборте
- Б) беспорядочных половых связях
- В) профессиональных вредностях
- Г) психологическом аспекте аборта

**1394. [Т010256] ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ЗАЧАТИЕ, НАЗЫВАЮТСЯ МЕТОДАМИ**

- А) контрацепции
- Б) овуляции
- В) стимуляции
- Г) ограничения

**1395. [Т010257] НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) криминальные аборты
- Б) легальные аборты
- В) перенашивание беременности
- Г) крупные дети

**1396. [Т010258] БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) наличие квалифицированных медицинских кадров
- Б) свободная продажа хирургических инструментов
- В) информационная пропаганда абортов
- Г) запрет абортов

**1397. [Т010259] КОНТРАПЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- А) не оказывать системного влияния на организм
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

**1398. [Т010260] КОНТРАПЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- А) быть простым в применении
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

**1399. [Т010261] КОНТРАПЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- А) быть доступным для любых социальных групп
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

**1400. [T010262] КОНТРАПЦЕТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ**

- А) быть экономически выгодным
- Б) быть низкоэффективным
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

**1401. [T010263] ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРАЦЕПЦИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ**

- А) Перля
- Б) Соловьева
- В) массы тела
- Г) рождаемости

**1402. [T010264] ПОД ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ**

- А) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем
- Б) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма
- В) изменение взаимоотношений в паре
- Г) нарушение социальной адаптации

**1403. [T010265] ПОД ОСЛОЖНЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ**

- А) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма
- Б) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем
- В) изменение взаимоотношений в паре
- Г) нарушение социальной адаптации

**1404. [T010266] СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ**

- А) необратимым
- Б) обратимым
- В) временным
- Г) сезонным

**1405. [T010267] МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) абstinенция (половое воздержание)
- Б) календарный метод (по точному дню овуляции)
- В) использование тестов на овуляцию
- Г) метод лактационной аменореи

**1406. [T010269] ПРИ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ НА ПОЛОВОЙ ЧЛЕН**

- А) до полового акта
- Б) перед эякуляцией
- В) после полового акта
- Г) после эякуляции

**1407. [T010270] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) безопасную беременность и уход до родов, в период родов и после родов
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

**1408. [T010271] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) лечение бесплодия
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

**1409. [T010272] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) лечение заболеваний репродуктивной сферы
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

**1410. [T010273] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) лечение заболеваний, передающихся половым путем
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

**1411. [T010274] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) возможность доступа и выбор методов и средств контрацепции
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

**1412. [T010275] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременности
- Б) трудовой отпуск
- В) отпуск по уходу за ребенком
- Г) выплату материнского капитала

**1413. [T010276] ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МАЗОК НА**

- А) онкоцитологию
- Б) гормональный фон
- В) степень чистоты влагалища
- Г) состав микрофлоры

**1414. [T010277] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ**

- А) после 40 лет
- Б) из группы риска
- В) при жалобах на боль в груди
- Г) после родов

**1415. [T010278] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С ЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРОБА**

- А) Шиллера
- Б) Шуварского
- В) Шредера
- Г) Гентера

**1416. [T010279] ЖЕНЩИНА 35 ЛЕТ НАХОДИТСЯ В ПЕРИОДЕ**

- А) репродуктивном
- Б) пубертатном
- В) климактерическом
- Г) параменопаузальном

**1417. [T010280] ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ**

- А) бесплодии
- Б) эрозии шейки матки
- В) внематочной беременности
- Г) кисте яичника

**1418. [T010283] МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЧИСТЫХ ГЕСТАГЕНОВ ОСНОВАН НА**

- А) супрессии эндометрия, затрудняющей имплантацию
- Б) спермицидном эффекте
- В) понижение вязкости цервикальной слизи
- Г) вычислении опасного периода

**1419. [T010315] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) частая смена половых партнеров
- Б) истмико-цервикальная недостаточность
- В) невынашивание беременности в анамнезе
- Г) возраст старше 38 лет

**1420. [T010316] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) заболевание печени
- Б) глаукома
- В) возраст младше 35 лет
- Г) нерегулярная половая жизнь

**1421. [T010329] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГОНОРЕИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- А) культуральный посев
- Б) ПЦР
- В) пробы функциональной диагностики
- Г) гистеросальпингография

**1422. [T010341] КОНТАКТНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) рака шейки матки ранних стадий
- Б) нормальной беременности
- В) нормальной менопаузы
- Г) апоплексии яичника

**1423. [T010512] К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ  
ОТНОСИТСЯ КЛАСС**

- А) Б
- Б) А
- В) Г
- Г) Д

**1424. [T010515] МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИРУСА  
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В**

- А) крови
- Б) слюне
- В) сперме
- Г) влагалищном секрете

**1425. [T010516] ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) переливание крови
- Б) рукопожатие
- В) укус насекомых
- Г) прием пищи из одной посуды

**1426. [T010585] ДЛЯ ПРЕЭКЛАМСПИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА**

- А) гипотрофия плода
- Б) макросомия плода
- В) крупный плод
- Г) перенашивание

**1427. [T010586] ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ  
ПРЕЭКЛАМСПИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ**

- А) Строгановым
- Б) Бодяжиной
- В) Славянским
- Г) Скробанским

**1428. [T010588] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАРУШЕНЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) HELP-синдромом
- Б) EPH-синдромом
- В) остеомаляцией
- Г) гепатитом

**1429. [T010589] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ**

- А) мочи и крови на ХГ
- Б) крови на RW
- В) мочи на белок
- Г) крови на белок

**1430. [T010590] ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛАКТОСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) умеренное нагрубание молочных желез
- Б) температура тела 40 градусов, озноб
- В) свободное отделение молока
- Г) повышение артериального давления

**1431. [T010591] ПРИ ПОЛНОМ РАЗРЫВЕ МАТКИ СХВАТКИ**

- А) прекращаются
- Б) усиливаются
- В) становятся дискоординированными
- Г) становятся болезненными

**1432. [T010592] ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К**

- А) врожденному кретинизму
- Б) гипотрофии плода
- В) гипогликемии плода
- Г) пиелонефриту

**1433. [T010593] ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ**

- А) преэклампсией
- Б) рвотой беременных
- В) тошнотой
- Г) многоводием

**1434. [T010594] ПОТЕРЯ 50% ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ СООТВЕСТВУЕТ**

- А) стадии необратимого шока
- Б) стадии компенсированного шока
- В) обратимой стадии шока
- Г) синдрому малого выброса

**1435. [T010595] ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ МОЖНО УСТАНОВИТЬ**

- А) только в родах
- Б) в конце беременности
- В) при постановке на учет
- Г) во втором триместре беременности

**1436. [T010596] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С**

- А) гломерулонефритом
- Б) пиелонефритом
- В) мочекаменной болезнью
- Г) циститом

**1437. [T010597] ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И РАЗМЕРОВ ТАЗА В РОДАХ НАЗВАН ИМЕНЕМ**

- А) Вастена
- Б) Шредера
- В) Отта
- Г) Цовьянова

**1438. [T010599] ОПРЕДЕЛИТЬ СТАДИЮ СВЕРТЫВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ**

- А) проба Ли-Уайта
- Б) проба Шиллера
- В) пульс
- Г) АД

**1439. [T010600] ПРИЗНАКОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) частый нитевидный пульс
- Б) повышение АД
- В) АД 110/70
- Г) гиперемия лица

**1440. [T010601] НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ СТАДИЕЙ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) дистрофическая
- Б) аллергическая
- В) токсическая
- Г) невротическая

**1441. [T010603] НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) понижение выработки окситоцина
- Б) повышение концентрации простагландинов
- В) повышение выработки эстрадиола
- Г) повышение концентрации кальция

**1442. [T010604] К НАИБОЛЕЕ РЕДКИМ ФОРМАМ АНОМАЛИИ ТАЗА ОТНОСЯТ**

- А) остеомалтический
- Б) общеравномерно-суженный
- В) поперечносуженный
- Г) простой плоский

**1443. [T010606] «МАТКА КЮВЕЛЕРА» ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- А) преждевременной отслойке нормально-расположенной плаценты
- Б) предлежании плаценты
- В) слабости родовой деятельности
- Г) многоводии

**1444. [T010607] СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ПЛОСКОГО ТАЗА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РАЗМЕРАМ**

- А) истинной конъюгаты
- Б) индекса Соловьева
- В) поперечного размера плоскости входа
- Г) поперечного размера плоскости выхода

**1445. [T010608] НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТВИИ БОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- А) предлежания плаценты
- Б) отслойки плаценты
- В) начавшегося выкидыша
- Г) угрожающего выкидыша

**1446. [T010609] СИЛЬНЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ СХВАТКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) чрезмерной родовой деятельности
- Б) дискоординированной родовой деятельности
- В) патологического прелиминарного периода
- Г) слабости родовой деятельности

**1447. [T010610] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ПРИ РАННЕМ ТОКСИКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) анализ мочи на наличие кетоновых тел
- Б) биохимический анализ крови
- В) ультразвуковое исследование
- Г) офтальмоскопия

**1448. [T010611] ПРИ ГИПОКСИИ ПЛОДА АЦИДОЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ**

- А) нарастает
- Б) снижается
- В) существенно не изменяется
- Г) изменяется также, как в эритроцитах

**1449. [T010612] ОСТРАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- А) преждевременной отслойки плаценты
- Б) перенасыщения беременности
- В) экстрагенитальных заболеваний
- Г) длительной угрозы преждевременного прерывания беременности

**1450. [T010613] РАЗРЫВЫ ШЕЙКИ МАТКИ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ**

- А) осмотре родовых путей с помощью зеркал
- Б) биопсии
- В) ручном обследовании стенок полости матки
- Г) ультразвуковом обследовании

**1451. [T010614] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СУДОРОГ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) магния сульфат
- Б) преднизолон
- В) сульфаниламид
- Г) атропин

**1452. [T010615] ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО**

- А) предупредить аспирацию и асфиксию
- Б) удерживать руки беременной
- В) вскрыть плодный пузырь
- Г) выполнить влагалищное исследование

**1453. [T010616] ЧАЩЕ ВСЕГО У БЕРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ**

- А) железодефицитная анемия
- Б) постгеморрагическая анемия
- В) апластическая анемия
- Г) гемолитическая анемия

**1454. [T010617] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) препарат железа
- Б) магния сульфат
- В) преднизолон
- Г) сульфаниламид

**1455. [T010619] ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ 70 Г/Л БЕРЕМЕННУЮ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ**

- А) на госпитализацию в стационар
- Б) на санаторно-курортное лечение
- В) в дневной стационар
- Г) на физиопсихопрофилактическую подготовку к родам

**1456. [T010620] ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ АНЕМИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НАЗНАЧАЮТ**

- А) в обычные сроки по стандарту наблюдения за беременной
- Б) чаще обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- В) реже обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- Г) сроки определяются по желанию женщины

**1457. [T010621] САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГЕСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) железодефицитная анемия
- Б) перенасыщение беременности
- В) тазовое предлежание плода
- Г) бессимптомная бактериурия

**1458. [T010622] БЕРЕМЕННЫМ С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОРЫ И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ НАЗНАЧАЮТ**

- А) медикаментозное лечение
- Б) диетотерапию
- В) лечебную физкультуру
- Г) физиотерапию

**1459. [T010623] ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ОСНОВАНА НА**

- А) микробиологическом исследовании мочи
- Б) результатах общего анализа мочи
- В) анализа мочи по Нечипоренко
- Г) оценке цвета мочи

**1460. [T010624] МОЧА ЦВЕТА КОКА-КОЛЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- А) HELP-синдрома
- Б) многоводия
- В) маловодия
- Г) острого цистита

**1461. [T010625] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО**

- А) отсутствие клинических симптомов
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче
- Г) острое повышение температуры тела

**1462. [T010626] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО**

- А) наличие бактерий в средней порции мочи
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче
- Г) острое повышение температуры тела

**1463. [T010627] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО**

- А) наличие или отсутствие лейкоцитурии
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче
- Г) острое повышение температуры тела

**1464. [T010628] ПРОФИЛАКТИКОЙ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ**

- А) бессимптомной бактериурии
- Б) анемии
- В) явных отеков
- Г) скрытых отеков

**1465. [T010629] ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ КЛУБОЧКОВ, ВОВЛЕКАЮЩЕЕ КАНАЛЬЦЫ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНУЮ ТКАНЬ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) гломерулонефрит
- Б) пиелонефрит
- В) цистит
- Г) уретрит

**1466. [T010630] РАЗВИТИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОБЫЧНО СВЯЗАНО С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

- А) стрептококковыми
- Б) вирусными
- В) паразитарными
- Г) грибковыми

**1467. [T010632] ДИАБЕТ, РАЗВИВШИЙСЯ ПОСЛЕ 28 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) гестационный сахарный диабет
- Б) сахарный диабет 1 типа
- В) сахарный диабет 2 типа
- Г) сахарный диабет промежуточного типа

**1468. [T010633] ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ**

- А) преэклампсии
- Б) запоров
- В) многоплодной беременности
- Г) бесплодия

**1469. [T010634] УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЗЯТЫЙ ИЗ ПАЛЬЦА НАТОЩАК У БЕРЕМЕННЫХ В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР, В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) менее 6,3
- Б) более 8,1
- В) более 6,6
- Г) менее 3,3

**1470. [T010635] КРИТЕРИЕМ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР**

- А) от 5,1 до 7,0
- Б) от 7,1 до 10,0
- В) от 3,1 до 10,0
- Г) от 1,1 до 3,0

**1471. [T010636] ПЕРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТOLERАНТНЫЙ ТЕСТ ПРОВОДЯТ С ГЛЮКОЗОЙ В КОЛИЧЕСТВЕ**

- А) 75 г
- Б) 5 г
- В) 50 г
- Г) 25 г

**1472. [T010637] ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ ПРИВОДИТ К**

- А) увеличению веса плода
- Б) уменьшению веса плода
- В) не влияет на вес плода
- Г) перенасыщанию беременности

**1473. [T010638] ПРОФИЛАКТИКОЙ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) стабильная компенсация сахарного диабета
- Б) нормализация сна
- В) проведение физиотерапии
- Г) проведение психотерапии

**1474. [T010639] КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ИМЕЕТ**

- А) благоприятный прогноз для физиологического течения беременности
- Б) неблагоприятный прогноз для течения беременности
- В) крайне неблагоприятный прогноз для течения беременности
- Г) показания для прерывания беременности

**1475. [T010640] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) запор
- Б) диарея
- В) метеоризм
- Г) парез

**1476. [T010641] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) лекарственную целлюлозу
- Б) лекарственную глюкозу
- В) водную нагрузку
- Г) ощелачивающие растворы

**1477. [T010642] ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАПОРЫ ВОЗНИКАЮТ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 17-36
- Б) 7-10
- В) 12-20
- Г) 37-40

**1478. [T010644] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) запор
- Б) диарея
- В) чрезмерная физическая нагрузка
- Г) длительный постельный режим

**1479. [T010645] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) профилактика запоров
- Б) нормализация сна
- В) проведение физиотерапии
- Г) проведение психотерапии

**1480. [T010646] КОНСЕРВАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- А) мазей и свечей, содержащих прокайн, бензокайн, белладонну, трибенозид
- Б) свечей с папаверином
- В) обильного питья
- Г) ограниченного питания

**1481. [T010647] ПРОФИЛАКТИКА ГИПОТИРЕОЗА ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ**

- А) препаратов йода
- Б) препаратов железа
- В) диетотерапии
- Г) антибиотикотерапии

**1482. [T010649] НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ**

- А) послеродовый период
- Б) 1 триместр беременности
- В) 2 триместр беременности
- Г) 3 триместр беременности

**1483. [T010650] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА БЕРЕМЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ В ГРАММАХ НА ЛИТР НИЖЕ**

- А) 110
- Б) 120
- В) 130
- Г) 140

**1484. [T010651] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ 42 НЕДЕЛИ И БОЛЕЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) перенашиванием
- Б) недонашиванием
- В) невынашиванием
- Г) перезрелостью

**1485. [T010652] С ЦЕЛЬЮ ИНДУКЦИИ РОДОВ НАЗНАЧАЮТ**

- А) мифепристон
- Б) минизистон
- В) макролиды
- Г) фторхинолоны

**1486. [T010855] К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) нормально протекающая беременность
- Б) угроза прерывания беременности
- В) преэклампсия
- Г) тяжёлый токсикоз

**1487. [T010856] ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) укрепление мышц живота и промежности
- Б) улучшение подвижности крестцово-подвздошных сочленений
- В) укрепление грудных мышц
- Г) укрепление мышц верхнего плечевого пояса

**1488. [T010857] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССАЖА СПИНЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- А) на боку
- Б) сидя
- В) на животе
- Г) стоя

**1489. [T010858] ЦЕЛЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ**

- А) промежности, спины
- Б) верхнего плечевого пояса
- В) нижних конечностей
- Г) грудных

**1490. [T010860] ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ МОЖНО НАЧИНАТЬ**

- А) на вторые сутки после родов
- Б) сразу после родов
- В) через 4 часа после родов
- Г) через неделю после родов

**1491. [T010861] К ВИДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- А) бег
- Б) дыхательная гимнастика
- В) йога
- Г) плавание

**1492. [T010862] С КАКИМ ПРЕПАРАТОМ МОЖНО ДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОФОРЭЗ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ?**

- А) магний
- Б) анальгин
- В) но-шпа
- Г) окситоцин

**1493. [T010864] ЧТО ОКАЗЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ МАТЕРИ И ПЛОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?**

- А) крепкий чай
- Б) фрукты
- В) овощи
- Г) умеренное количество жидкости

**1494. [T010865] К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОТНОСИТСЯ**

- А) хронический сальпингоофорит в стадии ремиссии
- Б) острый гнойный сальпингоофорит
- В) маточное кровотечение
- Г) опухоль яичников

**1495. [T010866] ЦЕЛЬЮ ЛФК ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ликвидация спаек
- Б) увеличение мышечной массы
- В) улучшение настроения
- Г) похудение

**1496. [T010867] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРОВОДИТ**

- А) врач-гинеколог
- Б) акушерка
- В) массажист
- Г) физиотерапевт

**1497. [T010870] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) отсутствие побочных эффектов
- Б) увеличение сроков лечения
- В) расширение спектра применяемых лекарственных препаратов
- Г) отсутствие необходимости дальнейшего врачебного наблюдения

**1498. [T010872] К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТ**

- А) силовые упражнения
- Б) плавание
- В) теренкуры
- Г) утреннюю и лечебную гимнастику

**1499. [T010873] ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- А) своевременное лечение последствий родовых травм
- Б) профилактический прием антибактериальных препаратов
- В) постоянное применение гинекологических орошений
- Г) ограничение двигательной активности

**1500. [T010874] ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) амбулаторно-поликлинический
- Б) санаторно-курортный
- В) стационарный
- Г) превентивный

**1501. [T010875] К ВИДАМ ВОДОЛЕЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОТНОСЯТ**

- А) минеральные воды
- Б) восходящий душ
- В) углекислые ванны
- Г) подводный душ-массаж

**1502. [T010876] ЦЕЛЬЮ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) завершение патологического процесса
- Б) борьба с факторами риска
- В) профилактика рецидивов болезни
- Г) спасение жизни человека

**1503. [T010877] БОРЬБА С ФАКТОРАМИ РИСКА ПРОВОДИТСЯ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ**

- А) амбулаторно-поликлиническом
- Б) санаторно-курортном
- В) стационарном
- Г) превентивном

**1504. [T010896] ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРОЖДЁННОЙ СЛЕПОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ**

- А) острая вирусная инфекция
- Б) тазовое предлежание плода
- В) физическая перегрузка матери в период беременности
- Г) многоплодная беременность

**1505. [T010900] ДИФЛЮКАН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ**

- А) противогрибковое средство
- Б) антибиотик
- В) ненаркотический анальгетик
- Г) противоглистное средство

**1506. [T010905] ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОКСИТОЦИН**

- А) кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови
- Б) купирование приступа стенокардии
- В) купирование приступа бронхиальной астмы
- Г) купирование приступа судорог

**1507. [T010906] ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ЗАЩИЩЕННЫМ ПЕНИЦИЛЛИНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- А) амоксиклав
- Б) джозамицин
- В) глюкофаж
- Г) кестин

**1508. [T010909] БЕРЕМЕННАЯ С ДВОЙНЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА В РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) за 2 недели до родов
- Б) в 40 недель
- В) сразу же после отхождения вод
- Г) с началом срочных родов

**1509. [T010910] КОНТРОЛЬ КРОВИ НА АНТИТЕЛА ПРИ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДЯТ**

- А) 1 раз в месяц
- Б) 1 раз
- В) 3 раза
- Г) 2 раза

**1510. [T010911] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ЛФК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 30-35
- Б) 20-26
- В) 36-38
- Г) 22-24

**1511. [T010912] ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- А) госпитализировать для обследования
- Б) наблюдать амбулаторно
- В) прервать беременность
- Г) уменьшить физические нагрузки

**1512. [T010913] СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИKНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СПОСОБСТВУЕТ**

- А) ранняя выписка из роддома
- Б) нарушение правил заключительной дезинфекции
- В) отсутствие приточно-вытяжной вентиляции
- Г) увеличение частоты инвазивных вмешательств

**1513. [T010914] ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНА ПРИ**

- А) истмико-цервикальной недостаточности
- Б) миоме матки
- В) перегородке тела матки
- Г) седловидной матке

**1514. [T010915] К ГРУППЕ РИСКА ВОЗНИKНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СРЕДИ РОДИЛЬНИЦ ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ**

- А) с хориоамнионитом в родах
- Б) с преэкламсией
- В) с хроническим гастритом
- Г) с многоплодной беременностью

**1515. [T010916] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ИЗ ДВОЙНИ ПЛОДА НЕОБХОДИМО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ**

- А) проверить наружными приемами положение и предлежание
- Б) ввести внутривенно метилэргометрин
- В) произвести влагалищное исследование
- Г) произвести амниотомию

**1516. [T010917] ЛФК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНО**

- А) при рубце на матке
- Б) при сроке беременности 30-35 недель
- В) у беременных старше 30 лет
- Г) у беременных с миопией средней степени

**1517. [T010918] ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- А) эндовагинального применения микронизированного прогестерона
- Б) перорального приема микронизированного прогестерона
- В) дивигеля
- Г) дексаметазона

**1518. [T010919] ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 36-37
- Б) 33-34
- В) 39-40
- Г) 30-32

**1519. [T010920] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- А) плановую госпитализацию за 2 недели до родов
- Б) досрочное вскрытие плодного пузыря
- В) поворот плода на ножку
- Г) экстренную операцию кесарева сечения

**1520. [T010921] ТЕРМИН «...URIA» (НАРУШЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ**

- А) dys
- Б) hyper
- В) hypo
- Г) anti

**1521. [T010922] ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ, ВЫЗВАННОМ ПРОГЕСТЕРОНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НАЗНАЧАЮТ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ**

- А) дюфастон
- Б) дибазол
- В) дроперидол
- Г) димедрол

**1522. [T010923] ПРИРАЩЕНИЮ ПЛАЦЕНТЫ СПОСОБСТВУЮТ**

- А) осложненные abortionы
- Б) пониженный уровень ХГ
- В) назначение прогестерона во время беременности
- Г) пониженный уровень окситоцина

**1523. [T010924] ПРИ ОСТРОМ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- А) прерывание беременности
- Б) сохранение беременности
- В) амбулаторное наблюдение
- Г) интенсивное лечение

**1524. [T010925] ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА, ПРИ КОТОРОМ РОДЫ ПРИ ДВОЙНЕ ПРОТЕКАЮТ С МЕНЬШИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ**

- А) головном предлежании 1-го и 2-го плодов
- Б) ножном предлежании 1-го плода и головном 2-го
- В) поперечном положении 2-го плода и головном 1-го
- Г) поперечном предлежании 2-х плодов

**1525. [T010926] ПРИ НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА ПОКАЗАНО**

- А) пособие по Цовьянову 2
- Б) пособие по Цовьянову1
- В) поворот по Брекстону-Гиксу
- Г) досрочное вскрытие плодного пузыря

**1526. [T010927] ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРОВОДИТСЯ**

- А) при чисто ягодичном предлежании
- Б) при ножном предлежании
- В) при поперечном положении
- Г) при косом положении плода

**1527. [T010928] ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- А) сохранения членорасположения плода
- Б) исправления положения плода
- В) родостимуляции
- Г) профилактики кровотечения

**1528. [T010929] ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ГОЛОВКИ ПРИ ТАЗОВОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД**

- А) Мориссо-Левре
- Б) Кредо-Лазаревича
- В) Кюстнера-Чукалова
- Г) Уилта-Иванова

**1529. [T010930] ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛУЧАЕ ОТХОЖДЕНИЯ ВОД ПРИ**

- А) поперечном положении плода
- Б) головном предлежании
- В) смешанном тазовом предлежании
- Г) чисто ягодичном предлежании

**1530. [T010931] ТЕРМИН «...CORPORA» (АНТИТЕЛА) СОДЕРЖИТ ПРИСТАВКУ**

- А) contra
- Б) anti
- В) endo
- Г) hypo

**1531. [T010932] ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) понижение выработки окситоцина
- Б) повышение концентрации простагландинов
- В) повышение выработки эстрадиола
- Г) повышение концентрации кальция

**1532. [T010933] С ЦЕЛЬЮ РОДОСТИМУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) энзопрост
- Б) эссенциале
- В) эуфиллин
- Г) этилизол

**1533. [T010934] ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПЕРТОНУСА МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) гинипрал
- Б) динопрост
- В) синестрол
- Г) хлористый кальций

**1534. [T010935] ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В СВЯЗИ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В**

- А) развернутой операционной
- Б) женской консультации
- В) приемном покое
- Г) предродовой палате

**1535. [T010936] СРАЩЕНИЕ БЛИЗНЕЦОВ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ НАЛИЧИИ**

- А) 1-го хориона и 1 амниона
- Б) 2-х хорионов и 2-х амнионов
- В) 4-х оболочек между плодами
- Г) 1-го хориона и 2-х амнионов

**1536. [T010937] ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДВОЙНЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО**

- А) невынашивание
- Б) перенашивание
- В) развитие крупных плодов
- Г) бурная родовая деятельность

**1537. [T010938] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ**

- А) малым косым
- Б) большим косым
- В) средним косым
- Г) прямым

**1538. [T010939] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТРА- И ПОСТНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, СВЯЗАНЫХ С ПЕРЕНАШИВАНИЕМ, ДОРОДОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗАНА НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 40,5
- Б) 40
- В) 41
- Г) 42

**1539. [T010940] ПОСЛЕ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАСТОТА ИММУНИЗАЦИИ У RH (-)-ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ В ПРОЦЕНТАХ В СРЕДНЕМ**

- А) 10
- Б) 20
- В) 30
- Г) 50

**1540. [T010941] ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- А) в отделения патологии беременных специализированных родильных домов
- Б) в отделения патологии беременных не специализированных родильных домов
- В) в отделения больниц по профилю патологии
- Г) в санатории-профилактории

**1541. [T010942] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РОДАХ В МОМЕНТ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- А) метилэргометрин
- Б) дицинон
- В) маммазин
- Г) прогнантол

**1542. [T010943] НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) нарушение мозгового кровообращения
- Б) повышение температуры
- В) обезвоживание
- Г) отеки

**1543. [T010944] НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 37 НЕДЕЛЬ И ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- А) подготовку к досрочному родоразрешению
- Б) лечение в дневном стационаре
- В) ожидание срочных родов
- Г) контроль функции почек

**1544. [T010946] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ИМЕЮЩИМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ УРОДСТВА ПЛОДА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ СРОКЕ 13-14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) краснуха
- Б) острый ринит
- В) ветрянка
- Г) острый трахеит

**1545. [T010947] РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) потерей веса
- Б) появлением отеков
- В) гипертензией
- Г) брадикардией

**1546. [T010948] ПРИ ВЫРАЖЕННОМ МНОГОВОДИИ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 5 - 7
- Б) 2 - 3
- В) 3-4
- Г) 1-1,5

**1547. [T010950] НАЛОЖЕНИЕ ШВА ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВЕСТИ**

- А) при беременности 11-14 недель
- Б) до беременности
- В) сразу после задержки месячных
- Г) при беременности 18-26 недель

**1548. [T010951] СНЯТИЕ ШВА, НАЛОЖЕННОГО ПО МЕТОДУ ШИРОДКАРА, ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 32
- Б) 30
- В) 36
- Г) 39

**1549. [T010953] ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОМИМО ЯИЧНИКОВ, ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ**

- А) плацентой
- Б) гипофизом
- В) гипоталамусом
- Г) щитовидной железой

**1550. [T010954] СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г, В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 28
- Б) 26
- В) 35
- Г) 30

**1551. [T010955] ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) фетопатии
- Б) гаметопатии
- В) эмбриопатии
- Г) зиготопатии

**1552. [T010956] РОДИЛЬНИЦЕ СО ШВАМИ НА ПРОМЕЖНОСТИ ПОЛАГАЕТСЯ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК В ДНЯХ**

- А) 70
- Б) 56
- В) 86
- Г) 84

**1553. [T010957] ПОСЛЕ ЗАШИВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ**

- А) 2 недели
- Б) 2 дня
- В) 5 дней
- Г) 1 месяц

**1554. [T010958] ПРИ АСИНКЛИТИЗМЕ СТРЕЛОВИДНЫЙ ШОВ ОТКЛОНЯЕТСЯ**

- А) к мысу
- Б) к лону
- В) кпереди
- Г) кзади

**1555. [T010959] НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПОЯВЛЕНИЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ**

- А) после нескольких абортов
- Б) при первой беременности
- В) при второй беременности после нормальных первых родов
- Г) у первородящей без отягощенного анамнеза

**1556. [T010960] ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ МЕНЕЕ ВСЕГО ВЕРОЯТНА ПРИ**

- А) слабой родовой деятельности
- Б) позднем гестозе
- В) многоводии
- Г) бурной родовой деятельности

**1557. [T010961] ПО ТЕОРИИ ВЕРБОВА ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗРЫВА МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) патология матки
- Б) бурная родовая деятельность
- В) клиническое несоответствие
- Г) крупный плод

**1558. [T010962] ПРОНИЦАЕМОСТЬ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) повышена
- Б) слегка понижена
- В) существенно понижена
- Г) не изменена

**1559. [T010963] СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) повышены
- Б) понижены
- В) не изменены
- Г) можно не учитывать для прогноза родов

**1560. [T010964] НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ КРОВЬ И МОЧУ НА САХАР У БЕРЕМЕННЫХ, ИМЕВШИХ**

- А) роды крупным плодом
- Б) два аборта
- В) запоздалые роды
- Г) быстрые роды

**1561. [T010965] У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ ДИАБЕТОМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЬ В ИНСУЛИНЕ**

- А) повышена
- Б) уменьшена
- В) резко уменьшена
- Г) остается без изменений

**1562. [T010967] ПРИ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОМ ДИАБЕТЕ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ У**

- А) акушера и эндокринолога
- Б) терапевта
- В) только эндокринолога
- Г) только гинеколога

**1563. [T010968] ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ГЕМОГЛОБИН В Г/Л**

- А) 96
- Б) 112
- В) 118
- Г) 120

**1564. [T010969] НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ**

- А) во 2-м и 3-м триместрах беременности и в родах
- Б) до 12 недель беременности
- В) в первую неделю беременности
- Г) в первый месяц беременности

**1565. [T010970] У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНА СОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ**

- А) бета-адреномиметиками
- Б) магнезией
- В) метацином
- Г) прогестероном

**1566. [T010971] ПРИ СИНДРОМЕ СДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ**

- А) затруднен возврат крови к сердцу из нижних конечностей
- Б) повышается объем циркулирующей крови
- В) наблюдается гипертензия
- Г) самочувствие не страдает

**1567. [T010972] ПИУРИЯ И БАКТЕРИУРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ У БЕРЕМЕННОЙ ПРИЗНАКОМ**

- А) пиелонефрита
- Б) диабета
- В) раннего гестоза
- Г) позднего гестоза

**1568. [T010973] РОДЫ ПРОВОДЯТ В АКУШЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИ**

- А) остром гепатите
- Б) гепатозе беременных
- В) трихомониазе
- Г) хроническом тонзиллите

**1569. [T010974] К СТАДИЯМ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ СТАДИИ**

- А) прилива, красного и серого опечения, разрешения
- Б) подъема, стояния температуры, кризиса
- В) легочных и внелегочных проявлений
- Г) начальная, развернутых клинических проявлений, стадия осложнений

**1570. [T010978] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ**

- А) почечные клубочки
- Б) почечные канальцы
- В) почечные лоханки
- Г) все элементы почечной паренхимы

**1571. [T010979] ИЗЖОГА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ**

- А) забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тонуса кардиального сфинктера
- Б) появлении эрозий и язв на слизистой пищевода
- В) уменьшении образования слизи в желудке и неполной нейтрализации соляной кислоты
- Г) повышенной кислотности желудочного сока

**1572. [T010980] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) закупорка общего желчного протока желчными камнями
- Б) закупорка общего желчного протока лямблиями
- В) вирусный гепатит
- Г) гемолитическая болезнь новорожденных

**1573. [T010982] ОСЛОЖНЕНИЕМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ, КОТОРОЕ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, ПРОТЕИНУРИИ И ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) преэклампсия и эклампсия
- Б) токсикоз
- В) кровотечение
- Г) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

**1574. [T010983] РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ К \_\_\_\_ НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) 12 – 16-й
- Б) 4 – 6-й
- В) 8 – 10-й
- Г) 17 – 18-й

**1575. [T010984] «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) цервикометрия и определение фетального фибронектина
- Б) измерение истинной коньюгаты
- В) определение высоты стояния дна матки
- Г) доплерометрия

**1576. [T010986] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) непрекращающаяся рвота, прогрессирующая кетонурия в течении 3-4 дней, выраженная тахикардия, желтушное окрашивание склер и кожного покрова
- Б) рвота до 5 раз в день, отсутствие аппетита
- В) дерматоз, температура 37,5<sup>0</sup>C, чдд 21 – 22
- Г) рвота 5-10 раз в день, протеинурия, лейкоцитоз

**1577. [T010987] МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТЕКОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) голени
- Б) отеки поясница и передняя брюшная стенка
- В) лицо
- Г) правая рука

**1578. [T010989] В ТРИАДУ ЦАНГЕМЕЙСТЕРА ВХОДЯТ СИМПТОМЫ**

- А) артериальная гипертензия, протеинурия, отеки
- Б) артериальная гипотензия, протеинурия, отеки
- В) артериальная гипертензия, гематурия, отеки
- Г) судороги, олигурия, отеки

**1579. [T010990] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРОТИВОСУДОРЖНОЕ, ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИИ И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ БАЗОВОЙ ТЕРАПИЕЙ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ**

- А) магния сульфат
- Б) фуросемид
- В) фенобарбитал
- Г) 0,9% раствор NaCl

**1580. [T010991] СРОКАМИ ОЧЕНЬ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ В НЕДЕЛЯХ**

- А) 22 – 27
- Б) 28 - 33
- В) 34 – 37
- Г) 38 – 42

**1581. [T010992] ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ, ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ, СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) Hellp –синдром
- Б) ДВС – синдром
- В) эклампсия
- Г) преэклампсия

**1582. [T010993] КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ НАЧИНАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выраженные схваткообразные боли внизу живота или схватки
- Б) боли в поясничной области и нижней части живота
- В) регулярная родовая деятельность и раскрытие маточного зева более 3 см
- Г) все ответы верны

**1583. [T010994] ТОКОЛОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ- ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) нефидипин и атосибан
- Б) парацетамол и атропин
- В) клонидин и промедол
- Г) магния сульфат и окситоцин

**1584. [T010995] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) респираторный дистресс-синдром плода
- Б) генерализованная инфекция
- В) врожденные пороки развития
- Г) гипоксия плода

**1585. [T010996] СИМПТОМОМ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) кровянистые выделения
- Б) тошнота
- В) рвота
- Г) схватки

**1586. [T010997] ТАКТИКОЙ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ РВОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) коррекция режима питания
- Б) консультация терапевта
- В) госпитализация
- Г) консультация гастроэнтеролога

**1587. [T010998] ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ ВРАЧ ДОЛЖЕН**

- А) предупредить аспирацию и асфиксию
- Б) держать руки беременной
- В) осуществить переливание плазмы крови
- Г) ничего не делать

**1588. [T010999] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) перенесенная ранее венозная тромбоэмболия
- Б) хронический гастрит
- В) хронический пиелонефрит
- Г) бронхиальная астма

**1589. [T011000] ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗНАЧАЮТ ПРЕПАРАТЫ**

- А) гормонов щитовидной железы
- Б) половых гормонов
- В) антибактериальные препараты
- Г) антигипертензивные препараты

**1590. [T011001] АНТИДОТОМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СУЛЬФАТА МАГНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) глюконат кальция
- Б) увлажненный кислород
- В) препараты железа
- Г) антигистаминные препараты

**1591. [T011002] ПЕРЕДОЗИРОВКА СУЛЬФАТА МАГНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ**

- А) дыхательной и сердечной недостаточности
- Б) запоров
- В) отеков голеней
- Г) рвоты

**1592. [T011003] ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- А) легкоусвояемых углеводов
- Б) хлеба грубого помола
- В) кисломолочных продуктов
- Г) отварного мяса

**1593. [T011004] РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРАВИЛОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) дробное и частое питание (5-6 раз в день)
- Б) редкое питание утром и вечером (2 раза в день)
- В) перенос основного объема пищи на ужин
- Г) перенос основного объема пищи на завтрак

**1594. [T011005] ПЕРЕД СНОМ БЕРЕМЕННОЙ ЛУЧШЕ СЪЕСТЬ**

- А) кефир, фрукты
- Б) бутерброд с колбасой
- В) жареный картофель
- Г) пирожное

**1595. [T011006] БЕРЕМЕННЫМ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЗДА НА**

- А) велосипеде
- Б) автомобиле
- В) общественном транспорте
- Г) железнодорожном транспорте

**1596. [T011007] РАБОТУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ БЕРЕМЕННЫМ НЕОБХОДИМО**

- А) сократить
- Б) увеличить
- В) запретить
- Г) не изменять

**1597. [T011008] ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ НАЧАЛА ФЕРРОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) 1 триместр
- Б) 2 триместр
- В) 3 триместр
- Г) перед родами

**1598. [T011009] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭУТИРИОИДНОГО ЗОБА ЯВЛЯЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- А) йодированной соли
- Б) сахара
- В) клетчатки
- Г) кисломолочных продуктов

**1599. [T011010] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДОВАНО УПОТРЕБЛЯТЬ ПИЩУ ОБОГАЩЕННУЮ**

- А) клетчаткой
- Б) йодом
- В) сахаром
- Г) солью

**1600. [T011011] ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ У БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗА СЧЕТ**

- А) хлеба грубого помола
- Б) кондитерских изделий
- В) кисломолочных продуктов
- Г) орехов

**1601. [T011012] МЕРОПРИЯТИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) обследование и ранее выявление хронических вирусных заболеваний печени
- Б) прерывание беременности в острой фазе
- В) введение антибактериальных препаратов
- Г) длительная контрацепция

**1602. [T011013] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ ПУЛЬМОНОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) бронхиальная астма
- Б) ревматизм
- В) пороки сердца
- Г) вирусные гепатиты

**1603. [T011014] ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫЯВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНО**

- А) тест на толерантность к глюкозе
- Б) определение глюкозы в моче
- В) определение алт и аст
- Г) определение общего белка в моче

**1604. [T011015] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КРАСНУХОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) вакцинация от краснухи до начала беременности и предотвращение контактов с больными краснухой
- Б) постановка прививки от краснухи во время беременности
- В) исключение из пищи облигатных аллергенов
- Г) применение фолиевой кислоты

**1605. [T011016] ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) прегравидарная подготовка
- Б) соблюдение правил гигиены
- В) инфузионная терапия
- Г) противовирусная терапия

**1606. [T011017] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЖОГИ У БЕРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА**

- А) с приподнятым головным концом
- Б) с приподнятым ножным концом
- В) с приподнятым ножным и головным концом
- Г) положение не имеет значения

**1607. [T011018] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАМКАХ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ**

- А) фолиевую кислоту
- Б) витамин С
- В) рыбий жир
- Г) витамин в12

**1608. [T011019] ТЕРМИН «...GLYCAEMIA» (УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В КРОВИ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ**

- А) hyper
- Б) hypo
- В) poly
- Г) para

**1609. [T011020] СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ БОЛЕЗНЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) -itis
- Б) -oma
- В) -iasis
- Г) -ismus

**1610. [T011021] СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ ОПУХОЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) -oma
- Б) -itis
- В) -iasis
- Г) -ismus

**1611. [T011022] ТЕРМИН «ANGI...» (СОСУДИСТАЯ ОПУХОЛЬ) ИМЕЕТ СУФФИКС**

- А) -oma
- Б) -itis
- В) -iasis
- Г) -ismus

**1612. [T011024] ТЕРМИН «...URIA» (МАЛОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ) СОДЕРЖИТ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ- ПРИСТАВКУ**

- A) olig
- Б) sym
- В) pan
- Г) meso

**1613. [T011025] ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «РЕБЕРНЫЙ» ИМЕЕТ СЛОВАРНУЮ ФОРМУ**

- A) costalis, e
- Б) costalis, a,um
- В) costalis,is
- Г) costalis,ior

**1614. [T011026] БУКВОСОЧЕТАНИЕ «ТИ» ЧИТАЕТСЯ КАК (ЦИ) В СЛОВЕ**

- A) solutio
- Б) fonticulus
- В) tibia
- Г) mixtio

**1615. [T011027] ТЕРМИН «...CARDIUM» (ОКОЛОСЕРДЕЧНАЯ СУМКА) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ**

- A) peri
- Б) epi
- В) endo
- Г) sym

**1616. [T011028] В ТЕРМИНЕ « ...LINGUA»(ПОД ЯЗЫК) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕДЛОГ**

- A) sub
- Б) per
- В) in
- Г) pro

**1617. [T011084] ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОТСУСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ (МИН)**

- А) 10
- Б) 5
- В) 30
- Г) 40

**1618. [T011085] ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАНИМАЦИИ ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ**

- А) в восстановлении проходимости дыхательных путей
- Б) в искусственной вентиляции легких
- В) в коррекции метаболических расстройств
- Г) в проведении закрытого массажа сердца

**1619. [T011086] ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- А) преэклампсии тяжелой степени
- Б) эклампсии
- В) отеков
- Г) остеомаляции

**1620. [T011087] К ПРИЗНАКУ ЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ**

- А) тонические и клонические судороги
- Б) тахикардия
- В) обезвоживание
- Г) анасарка

**1621. [T011088] ПРЕДСУДОРОЖНЫЙ ПЕРИОД ЭКЛАМПСИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ**

- А) фибриллярными подергиваниями мышц лиц и фиксированным взглядом в одну сторону
- Б) клоническими судорогами
- В) тоническими судорогами
- Г) отсутствием дыхания

**1622. [T011089] НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПРОВОДЯТ**

- А) двумя пальцами
- Б) проксимальной частью кистей
- В) одной рукой
- Г) двумя руками

**1623. [T011090] УСЛОВИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ СПОСОБОМ «РОТ В РОТ», ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) свободная проходимость дыхательных путей
- Б) 2 реаниматора
- В) плотный обхват рта пострадавшего ртом реаниматора
- Г) 3 реаниматора

**1624. [T011091] ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) протеинурия
- Б) лейкоцитурия
- В) бактериурия
- Г) пиурия

**1625. [T011092] ВТОРАЯ ФАЗА ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) апноэ
- Б) патологическим типом дыхания
- В) дыханием нормальным
- Г) дыханием форсированным

**1626. [T011093] НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР НА 5 БАЛЛОВ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ**

- А) средней степени
- Б) тяжелой степени
- В) легкой степени
- Г) нет асфиксии

**1627. [T011094] К ПРИЗНАКАМ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ**

- А) боль в эпигастральной области, рвота
- Б) фибриллярные подергивания мышц лица
- В) гипотония
- Г) гипертония

**1628. [T011095] «ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) внутривенное введение 25% раствора сернокислой магнезии
- Б) применение гипотензивных средств
- В) переливание 10-20% раствора альбумина с целью восполнения дефицита белка
- Г) применение диуретиков

**1629. [T011096] РЕАНИМАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ**

- А) проблемы оживления организма
- Б) профилактику экстремальных ситуаций
- В) функционирование основных жизненных систем
- Г) физиологию человека

**1630. [T011098] ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- А) оживлением организма
- Б) замещением функции дыхания
- В) защитой пациента от операционной травмы
- Г) оказанием неотложной помощи

**1631. [T011099] КОМПЛЕКСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- А) визуальное, мониторное, лабораторное наблюдения
- Б) визуальное, мониторное наблюдения
- В) мониторное, лабораторное наблюдения
- Г) интенсивное наблюдение

**1632. [T011100] В ОСНОВЕ ВНЕЗАПНОЙ КОРОНАРНОЙ СМЕРТИ ЛЕЖИТ**

- А) асистолия
- Б) артериальная гипертензия
- В) централизация кровообращения
- Г) гипотония

**1633. [T011101] БОЛЬНОГО С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПОЛОЖЕНИИ**

- А) с приподнятым изголовьем
- Б) сидя
- В) лежа на спине
- Г) лежа на животе

**1634. [T011102] ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ АППАРАТ БОБРОВА ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- А) 40% раствором этилового спирта
- Б) изотоническим раствором натрия хлорида
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором хлоргексидина

**1635. [T011104] УДАЛЕНИЕ СЛИЗИ ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЭЛЕКТРООТСОСОМ У БОЛЬНОГО В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИИ (СЕК)**

- А) не более 15
- Б) не более 5
- В) не более 20
- Г) 20-30

**1636. [T011106] ТАКТИКА АКУШЕРКИ В ПЕРИОД КЛОНИЧЕСКИХ СУДОРОГ У БОЛЬНОЙ С ЭКЛАМПСИЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- А) профилактику ушибов и прикусывания языка
- Б) проведение оксигенотерапии
- В) введение литической смеси
- Г) катетеризацию периферической вены

**1637. [T011107] ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОСТРЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ПОКАЗАНО**

- А) при любых острых пероральных отравлениях
- Б) если прошло не больше 2 часов после приема яда
- В) при отравлениях кислотами и щелочами
- Г) при бессознательном состоянии больного

**1638. [T011108] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) атропин 0,1%
- Б) эфедрин 5%
- В) сернокислая магнезия 25%
- Г) унитиол

**1639. [T011109] СООТНОШЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ И МАССАЖА СЕРДЦА ПРИ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1:4
- Б) 1:3
- В) 1:5
- Г) 1:1

**1640. [T011110] ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫМ И ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ**

- А) изо рта в рот и в нос
- Б) изо рта в рот
- В) изо рта в нос
- Г) изо рта в рот, изо рта в нос

**1641. [T011111] ОБЪЕМ ВОЗДУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ**

- А) 20-30
- Б) 50-60
- В) 80- 100
- Г) больше 100

**1642. [T011112] МАССАЖ СЕРДЦА НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ ПРОВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ (В МИН)**

- А) 120
- Б) 100
- В) 160
- Г) 80

**1643. [T011113] ОСНОВНЫМ ДИАГНОТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ТИПИЧНОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут
- Б) нарушение ритма сердца
- В) артериальная гипертензия
- Г) артериальная гипотензия

**1644. [T011114] ПРИЗНАКОМ ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) подъем сегмента ST
- Б) Q патологический
- В) высокий остроконечный Т
- Г) Т в грудных отведениях

**1645. [T011115] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- А) гиперемия лица, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен
- Б) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые
- В) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус
- Г) тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус

**1646. [T011116] ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЫХАНИЕ**

- А) частое, глубокое
- Б) поверхностное, неритмичное
- В) не нарушено
- Г) редкое, с длительным апноэ

**1647. [T011117] В ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВХОДИТ**

- А) туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, внутривенное введение 0,9% физраствора
- Б) внутривенное введение инсулина 40 ЕД, ингаляция кислорода, введение 0,9% физраствора внутривенно капельно
- В) ингаляция кислорода, введение полиглюкина внутривенно капельно
- Г) внутримышечное введение инсулина 20 ЕД, внутривенное введение гемодеза

**1648. [T011118] ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ У БОЛЬНОГО КОЖА**

- А) обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц повышен
- Б) обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц повышен
- В) гиперемированная, влажная, зрачки резко расширены, тонус мышц снижен
- Г) гиперемированная, тонус мышц повышен

**1649. [T011120] МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 30 минут после введения препарата
- Б) 3 минуты после введения препарата
- В) 1 час после введения препарата
- Г) 15 минуты после введения препарата

**1650. [T011121] ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) расширение венозного отдела сосудистого русла
- Б) снижение сократительной способности миокарда
- В) уменьшение объема циркулирующей крови
- Г) угнетение сосудодвигательного центра

**1651. [T011122] ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) внутривенное введение преднизолона и адреналина
- Б) наложение жгута
- В) подготовка аптечки для оказания помощи при анафилактическом шоке
- Г) введение антигистаминных препаратов

**1652. [T011125] ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ ОБЫЧНО ПРЕДШЕСТВУЕТ**

- А) бурная родовая деятельность
- Б) длительный подготовительный период
- В) длительный безводный период
- Г) артериальная гипертензия

**1653. [T011127] К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ, НЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) многоводие
- Б) преждевременная отслойка normally расположенной плаценты
- В) разрыв матки
- Г) несвоевременное вскрытие плодного пузыря

**1654. [T011128] ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ**

- А) диетотерапию с ограничением углеводов и жиров, инсулиновую терапию
- Б) сахаропонижающие препараты группы сульфанилмочевины
- В) диетотерапию с ограничением белков
- Г) бигуаниды

**1655. [T011129] К ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НЕ ОТНОСИТСЯ**

- А) маловодие
- Б) преждевременное прерывание беременности
- В) раннее развитие позднего токсикоза
- Г) ангиопатия сетчатки

**1656. [T011130] К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ДВС-СИНДРОМА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ОТНОСИТСЯ**

- А) нарушение гемостаза при позднем токсикозе беременных, попадание в кровь тромбопластических веществ
- Б) выделение в кровь фибринолитических веществ
- В) дефицит VIII фактора свертывающей системы крови
- Г) массивное кровотечение

**1657. [T011131] В АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР ПОСТУПИЛА БЕРЕМЕННАЯ С ДИАГНОЗОМ: - БЕРЕМЕННОСТЬ 33 НЕДЕЛИ; - ПРЕЭКЛАМСИЯ; - ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ; - АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА. СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ**

- А) экстренное кесарево сечение
- Б) плодоразрушающую операцию
- В) кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- Г) вакуум-экстракцию плода

**1658. [T011132] В РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИЛА БЕРЕМЕННАЯ С ЖАЛОБАМИ НА ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ: - БЕРЕМЕННОСТЬ 34 НЕДЕЛИ; - ПОЛНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ; - АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА. СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ**

- А) экстренное кесарево сечение
- Б) плодоразрушающую операцию
- В) кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- Г) вакуум-экстракцию плода

**1659. [T011134] ПОТЕРЯ КРОВИ В 750-1500МЛ (15-30% ОЦК) СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ**

- А) 2-ой
- Б) 1-ой
- В) 3-ой
- Г) 4-ой

**1660. [T011135] ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВВЕДЕНИЕ РАСТВОРА В ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ КАТЕТЕР ЗАВЕРШИЛОСЬ, НЕОБХОДИМО**

- А) поставить «гепариновую пробку» и закрыть катетер
- Б) закрыть катетер пробкой и этим ограничиться
- В) поставить «гепариновую пробку» и этим ограничиться
- Г) промыть и закрыть катетер

**1661. [T011137] ПУЛЬСОКСИМЕТР, КАПНОГРАФ, ВОЛЮМОСПИРОМЕТР ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ**

- А) оксигенации, пульса, вентиляции
- Б) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- В) ЭКГ, АД, центрального венозного давления, электроэнцефалограммы, температуры
- Г) работы аппарата ИВЛ

**1662. [T011138] КАРДИОМОНИТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ**

- А) ЭКГ, АД, ЧДД, центрального венозного давления , температуры, дыхания
- Б) оксигенации, вентиляции и кровообращения
- В) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- Г) работы аппарата ингаляционного наркоза

**1663. [T011139] К ВИДАМ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА ОТНОСЯТ**

- А) фибрилляцию желудочков, асистолию
- Б) фибриллярные подергивания мышц сердца, инфаркт миокарда
- В) тахикардию, аритмию
- Г) агонию, гипокапнию

**1664. [T011141] ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КОМЫ**

- А) гипогликемической
- Б) гипергликемической
- В) уремической
- Г) почечной

**1665. [T011152] ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР НАНОСИТСЯ**

- А) на границе средней и нижней части грудины
- Б) в области мечевидного отростка
- В) в области левого подреберья
- Г) в верхней части грудины

**1666. [T011153] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В КРОВОТОК МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) через магистральную вену
- Б) через периферическую вену
- В) под корень языка
- Г) эндотрахеально

**1667. [T011154] ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ**

- А) падение АД
- Б) головная боль
- В) резкая слабость
- Г) кожный зуд

**1668. [T011157] ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЁННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ**

- А) холодной водой до онемения
- Б) 96% этиловым спиртом
- В) раствором новокаина
- Г) жиром

**1669. [T011158] К ПРИНЦИПАМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ ОТНОСЯТ**

- А) по возможности нейтрализацию вещества, вызывающие ожог, а затем промывание холодной водой
- Б) промывание холодной водой в течение часа
- В) введение анальгетиков, начиная со второй степени – применение сухих асептических повязок без обработки обожжённой поверхности
- Г) присыпка поврежденной поверхности тальком

**1670. [T011164] ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ГЕСТОЗЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН**

- А) Строгановым
- Б) Скробанским
- В) Бодягиной
- Г) Бровкиным

**1671. [T011167] НА ФОНЕ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АД ИЗМЕРЯЮТ**

- А) до и после введения раствора сульфата магния
- Б) 2 раза в сутки
- В) 3 раза в сутки
- Г) 4 раза в сутки

**1672. [T011175] ТОКОЛИТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) партусистен
- Б) простенон
- В) прозерин
- Г) пахикармин

**1673. [T011176] ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЮТ ПРИНЦИПУ**

- А) должны назначаться врачом
- Б) не следует принимать
- В) можно принимать без консультации врача
- Г) не причиняют вреда плоду во время эмбриогенеза

**1674. [T011184] ИСХОДОМ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) увеличение процента оперативных вмешательств
- Б) гипотрофия плода
- В) увеличение количества вод
- Г) невозможность родоразрешений через естественные родовые пути

**1675. [T011188] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОЛНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ И КРОВОТЕЧЕНИИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) наблюдении за состоянием АД, пульсом роженицы, подготовке набора первой помощи при кровотечении, подготовке женщины к экстренной операции «cesareo сечение»
- Б) прикладывании пузыря со льдом на область матки и наблюдении за состоянием АД, пульсом
- В) выдаче дицинона и наблюдении за состоянием АД, пульсом
- Г) выдаче дицинона и прикладывании пузыря со льдом на область матки

**1676. [T011190] ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ**

- А) бициллин
- Б) рифампицин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

**1677. [T011209] ПЕРИОД ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, КОГДА ОРГАНИЗМ РАБОТАЕТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) беременность
- Б) детство
- В) климакс
- Г) старость

**1678. [T011221] БЕРЕМЕННЫМ ПОСЛЕ 28 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ**

- А) длительных поездок на любом виде транспорта
- Б) прогулок в парке
- В) сбалансированного питания
- Г) общения с родственниками

**1679. [T011230] 50% ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛКОВ В ПИТАНИИ БЕРЕМЕННОЙ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬСЯ НА БЕЛКИ**

- А) животного происхождения
- Б) растительного происхождения
- В) химического происхождения
- Г) генномодифицированные белки

**1680. [T011586] ТЕРМИН «...CARDITIS» (ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ СУМКИ) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ**

- А) peri
- Б) para
- В) pan
- Г) sub

**1681. [T011587] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) болевой синдром средней и сильной интенсивности
- Б) бессонница
- В) беременность
- Г) период лактации

**1682. [T011588] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТА ОМНОПОН ОТНОСИТСЯ**

- А) наркотический анальгетик
- Б) транквилизатор
- В) антибиотик
- Г) муколитик

**1683. [T011589] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- А) феррум лек
- Б) лазикс
- В) фурагин
- Г) дифлюкан

**1684. [T011590] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гипотензивное
- Б) нейролептическое
- В) обезболивающее
- Г) противоаллергическое

**1685. [T011592] ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) зиртек
- Б) фраксипарин
- В) амосин
- Г) нитрофурил

**1686. [T011593] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТА ПИРИДОКСИН ОТНОСИТСЯ**

- А) витамин
- Б) антибиотик
- В) гомеопатическое средство
- Г) противовирусное средство

**1687. [T011594] УТЕРОТОНИЗИРУЮЩИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) метилэргометрин
- Б) гепарин
- В) но-шпа
- Г) кларитин

**1688. [T011595] К СЛАБИТЕЛЬНОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ**

- А) бисакодил
- Б) анаприлин
- В) сумамед
- Г) амоксиклав

**1689. [T011596] К ПЕРИОПЕРАТИВНОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ ВРЕМЯ**

- А) от принятия решения об операции до восстановления трудоспособности
- Б) от поступления пациента до начала операции
- В) от окончания операции до выписки
- Г) с момента окончания операция до восстановления трудоспособности

**1690. [T011597] ПЕРЕД ПЛНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- А) полная санитарная обработка
- Б) частичная санитарная обработка
- В) обтиранье кожи и смена белья
- Г) санитарная обработка не производится

**1691. [T011598] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) комплексная подготовка пациентки к операции
- Б) обследование сердечно-сосудистой системы
- В) улучшение состояния пациентки
- Г) санация очагов инфекции

**1692. [T011599] СРОКОМ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) восстановление трудоспособности
- Б) выписка из стационара
- В) заживление послеоперационной раны
- Г) устранение ранних послеоперационных осложнений

**1693. [T011600] ФАКТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) характер заболевания
- Б) особенности начала заболевания
- В) объем предстоящей операции
- Г) время поступления в стационар

**1694. [T011601] ПРЕМЕДИКАЦИЮ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЕТ**

- А) врач-анестезиолог
- Б) врач приемного покоя
- В) лечащий врач
- Г) акушерка

**1695. [T011602] ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ В РАБОТЕ АКУШЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) обеспечение безопасности материнства и соблюдение прав пациентки
- Б) забота об имидже акушерки
- В) выполнение всех желаний роженицы
- Г) внедрение хозрасчета и расширение сферы услуг

**1696. [T011603] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) выполнить назначенную анестезиологом- премедикацию
- Б) дать женщине слабительное
- В) вечером перед сном накормить женщину ужином
- Г) побеседовать с родственниками

**1697. [T011604] ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА АКУШЕРКА В ПРАВЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**

- А) ручное выделение и отделение послода и его частей
- Б) кесарево сечение
- В) прерывание беременности
- Г) наложение акушерских щипцов

**1698. [T011605] ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА АКУШЕРКА В ПРАВЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**

- А) рассечение промежности в родах
- Б) кесарево сечение
- В) прерывание беременности
- Г) наложение акушерских щипцов

**1699. [T011606] ПРИ ОПЕРАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОБЯЗАННОСТЬ АКУШЕРКИ ВХОДИТ**

- А) подготовка беременной
- Б) обезболивание пациентки
- В) наложение на шейку матки циркулярного шва в области внутреннего зева
- Г) беседа с родственниками

**1700. [T011607] КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) каждый час
- Б) каждые 2 часа
- В) каждые 3 часа
- Г) каждые 4 часа

**1701. [T011608] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- А) вечером накануне операции и утром в день операции
- Б) не проводится
- В) за два дня до операции
- Г) только утром в день операции

**1702. [T011609] ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ВИДИМАЯ КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ ВСЕГО СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ**

- А) 500
- Б) 350
- В) 200
- Г) 800

**1703. [T011610] С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ЭКЛАМПСИИ ПРОИЗВОДЯТ**

- А) кесарево сечение
- Б) экстракцию плода за тазовый конец
- В) вакуум-экстракцию плода
- Г) плодоразрушающую операцию

**1704. [T011611] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) прозерин
- Б) прогестерон
- В) партусистен
- Г) папазол

**1705. [T011612] УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ СВЯЗАНО С**

- А) наличием очагов хронической инфекции у женщины
- Б) длительности безводного промежутка
- В) качеством шовного материала
- Г) длительности родов

**1706. [T011613] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) антибактериальную терапию
- Б) гормонотерапию
- В) утеротоническую терапию
- Г) физические факторы воздействия

**1707. [T011614] ВЕСЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД УСЛОВНО ДЕЛЯТ НА**

- А) диагностический и подготовительный
- Б) диагностический и лечебный
- В) лечебный и дооперационный
- Г) ранний и поздний

**1708. [T011615] ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ КРОВИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ**

- А) тромбозов и тромбоэмболий
- Б) язв
- В) пролежней
- Г) кровотечений

**1709. [T011616] ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛНОТЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

- А) экстренных больных
- Б) плановых больных
- В) срочных больных
- Г) детей

**1710. [T011617] ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПОД СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ПАЦИЕНТКУ ПОДГОТАВЛИВАЮТ**

- А) так же, как для наркоза
- Б) так же, как для обследования
- В) так же, как для местной анестезии
- Г) подготовка не нужна

**1711. [T011618] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТКИ К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ**

- А) в обмывании или обтирании особенно загрязненных участков тела
- Б) в гигиеническом душе
- В) в купание в ванне
- Г) обработка не производится

**1712. [T011619] ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ОБЫЧНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- А) к 3-6-м суткам послеоперационного периода
- Б) к 3-6-ти часам послеоперационного периода
- В) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода
- Г) перед выпиской из стационара

**1713. [T011620] НАГНОЕНИЕ РАНЫ ОБЫЧНО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ**

- А) на 6-7-е сутки после операции
- Б) к 3-6-ти часам послеоперационного периода
- В) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода
- Г) перед выпиской из стационара

**1714. [T011621] ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОК ПЕРЕНЕСШИХ АБДОМИНАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) внутрибрюшинное кровотечение
- Б) похудение
- В) бледность
- Г) сонливость

**1715. [T011622] КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАРЕЗА ЖКТ ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ**

- А) уже в 1-е сутки после операции
- Б) на 5-е сутки
- В) на 12-е сутки
- Г) перед выпиской

**1716. [T011623] СОХРАНЯЮЩИЙСЯ НА 3-4-Й ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ**

- А) послеоперационного перитонита
- Б) кишечной непроходимости
- В) расхождении швов
- Г) формировании свища свища

**1717. [T011624] ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ФАЗЕ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) свежезамороженная плазма
- Б) цельная кровь
- В) гипертонический раствор
- Г) гипотонический раствор

**1718. [T011625] ВСЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКЛАМПСИИ НАПРАВЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ**

- А) следующего приступа судорог
- Б) пареза кишечника
- В) почечной колики
- Г) печеночной комы

**1719. [T011626] ЗА 30 МИНУТ ДО ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ВВОДЯТ**

- А) атропин и димедрол
- Б) метилэрゴметрин
- В) питуитрин
- Г) прозерин и окситоцин

**1720. [T011627] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пороки развития плода несовместимые с жизнью
- Б) экстрагенитальная патология в стадии компенсации
- В) предлежание плаценты
- Г) рубец на матке

**1721. [T011628] ПРИ ДЕФЕКТЕ ПЛАЦЕНТЫ ПОКАЗАНО**

- А) ручное обследование стенок полости матки
- Б) выскабливание стенок полости матки
- В) внутривенное введение окситоцина
- Г) проведение вакуум-аспирации

**1722. [T011629] ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 5 ПЛОДАМИ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- А) редуцирование лишних плодов в первые недели
- Б) проведение сохраняющей терапии без редуцирования
- В) наблюдение без сохраняющей терапии
- Г) прерывание беременности

**1723. [T011630] В СЛУЧАЕ РОДОВ ПРИ НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИ МАССЕ ПЛОДА 3800 Г НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- А) кесарева сечения
- Б) родостимуляции
- В) перенеотомии
- Г) классического акушерского пособия

**1724. [T011631] ПРИ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ТАЗА РОДЫ ЗАКАНЧИВАЮТ ПУТЕМ**

- А) операции кесарева сечения
- Б) наложения акушерских щипцов
- В) родостимуляции
- Г) вакуум-экстракции плода

**1725. [T011632] В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РОДАХ ПОКАЗАНО**

- А) кесарево сечение
- Б) перенеотомия
- В) акушерские щипцы
- Г) проведение родостимуляции

**1726. [T011633] В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ В РОДАХ НЕОБХОДИМО**

- А) выполнять операцию кесарева сечения
- Б) применить акушерские щипцы
- В) назначить родостимуляцию
- Г) применить бинт Вербова

**1727. [T011634] ОПЕРАЦИЯ ВСКРЫТИЯ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) амниотомия
- Б) амниоцентез
- В) амниоскопия
- Г) амнионит

**1728. [T011635] УШИВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ РАССЕЧЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) перионерафия
- Б) эпизиотомия
- В) пубиотомия
- Г) перионетомия

**1729. [T011636] НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ МАТКИ**

- А) поперечный в области нижнего сегмента
- Б) продольный в области нижнего сегмента
- В) Т-образный
- Г) корпоральный

**1730. [T011637] ХОРИОНАМИОНИТ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) противопоказанием к операции «кесарево сечение»
- Б) воспалением брюшины
- В) абсолютным показанием к операции «кесарево сечение»
- Г) относительным показанием к операции «кесарево сечение»

**1731. [T011638] ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НУЖНО**

- А) произвести экстраперитонеальное кесарево сечение
- Б) вести роды через естественные родовые пути
- В) выполнить интраперитонеальное кесарево сечение
- Г) наложить акушерские щипцы

**1732. [T011639] АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНА**

- А) для профилактической меры
- Б) только при высокой температуре
- В) только при абсолютных показаниях
- Г) только при длительном безводном периоде

**1733. [T011640] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ» АКУШЕРКА ДОЛЖНА ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ**

- А) выполнить назначенные анестезиологом средства и способствовать обеспечению сна и покоя женщины перед операцией
- Б) дать женщине слабительное
- В) подробно рассказать обо всех этапах операции
- Г) накормить женщину ужином

**1734. [T011641] РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВОДИТСЯ ПОД**

- А) внутривенным наркозом
- Б) парацервикальной анестезией
- В) пуден达尔ной анестезией
- Г) местная инфильтрационной анестезией

**1735. [T011642] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ**

- А) антибиотики и сокращающие средства
- Б) наркотические анальгетики
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) гипотензивные и мочегонные средства

**1736. [T011643] ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ «МАТКИ КЮВЕЛЕРА» ПОКАЗАНО**

- А) экстирпация матки
- Б) кесарево сечение
- В) выскабливание полости матки
- Г) консервативное наблюдение

**1737. [T011644] ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) повышение температуры в родах
- Б) безводный промежуток 12 часов
- В) косое положение плода
- Г) поперечное положение плода

**1738. [T011645] УШИВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ РОДИЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) перинеография
- Б) эпизиотомия
- В) перинеотомия
- Г) витректомия

**1739. [T011646] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОРЕЗА КИШЕЧНИКА НА 2-3 СУТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НУЖНО ПРИМЕНİТЬ**

- А) прозерин
- Б) прогестерон
- В) партусистен
- Г) папазол

**1740. [T011647] ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ МАТКИ ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пропитывание стенки матки кровью
- Б) перерастяжение матки
- В) гипотония матки
- Г) наличие добавочного рога матки

**1741. [T011648] ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) боль
- Б) учащенное мочеиспускание
- В) диарея
- Г) рвота

**1742. [T011662] ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ НАЗНАЧАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (ДНЕЙ)**

- А) 3
- Б) 1
- В) 2
- Г) 5

**1743. [T011665] СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ**

- А) зависят от диагноза
- Б) в ближайшие часы
- В) в течение месяца
- Г) в течение недели

**1744. [T011667] В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ**

- А) регулярная смена положения тела
- Б) рациональное питание
- В) применение инъекций антибиотиков
- Г) подкладывание kleenки под матрац больного

**1745. [T011668] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ И ЭМБОЛИЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ**

- А) ранняя активация пациента
- Б) соблюдение диеты
- В) санация очагов инфекции до операции
- Г) исключение переохлаждения пациента

**1746. [T011672] ЦЕЛЬЮ АКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) профилактика тромбоэмбологических осложнений
- Б) предупреждение занесения инфекции в рану
- В) предупреждение вторичного кровотечения
- Г) удлинение послеоперационного периода

**1747. [T011686] НЕДОСТАТОЧНО ОБРАБОТАННЫЕ РУКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) фактором и источником передачи инфекции
- Б) источником инфекции
- В) фактором передачи инфекции
- Г) механизмом передачи инфекции

**1748. [T011733] ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) гипертензия
- Б) гипотония
- В) анемия
- Г) гипогликемия

**1749. [T011734] В ГРУППЕ ПОВТОРНОРОДЯЩИХ БЫСТРЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ С ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ (Ч)**

- А) от 4 до 2
- Б) от 6 до 4
- В) менее 2
- Г) менее 3

**1750. [T011736] ЗАПОЗДАЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ НАЧИНАЯ СО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ (ДН)**

- А) 295
- Б) 250
- В) 270
- Г) 280

**1751. [T011737] ПРИЗНАКОМ ПЕРЕНОШЕННОСТИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) мацерация кожи стоп и ладоней
- Б) широкие швы и роднички
- В) масса тела 4000 г
- Г) гидроцефалия плода

**1752. [T011738] ПРИЧИНОЙ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) снижение концентрации эстрадиола
- Б) повышение концентрации эстрадиола
- В) снижение концентрации прогестерона
- Г) повышение выработки простагландинов

**1753. [T011739] ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ НАЗЫВАЮТ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД**

- А) до начала родовой деятельности
- Б) с началом родовой деятельности
- В) при открытии шейки 3 см
- Г) при открытии шейки 6 см

**1754. [T011740] В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ОТХОЖДЕНИЯ ВОД И  
ОТСУСТВИЯ СХВАТОК В ДИНАМИКЕ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ  
РОДОСТИМУЛЯЦИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ**

- A) 6 часов
- Б) 1 час
- В) 1 сутки
- Г) 30 минут

**1755. [T011741] ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ  
\_\_ ЧАСОВ**

- A) 12
- Б) 24
- В) 1
- Г) 3

**1756. [T011742] ПРИ НЕУКРОТИМОЙ РВОТЕ ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЕТСЯ**

- A) тахикардия
- Б) брадикардия
- В) гипертензия
- Г) гипертермия

**1757. [T011743] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ПРИ ВТОРОЙ  
БЕРЕМЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 74 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ РОДОВ ИЛИ  
АБОРТА ВВОДЯТ**

- A) антирезус иммуноглобулин
- Б) антибиотики
- В) гемостатические средства
- Г) глюкокортикоиды

**1758. [T011745] РОДЫ У ЖЕНЩИНЫ С ДИАБЕТОМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В**

- A) специализированном родильном доме
- Б) родильном доме общего профиля
- В) обсервационном отделении родильного дома
- Г) эндокринном отделении стационара

**1759. [T011746] У РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ У МАТЕРИ С ДИАБЕТОМ**

- А) необходимо исследовать кровь на сахар
- Б) чаще всего бывает гипергликемия
- В) обычно выражена гипотрофия
- Г) кожные покровы, как правило, бледные

**1760. [T011747] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КРОВИ У БЕРЕМЕННОЙ**

- А) план ведения беременности и родов после заключения гематолога и данных коагулограммы
- Б) родоразрешение только методом кесарева сечения
- В) всегда назначается стернальная пункция
- Г) роды проводить в обсервационном отделении

**1761. [T011748] ПРИ МИОПИИ 2-ОЙ СТЕПЕНИ (-5 - -6 ДИОПТРИЙ) У БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНО**

- А) укорочение периода изgnания путем перинеотомии
- Б) кесарево сечение
- В) естественное родоразрешение без оперативных вмешательств
- Г) исключение путег методом наложения акушерских щипцов

**1762. [T011749] ПРИ МНОГОВОДИИ В РОДАХ ВСКРЫТИЕ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ**

- А) при раскрытии шейки на 3-4 см вне схватки
- Б) при полном раскрытии
- В) на высоте схватки
- Г) не раньше раскрытия шейки матки на 8 см

**1763. [T011750] ЖЕНЩИНА, В АНАМНЕЗЕ У КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА, ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ У СПЕЦИАЛИСТА**

- А) онколога
- Б) венеролога
- В) нефролога
- Г) невропатолога

**1764. [T011751] ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ КРИТЕРИЯ ИЗЛЧЕННОСТИ ПОСЛЕ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ**

- А) мочи и крови на хорионический гонадотропин
- Б) крови на сахар
- В) мочи на наличие лейкоцитов
- Г) крови на RW

**1765. [T011752] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ РВОТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) церукал
- Б) скополамин
- В) атропин
- Г) димедрол

**1766. [T011753] ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- А) бупивакаин
- Б) анаприлин
- В) лидокаин
- Г) этилизол

**1767. [T011754] РЕЛАКСАЦИЯ МАТКИ БЫСТРО ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- А) энфлурана
- Б) димедрола
- В) гипотиазида
- Г) метронидазола

**1768. [T011755] К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТЕРОЛА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ОТНОСЯТ**

- А) угрожающие преждевременные роды
- Б) маточные кровотечения, вызванные атонией матки
- В) слабость родовой деятельности
- Г) прерывание беременности

**1769. [T011757] ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) эргометрина малеат
- Б) динопрост
- В) сальбутамол
- Г) магния сульфат

**1770. [T011758] ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВРОЖДЕННЫХ УРОДСТВ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) эмбриотоксическое действие
- Б) тератогенное действие
- В) мутагенное действие
- Г) фетотоксическое действие

**1771. [T011759] К ПОСЛЕДСТВИЮ ВВЕДЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ**

- А) гипотрофия плаценты и плода
- Б) потеря слуха
- В) поражение кожных покровов
- Г) геморрагический синдром

**1772. [T011760] СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- А) проводится по показаниям
- Б) проводится при инфекционных заболеваниях
- В) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе
- Г) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете

**1773. [T011761] К ДЕЗАГРЕГАНТУ, УЛУЧШАЮЩЕМУ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ, ОТНОСЯТ**

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) анаприлирин
- В) морфин
- Г) сумамед

**1774. [T011762] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ АЛЬБУМИНА  
ОТНОСЯТСЯ**

- А) плазмозаменители
- Б) ненаркотические анальгетики
- В) антибиотики
- Г) антикоагулянты

**1775. [T011763] К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН  
ОТНОСИТСЯ**

- А) послеродовая гипотония матки
- Б) удушье
- В) приступ стенокардии
- Г) гипертонический криз

**1776. [T011764] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ЦЕРУКАЛ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) противорвотное
- Б) антиаритмическое
- В) гипотензивное
- Г) диуретическое

**1777. [T011765] К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ**

- А) гепарин
- Б) аспирин
- В) диклофенак- натрия
- Г) ибуклин

**1778. [T011766] КОАГУЛЯНТЫ \_\_\_\_\_ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ**

- А) повышают
- Б) не изменяют
- В) угнетают
- Г) понижают

**1779. [T011767] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ АНТИБИОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) антимикробное
- Б) жаропонижающее
- В) противоаллергическое
- Г) адсорбирующее

**1780. [T011768] К СИМПТОМУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ОТНОСИТСЯ**

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) пиурия

**1781. [T011770] ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИВЕННО**

- А) адреналин
- Б) преднизолон
- В) аспирин
- Г) дицинон

**1782. [T011771] К КОЖНОМУ АНТИСЕПТИКУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- А) спирт 70%
- Б) фурацилин
- В) спирт 40%
- Г) перекись водорода

**1783. [T011772] К ПРЕПАРАТУ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ОТНОСИТСЯ**

- А) стрептомицин
- Б) пенициллин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

**1784. [Т011773] АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) пефлоксацин
- Б) карбенициллин
- В) рифампицин
- Г) стрептомицин

**1785. [Т011774] ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИЙ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) галидор
- Б) фестал
- В) пепсин
- Г) оmez

**1786. [Т011775] АДРЕНОБЛОКАТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) атенолол
- Б) лазикс
- В) оmez
- Г) изоптин

**1787. [Т011776] ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) фамотидин
- Б) сайтотек
- В) солкосерил
- Г) но-шпа

**1788. [Т011777] К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- А) цефазолин
- Б) беродуал
- В) винпоцетин
- Г) сумамед

**1789. [Т011780] К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) эссенциале
- Б) аспирин
- В) пирацетам
- Г) лазолван

**1790. [T011781] ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ПО- ЗИМНИЦКОМУ  
НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ \_\_\_\_\_ ПОРЦИЙ МОЧИ**

- A) 8
- Б) 2
- В) 12
- Г) 6

**1791. [T011782] ПОРЦИИ МОЧИ ПРИ ИСЛЕДОВАНИИ ПО - ЗИМНИЦКОМУ  
СОБИРАЮТ КАЖДЫЕ (Ч)**

- A) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 6

**1792. [T011783] ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО  
ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ**

- А) памятку
- Б) направление
- В) лабораторный бланк
- Г) выписку из амбулаторной карты

**1793. [T011784] НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ  
(В ГР)**

- A) 5
- Б) 10
- В) 20
- Г) 15

**1794. [T011785] КАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ  
СОБИРАЕТСЯ ИЗ**

- А) трех мест
- Б) одного места
- В) двух мест
- Г) четырех мест

**1795. [T011786] КАБИНЕТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, В КОТОРОМ ВРАЧ ОСМАТРИВАЕТ ПАЦИЕНТА, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) смотровой
- Б) санпропускник
- В) клизменная
- Г) диагностическая

**1796. [T011787] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ. РТ. СТ.)**

- А) 40-50
- Б) 60-89
- В) 80-100
- Г) 100-139

**1797. [T011788] НОРМАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (ММ. РТ. СТ.) ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) 60-89
- Б) 90-100
- В) 140-159
- Г) 100-139

**1798. [T011789] ПОД ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА ПОНИМАЮТ**

- А) асистолию
- Б) брадикардию
- В) тахикардию
- Г) аритмию

**1799. [T011790] ПОД ТАХИКАРДИЕЙ ПОНИМАЮТ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ (В МИН)**

- А) 80
- Б) 60
- В) 70
- Г) 50

**1800. [T011791] ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- А) мерцательной аритмии
- Б) повышении артериального давления
- В) понижении артериального давления
- Г) брадикардии

**1801. [T011792] ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СОСТАВЛЯЮТ (С°)**

- A) 0,2-0,5
- Б) 1,0-1,5
- В) 0,8-1,0
- Г) 0,1-0,3

**1802. [T011794] В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ РАЗЛИЧАЮТ \_\_\_\_\_ ПЕРИОДА**

- A) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 1

**1803. [T011795] ГРАНИЦЫ СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (С°) ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЮТ**

- A) 37,1-38
- Б) 39,1-40
- В) 38,1-40
- Г) 36,1-37,3

**1804. [T011796] ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) озноб
- Б) чувство жара
- В) рвота
- Г) судороги

**1805. [T011797] ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- A) чувство жара
- Б) озноб
- В) сухость кожных покровов
- Г) бледность кожных покровов

**1806. [T011798] К ТИПУ ЛИХОРАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ УТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ВЫШЕ ВЕЧЕРНЕЙ, ОТНОСИТСЯ**

- А) извращенная
- Б) послабляющая
- В) перемежающая
- Г) атипичная

**1807. [T011799] ЛИХОРАДКА, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ СВЫШЕ 45 ДНЕЙ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**

- А) хроническая
- Б) острая
- В) подострая
- Г) мимолетная

**1808. [T011800] ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- А) «Ниттифор»
- Б) натрия гидрокарбонат
- В) «Мистраль»
- Г) раствор фурацилина

**1809. [T011801] КРАТНОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТ**

- А) ежедневно
- Б) один раз в три дня
- В) один раз в два дня
- Г) не реже одного раза в неделю

**1810. [T011802] ОПРЕЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В**

- А) паховых складках
- Б) локтевых сгибах
- В) подмышечных впадинах
- Г) области коленного сустава

**1811. [T011803] КРАТНОСТЬ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ РОДИЛЬНИЦАМ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 1 раз в три дня
- Б) 1 раз в семь дней
- В) ежедневно
- Г) по мере загрязнения

**1812. [T011804] СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ**

- А) систематически, до прекращения выделений из ран
- Б) 1 раз в три дня
- В) один раз в семь дней
- Г) 4-5 раз в сутки

**1813. [T011805] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ \_ (ЧАС)**

- А) 12
- Б) 8
- В) 10
- Г) 14

**1814. [T011806] СТЕРИЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В**

- А) операционных, родильных блоках, палатах для новорожденных
- Б) операционных, манипуляционных, палатах для новорожденных, родильных блоках
- В) операционных, палатах для новорожденных и интенсивной терапии
- Г) операционных, родильных блоках

**1815. [T011807] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ В**

- А) помещении для грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей
- Б) кладовой для чистого белья
- В) санитарной комнате
- Г) кабинете сестры хозяйки

**1816. [T011808] ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- А) 40-60
- Б) 20-40
- В) 60-80
- Г) 80-100

**1817. [T011809] ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА БОБРОВА ПРИМЕНЯЮТ**

- А) дистиллированную воду
- Б) перманганат калия 5%
- В) перекись водорода 3%
- Г) раствор натрия хлорида 0,9%

**1818. [T011810] К ПОСЛАБЛЯЮЩИМ КЛИЗМАМ ОТНОСИТСЯ**

- А) масляная
- Б) очистительная
- В) лекарственная
- Г) питательная

**1819. [T011811] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБОДИМО ПРИГОТОВИТЬ 100 МЛ**

- А) 10% раствора хлорида натрия
- Б) 2% раствора гидрокарбоната натрия
- В) 5% раствора сульфата магния
- Г) 0,9% раствора хлорида натрия

**1820. [T011812] ПОСЛЕ МАСЛЯННОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (ЧАС)**

- А) 6-10
- Б) 1-2
- В) 4-6
- Г) 10-12

**1821. [T011813] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) острая задержка мочи более 6 часов
- Б) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- В) недержание мочи
- Г) появление отеков

**1822. [T011814] ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕ СОДЕРЖАЩИХ ЖИЗНЕНСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И СПОР, ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) стерильными
- Б) чистыми
- В) продезинфицированными
- Г) одноразовыми

**1823. [T011815] ИНСУЛИН ВВОДЯТ В ОРГАНИЗМ**

- А) после того как место инъекции просохло от антисептика
- Б) через 15 секунд после обработки антисептиком
- В) сразу же
- Г) через 30 секунд после обработки антисептиком

**1824. [T011816] НА ПРАВИЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА УКАЗЫВАЮТ СЛЕУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

- А) цианоз кожи ниже наложения жгута, наличие пульса на лучевой артерии
- Б) бледность кожи ниже наложения жгута, наличие пульса на лучевой артерии
- В) цианоз кожи ниже наложения жгута, отсутствие пульса на лучевой артерии
- Г) бледность кожи ниже наложения жгута, отсутствие пульса на лучевой артерии

**1825. [T011817] ПРИ ПОПАДНИИ 10% РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ**

- А) некроз мягких тканей
- Б) тромбофлебит
- В) абсцесс
- Г) инфильтрат

**1826. [T011818] К ОСЛОЖНЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОД КОЖЕЙ ВОЗНИКЛО БАГРОВОЕ ПЯТНО ПРИ ПУНКЦИИ ВЕНЫ, ОТНОСИТСЯ**

- А) гематома
- Б) медикаментозная эмболия
- В) тромбофлебит
- Г) некроз

**1827. [T011819] К ОСЛОЖНЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЬЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- А) воздушная эмболия
- Б) гематома
- В) сепсис
- Г) некроз

**1828. [T011820] ПРИ ПОЗДНИХ ГЕСТОЗАХ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ**

- А) суточный диурез и водный баланс
- Б) продолжительность сна
- В) время прогулок
- Г) время общения с родственниками

**1829. [T011821] ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО**

- А) белка в моче
- Б) эритроцитов в моче
- В) дыхательный объем
- Г) тургор кожи

**1830. [T011822] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ**

- А) окситоцина
- Б) ампициллина
- В) димедрола
- Г) прозерина

**1831. [T011823] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ЗАКАЗАТЬ**

- А) свежезамороженную плазму
- Б) изотонический раствор
- В) антибиотики
- Г) консультацию терапевта

**1832. [T011824] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИГОТОВИТЬ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ**

- А) ручного обследования матки
- Б) наложения акушерских щипцов
- В) вакуум-экстракции плода
- Г) вакуум-аспирации

**1833. [T011825] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) катетеризировать периферическую вену
- Б) назначить общий анализ крови
- В) обработать палату
- Г) вызвать санитарку

**1834. [T011826] БЕРЕМЕННАЯ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ**

- А) тихом
- Б) шумном
- В) ярком
- Г) большом

**1835. [T011827] ИНВАЗИВНЫЕ И БОЛЕЗНЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ**

- А) только после введения в наркоз
- Б) без прикрытия наркозом
- В) в соответствии со стадией эклампсии
- Г) только в родильном зале

**1836. [T011828] ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО**

- А) проинформировать врача о сложившейся ситуации
- Б) вызвать родственников
- В) изолировать пациентку
- Г) изменить диету

**1837. [T011829] ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА ПОДГОТОВИТЬ РОДИЛЬНИЦУ С НОВОРОЖДЕННЫМ К**

- А) переводу в обсервационное акушерское отделение
- Б) переводу в детское отделение
- В) выписке домой
- Г) переводу в инфекционное отделение

**1838. [T011830] СНИМАЮТ ШВЫ НА ПРОМЕЖНОСТИ, ОЧИЩАЮТ РАНУ ОТ ГНОЙНОГО ОТДЕЛЯЕМОГО И ПО ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЯЮТ УЧАСТКИ НЕКРОТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ В**

- А) обсервационном акушерском отделении
- Б) родильном зале
- В) приемном отделении
- Г) выписной комнате

**1839. [T011831] ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА БЕЗ МЕТАСТАЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) септицемия
- Б) пиодермия
- В) септикапиремия
- Г) анемия

**1840. [T011832] ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА С МЕТАСТАЗАМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) септикапиремия
- Б) пиодермия
- В) септицемия
- Г) анемия

**1841. [T011833] САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) флегмонозная
- Б) серозная
- В) инфильтративная
- Г) застойная

**1842. [T011834] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) лактостаз и трещины сосков
- Б) разрыв промежности
- В) низкий вес плода
- Г) асимметрия молочных желез

**1843. [T011835] ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ ПРОЛАКТИНА ПРИ ЛАКТАЦИОННОМ МАСТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) бромокриптин
- Б) сумамед
- В) окситоцин
- Г) метилэргометрин

**1844. [T011836] У ВСЕХ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМСИЕЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА**

- А) обеих руках
- Б) левой руке
- В) правой руке
- Г) это не имеет значения

**1845. [T011837] СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) волдырная проба
- Б) прикроватный тест
- В) признак Вастена
- Г) измерение окружности живота

**1846. [T011838] СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) взвешивание беременных
- Б) прикроватный тест
- В) признак Вастена
- Г) измерение окружности живота

**1847. [T011839] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕЛКА В МОЧЕ НЕОБХОДИМО**

- А) повторить анализ
- Б) назначить диуретики
- В) собрать анамнез
- Г) вызвать родственников

**1848. [T011840] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) мелькание мушек перед глазами
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

**1849. [T011841] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) ощущение тяжести в области лба, затылка
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

**1850. [T011842] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) шум в ушах
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

**1851. [T011843] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) выпадение полей зрения
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

**1852. [T011844] ПРОВОЦИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) яркий свет, громкий звук, боль
- Б) приглушенные звук и свет
- В) тишина
- Г) просторная одежда

**1853. [T011845] ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) кровоизлиянии в жизненно важные органы
- Б) прибавке веса
- В) похудении
- Г) изменении настроения

**1854. [T011846] ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- А) нарушении маточно-плацентарного кровообращения
- Б) прибавке веса
- В) похудении
- Г) изменении настроения

**1855. [T011847] ФИБРИЛЛЯРНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ МЫШЦ ВЕК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ФАЗУ ЭКЛАМПСИИ**

- А) предсудорожную
- Б) тонические судороги
- В) клонические судороги
- Г) разрешение припадка

**1856. [T011848] СЕРИЮ ПРИСТУПОВ ЭКЛАМПСИИ НАЗЫВАЮТ**

- А) эклампсическим статусом
- Б) тетанусом
- В) клонусом
- Г) тонусом

**1857. [T011849] ПРИСТУП ЭКЛАМПСИИ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ**

- А) во время беременности, в родах и в послеродовом периоде
- Б) только во время беременности
- В) только в родах
- Г) только в послеродовом периоде

**1858. [T011850] ЭКЛАМПСИЯ БЕЗ СУДОРОГ**

- А) существует
- Б) не существует
- В) обсуждается
- Г) не известно

**1859. [T011851] СОЗДАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПО В.В. СТРОГАНОВУ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ**

- А) преэклампсии
- Б) кровотечении
- В) тазовом предлежании плода
- Г) гестационном сахарном диабете

**1860. [T011852] ПРИ УГРОЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА**

- А) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

**1861. [T011853] ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЕЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ**

- А) только в условиях развернутой операционной
- Б) в любых условиях
- В) в теплом помещении
- Г) в присутствии второй акушерки

**1862. [T011854] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО**

- А) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

**1863. [T011855] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО**

- А) немедленно госпитализировать
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

**1864. [T011856] В ОТЛИЧИЕ ОТ ГИПТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМЕ РОДОВЫХ ПУТЕЙ МАТКА**

- А) плотная
- Б) дряблая
- В) мягкая
- Г) асимметричная

**1865. [T011857] ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО**

- А) вызвать акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога
- Б) наложить кровоостанавливающий жгут
- В) ввести кровоостанавливающие средства
- Г) начать переливать кровь

**1866. [T011858] ПОСЛЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЬНОГО РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТЕНОК ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ПОВТОРНО ДРУГОЙ АКУШЕРКОЙ**

- А) противопоказано
- Б) показано
- В) зависит от ситуации
- Г) зависит от возраста пациентки

**1867. [T011859] КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ ПРОВОДИТСЯ**

- А) одновременно, четко и быстро
- Б) дробно
- В) по очереди
- Г) осторожно